錢氏小兒藥證直訣上

閻孝忠集

脉證治法

小兒脉法

脉亂不治　氣不和弦急　傷食沉緩

虛驚促急　風浮　冷沉細

變蒸

小兒在母腹中乃生骨氣五藏六府成而

未全自生之後即長骨脉五藏六府之神智也變者易也巢源云上多變氣又生變蒸者自內而長自下而上又身熱故以生之日後三十二日一變變每畢即情性有異於前何者長生府藏智意故也何謂三十二日長骨添精神人有三百六十骨除手足中四十五碎骨外有三百二十數自生下骨一日十段而上之十日百段三十二日計一百二十段爲一遍亦曰一蒸骨之餘氣腦分入齦中作三十二齒而齒牙有不及三十二數者由變不足其常也或二十八日即至長二十八齒乙下倣此但不過三十二之也凡一周遍乃發虛熱諸病如是十周則小蒸畢也計三百二十日生骨氣乃全而未壯也故初三十二日一變生腎生志六十四日再變生膀胱其發耳與

骫冷臥　與膀胱俱主於水水數一故先變生之九十六日三變生心喜一百二十八日四變生小腸其發汗出而微驚心爲火火數二一百六十日五變生肝哭一百九十二日六變生膽其發目不開而赤肝主木木數三二百二十四日七變生肺聲二百五十八日八變生大腸其發膚熱而汗或不汗肺屬金金數四二百八十八日九變生脾智三百二十日十變生胃其發不食腸痛而吐乳此後乃齒生能言知喜怒故云始全也太倉云氣入四肢長碎骨於十變後六十四日長其經脉手足受血故能持物足立能行也經云變且蒸謂蒸畢而足一歲之日也師曰不汗而熱者發其汗大吐者微下不可餘治是以小兒須變蒸蛻齒者如花之易苗所謂不及三十二

齒由變之不及齒當與變日相合也年壯
而視齒方明

五藏所主

心主驚[illegible]叫哭發熱飲水而揺虛則卧
而悸動不安

肝主風實則目直大叫呵欠項急頓悶虛
則前牙多欠氣熱則外生氣温則内生氣
脾主困實則困睡身熱飲水虛則吐瀉生風
肺主喘實則悶亂喘促有飲水者有不飲
水者虛則哽氣長出氣

腎主虛無實也惟瘡疹腎實則變黑陷
更當别虛實證假如肺病又見肝證前牙
多呵欠者易治肝虛不能勝肺故也若目
直大叫哭項急頓悶者難治蓋肺久病則
虛冷肝強實而反勝肺也視病之新久虛
實虛則補[illegible]實則瀉子

五藏病

肝病哭叫目直呵欠頓悶項急

心病多叫哭驚悸手足動揺發熱飲水

脾病困睡洩瀉不思飲食

肺病悶亂哽氣長出氣氣短喘急

腎病無精光畏明體骨重

肝外生感風

呵欠頓悶口中氣熱當發散大青膏主之若

能食飲水不止當大黃圓微下之餘不可下

肝熱

手尋衣領及亂捻物瀉青圓主之壯熱飲

水喘悶瀉白散主之

肺熱

手掐眉目鼻面甘桔湯主之

肺盛復有風冷

胃滿短氣氣急喘嗽上氣當先散肺後發

散風冷散肺瀉白散大青膏主之肺只傷
寒則不胥滿

肺虛熱

脣深紅色治之散肺虛熱少服瀉白散

肺藏怯

脣白色當補肺阿膠散主之若悶亂氣麁
喘促哽氣者難治肺虛損故也
脾肺病久則虛而脣白脾者肺之母也母
子皆虛不能相營故名曰怯肺主脣白白
而澤者吉白如枯骨者死

心熱

視其睡口中氣溫或合面睡及上竄咬牙
皆心熱也導赤散主之
心氣熱則心胥亦熱欲言不能而有就冷
之意故合面卧

心實

心氣實則氣上下行澁合卧則氣不得通故喜仰卧則氣得上下通也瀉心湯主之

腎虛

兒本虛怯由胎氣不成則神不足目中白睛多其顱即解匈開也面色皎白此皆難養縱長不過八八之數若恣色慾多不及四旬而亡或有因病而致腎虛者非也又腎氣不足則下竄蓋骨重惟欲墜於下而縮

一也腎水陰也腎虛則畏明皆宜補腎地黃圓主之

面上證

左顯爲肝　右顯爲肺

額上爲心　鼻爲脾

頰爲腎

目內證

赤者熱也隨證治之

赤者心熱導赤散主之

淡紅者心虛熱生犀散主之

青者肝熱瀉青圓主之淺淡者補之

黃者脾熱瀉黃散主之

無精光者腎虛地黃圓主之

肝病勝肺

肝病秋見一作日晡肝強勝肺肺怯不能勝肝當補脾肺治肝益脾者母令子實故也補肝益黃散治肝瀉青圓主之

肺病勝肝

肺病春見一作早辰肺勝肝當補腎肝治肺藏肝怯者受病也補肝腎地黃圓治肺瀉白散主之

肝有風

目連瞤不搐得心熱則搐治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有熱

目直視不搐得心熱則搐治肝瀉青圓治心導赤散主之

肝有風甚

身反折強直不搐心不受熱也當補腎治肝補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

凡病或新或久皆引肝風風動而止於頭目目屬肝風入於目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也若熱入於目牽其筋脉兩眥俱緊不能轉視故目直也若得心熱則搐以其子母俱有實熱風火相搏故也治肝瀉青圓治心導赤散主之

驚癇發搐

男發搐目左視無聲右視有聲女發搐目右視無聲左視有聲相勝故也更有發時證

早晨發搐

因潮熱寅卯辰時身體壯熱上視手足動

搖口內生熱涎項頸急此肝旺當補腎治肝也補腎地黃圓治肝瀉青圓主之

日午發搐

因潮熱巳午未時發搐心神驚悸目上視白睛赤色牙關緊口內涎手足動搖此心旺也當補肝治心治心導赤散凉驚圓補肝地黃圓主之

日晚發搐

因潮熱申酉戌時不甚搐而喘目微斜視身體似熱睡露睛手足冷大便淡黃水是肺旺當補脾治心肝補脾益黃散治肝瀉青圓治心導赤散主之

夜間發搐

因潮熱亥子丑時不甚搐而卧不穩身體溫壯目睛緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不納津液當補脾治心補

脾益黃散治心導赤散涼驚圓主之

傷風後發搐

傷風後得之口中氣出熱呵欠頓悶手足動揺當發散大青膏主之小兒生本怯者多此病也

傷食後發搐

傷食後得之身體温多唾多睡或吐不思食而發搐當先定搐搐退白餅子下之後服安神圓

百日内發搐

真者不過三兩次必死假者發頻不爲重真者内生驚癎假者外傷風冷蓋血氣未實不能勝任乃發搐也欲知假者口中氣出熱也治之可發散大青膏主之及用塗頤浴體法

急驚

因聞大聲或大驚而發搐發過則如故此無陰也當下利驚圓主之

小兒急驚者本因熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱大小便黃赤劇則搐也蓋熱甚則風生風屬肝此陽盛陰虛也故利驚圓主之以除其痰熱不可與巴豆及溫藥大下之恐搐虛熱不消也小兒客痰熱於心胃因聞聲非常則動而驚搐矣若熱極雖不因聞聲及驚亦自發搐

慢驚

因病後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻氣出亦冷手足時瘈瘲昏睡睡露睛此無陽也括蔞湯主之

凡急驚陰陽異證切宜辨而治之急驚合涼瀉慢驚合溫補世間俗方多不分別悞小兒甚多又小兒傷於風冷病吐瀉醫謂

脾虛以溫補之不已復以涼藥治之又不已謂之本傷風醫亂攻之因脾氣即虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而爲瀉當去脾間風風退則利止宣風散主之後用史君子圓補其胃亦有諸吐利久不差者脾虛生風而成慢驚

五癎

五癎皆隨藏治之每藏各有一獸並治小病也

折上竄犬叫肝也

吐舌羊叫心也

直視腹滿牛叫脾也

跳及折手縱鷄叫肺也

如尸吐沫猪叫腎也

重者死病後甚者亦死

瘡疹候

面燥顋赤目胞亦赤呵欠頓悶乍涼乍熱咳嗽嚏噴手足梢冷夜卧驚悸多睡並瘡疹證此天行之病也惟用温涼藥治之不可妄下及妄攻發受風冷五藏各有一證

肝藏水疱　肺藏膿疱

心藏斑　脾藏疹　歸腎變黑

瘡疹病後或發癇餘瘡難發癇矣木勝不歸心故也若涼驚用涼驚圓温驚用

粉紅圓

小兒在胎十月食五藏血穢生下則其毒當出故瘡疹之狀皆五藏之液肝主淚肺主涕心主血脾爲裹血其瘡出有五名肝爲水疱以淚出如水其色青小肺爲膿疱以涕稠濁色白而大心爲斑主心血色赤而小次於水疱脾爲疹小次斑瘡其主裹

色赤黄淺也涕淚出多故膿疱水疱血營於内所出不多故斑疹皆小也者涕泣俱少譬胞中容水水去則瘦

潮熱三日以上熱運入皮膚即發瘡不甚多者熱留膚腠之間故也潮熱出如早食潮熱不已爲水疱之類也始出之時五藏證見惟腎無候但見平證耳骺涼耳涼是也骺耳俱屬於腎其居北方主冷也若瘡黑陷而耳骺反熱者爲逆也若用百祥圓牛李膏各叁服不愈者死病也

凡瘡疹若出辨視輕重若一發便出盡者必重也瘡夾疹者半輕半重也出稀者輕裏外肥紅者輕外黑裏赤者微重也外白裏黑者大重也瘡端裏黑點如針孔者勢

劇也青乾紫陷昏睡汁出不止煩燥熱渴
腹脹啼喘大小便不通者困也凡瘡疹當
乳母慎口不可令飢及受風冷必歸腎而
變黑難治也
有大熱者當利小便有小熱者宜解毒若
黑紫乾陷者百祥圓下之不黑者慎勿下
更看時月輕重大抵瘡疹屬陽出則爲順
故春夏病爲順秋冬病爲逆冬月腎旺又
盛寒病多歸腎變黑又當辨春膿疱夏黑
陷秋斑子冬疹子亦不順也雖重病猶十
活四五黑者無問何時十難救一其候或
[redacted]或[redacted]或身黃腫紫宜急以百祥圓下
之復惡寒不已身冷出汗耳骯反熱者死
病也何以然腎氣大旺脾虛不能治故也
下後身熱氣溫欲飲水者可治以脾生勝
腎寒去而溫熱也治之宜解毒不可妄下

妄下則內虛多歸於腎若能食而痂頭焦起或未[illegible]而喘實者可下之身熱煩渴腹滿而喘大小便澁面赤悶亂大吐此當利小便不差者宣風散下之若五七日痂不焦是內發熱熱氣蒸於皮中故瘡不得焦痂也宜宣風散導之用生犀磨汁解之使熱不生必着痂矣

瘡疹由內相勝也惟斑疹能作搐疹爲脾所生脾虛而肝旺乘之木來勝土熱氣相擊動於心神心喜爲熱神氣不安因搐成癇斑子爲心所生心生熱熱則生風風屬於肝二藏相搏風火相爭故發搐也治之當瀉心肝補其母括蔞湯主之

瘡黑而忽瀉便膿血并痂皮者順水穀不消者逆[illegible]以然且瘡黑屬腎脾氣本強或舊服補脾藥脾氣得實腎雖用事脾可制

之今瘡入腹爲膿血及連痂皮得出是腫
強腎退即病出而安也米穀及瀉乳不化
者是脾虛不能制腎故自洩也此必難治

傷風

昏睡口中氣熱呵欠頓悶當發散與大青
膏解不散有下證當下大黃圓主之大飲
水不止而善食者可微下餘不可下也

傷風手足冷

脾藏怯也當和脾後發散和脾益黃散發
散大青膏主之

傷風自利

脾藏虛怯也當補脾益黃散發散大青膏
主之未差調中圓主之有下證大黃圓下
下後服溫驚圓

傷風腹脹

脾藏虛也當補脾必不喘後發散仍補脾

也去脹塌氣圓主之發散大青膏主之

傷風兼藏

兼心則驚悸

兼肺則悶亂喘息哽氣長出氣嗽

兼腎則畏明

各隨補母藏虛見故也

傷風下後餘熱

以藥下之太過胃中虛熱飲水無力也當

生胃中津液多服白术散

傷寒瘡疹同異

傷寒男體重面黃女面赤喘急憎寒各口

中氣熱呵欠頓悶項急也瘡疹則顯赤燥

多噴嚏悸動昏倦四支冷傷寒當發散之

治瘡行溫平有大熱者解毒餘見前說

初生三日內吐瀉壯熱

不思乳食大便乳食不消或白色是傷食

當下之後和胃下用白餅子和胃用益黃散主之

初生三日已上至十日吐瀉身温凉不思乳食大便青白色乳食不消此上實下虛也更有兼見證

肺睡露睛喘氣　心驚悸飲水

脾困倦饒睡　肝呵欠頓悶

腎不語畏明