宋板洪氏集驗方

洪氏集
驗方
宋刊
二本

洪氏集驗方目録

一卷

治痢茱連丸　肉豆蔻散
祛瘧散　大交感丹
混元胎丹　還少丹
瓊玉膏　一粒金丹
神妙六逸丸　鐵甕交感丹
降氣湯　牙藥

二卷

化毒排膿内補散　癰疽靈方
治諸般瘡毒　靈寶膏

治癰疽發背方　發背灸法
又發背灸法　治背疽糝藥
內消發背　治甲疽努肉
治癰疽經驗方　治癰疽奪命膏
又勝氷散　又應補內托圓
又聖柳散　治癰疽立効方

三卷

蓯蓉茸附圓　鹿茸世寶圓
五解散　治痢育腸圓
硫附鹽礬圓　治腸風下血

比金散　治腸風痔疾
阿魏良薑圓　麋茸圓
人參大温中圓　水陸二仙丹
神應乳香圓　神妙驅風散
虛風圓　四斤圓
妙應圓　丁香草菓散
神仙透空圓　沉香蓽澄茄湯
灸結胷傷寒　治風烏荊圓
烏金散　良薑湯

治氣塊刺痛　常服散子
治胎衣不下　安腎圓
治傷折神授散　普救散
治喉口熱毒　肉豆蔻湯
四卷
治舌衄　治舌腫
治湯火傷　蓯蓉圓
治乾癬　治淋
治沙石淋　治毒虫傷
治冷積降氣　祕精圓

治傷折骨碎　治疝氣偏墜
治痔瘡金散　治腸風倍荅圓
治風毒氣眼　治腰痛
治虛勞秋石丹　治諸癎
治豆瘡倒攝　治喉閉二方
治腰痛　治腸風
瘡藥方　治癬
接骨方　治漏瘡
治外風入瘡口　癬藥

治喉閉　治盜汗
治傷風　治脚腫
治脚腫甘豆湯　灸勞法
治頭風頭痛　茶牙湯 治偏正頭疼
治腰痛附牛圓　治爛緣風眼
治髍瘡　治癬疥
治脚氣灸法　治蛇毒
治鼻衄　治諸鯁
治盜汗　治暑龍鬚散

治風牙疼　治蛀牙疼
治風牙蛀牙疼　治五種牙疼
治風蛀牙破者　治牙搖牙宣
治暴嗽不止　治惡瘡久不較
治冷漏　治喉閉
治咽喉腫痛　治凍死
治暍死　治溺死
治火燒湯潑　治湯火瘡
治嵌甲　治小腸氣

五卷

治産後百病　催生如聖散
萬靈圓　烏金散
救生散　治姙娠下血腰痛
治産後顛狂　催生藥
治滑胎易産　産後羊肉湯
産後防暈方　産後大便不通
順經散　九寶飲
治小兒泄瀉　金液丹
青州白丸子　肥兒圓

神麯豆蔻圓　木香分氣圓
助胃膏　治麻豆瘡膿水
辰砂安驚圓　羌活膏
大天南星圓　治臍風撮口法
没石子圓　誤吞珠銅鐵方
誤吞錢方　誤吞釘箭等物
封顙　治吐
誤食穀芒　治口瘡消風散
治腫雄朱散　治瘡瘍金華散

治頭瘡如聖散　治喉閉急風散

墜涎圓　辰砂圓

四君子圓　肥兒圓

觀音散

洪氏集驗方目録

洪氏集驗方卷第一

治痢 先忠宣獲此方屢有神驗 茱萸丸

黃連吳茱萸各二兩如常法揀洗焙乾黃連剉令寸斷同一處炒俟香熟分爲二各用醋糊爲丸如桐子大若小兒則如菉豆大悉赤痢則服黃連白痢則服茱萸赤白則并服之赤先白後則先黃連而後茱萸赤多白少則二分黃連一分茱萸反是亦如之每服五七十粒至百粒服之以

愈爲度陳米飲下、大率茱萸治白黃連治赤也黃連用鷹爪者

肉豆蔻散治赤白痢無藥可治者其効如神上吐下痢者亦治、已下三方韓子溫少卿傳

肉豆蔻切片子炒黃色　櫻粟殼搗碎用蜜搽拌勻炒黑黃

甘草切碎炒黃黑色　乾生薑切細炒黃黑

右等分搗羅爲末每服六錢如赤痢多加甘草一寸炙黃同煎若白痢多加炒生薑一塊同煎用水二大盞煎至一盞半通口服不計時候却將兩服滓再煎

服無不愈者

祛瘧散熱多寒少者一服無不驗（千家每合以濟人一服即愈）

外臺秘傳出此方專治瘧疾不瘥用水煎汲治時行寒熱諸藥不効者今有夢中神傳藥方如有此疾者依方服之即愈如所感深重一服未愈者定毒發一次更不再來

好高良薑（剉碎微炒）　好川白薑（炮剉）

二味各碾爲極細末

本出衍內款

右各秤等分勿令偏些再入乳鉢內一處研勻細羅過二味病大者共抄三大錢病小者共三小錢於當發日日未出時以豶猪膽二枚勿用白色者割開取汁與藥調勻再用熱酒少許打勻通口猛作口噞更以酒少許送下急嗽口以甜物壓之一日不得喫別藥忌大寒物

其膽須是豶猪膽其翁母猪膽不中江南謂之鐓猪

大交泰丹 傷寒未分陰陽不可服

治陰陽二毒傷寒或因下早亡陽或致
結伏胷膈四肢厥冷脉息俱無心燥如
火或因冷物傷脾夾臍疼痛生硬入胃
中滿痞塞潮發寒熱并治飜胃噦逆霍
亂吐痢小腹疼癖脇肋氣痛但是陰陽
不順惡候傷寒壞證並皆治之每服一
粒炭火内煆通赤良久取出放冷細研
如粉米飲一盞煎七分温服不拘時候
隔半時辰再進一服其効如神兼治小

兒瘡疹倒厭依法服半粒立愈

金星石　大陰玄精石

銀星石　雲母石 白色片子

代赭石　桂府滑石

禹餘石 已上各一兩　寒水石 吉州者一兩半

不灰木一兩 色青黑性軟者

右件九味入磁瓶子炭半秤煅候火耗一半取出放冷研爲細末糯米粥爲圓如彈子大候乾用 係醫壞證傷寒一服可活一人

混元胎丹乃陰陽始生之物氣精血初生之英華蓋合元宮真氣所化修真之士服餌補漏壯氣固神益髓通神明延壽命增益道涯超範圍外内丹之基具服餌方如後久無嗣息者服此有驗

以首兒衣二八月者不用收時連帶中元血收

用長流水淨洗控乾入甆瓶中下無灰法酒三大勝腦子麝香隨力下之多止一錢或半字以紙封瓶口下用文武火煆候酒將盡取出

再入酒三勝依前煆却用竹篦或金銀篦不住攪以覺爛糜似粥模樣待冷取入砂盆内細研如粉別入外料

人參二兩　茯苓二兩　乳香半兩

朱砂半兩水飛過浪乾取淨　山藥四兩

巴上並爲細末人參等須擇佳者

右用上件藥末入於所煮藥内如乾時更用元煆酒旋旋添拌匀一處攪搜爲元梧桐子大慢火焙乾每日空心五十

粒加至一百粒用温酒塩湯下良久用甜淡飲食飽壓逐日葷味中減少五味謂甜淡鹹等物服至五七日微覺小腹連腰沉重不須疑慮乃是藥力攻元氣相補助如此

西川羅赤脚仙還少丹大補心腎脾胃一切虚損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏小便昏濁陳晦叔敷文傳

乾山藥　牛膝酒浸一宿焙乾各一兩半

山茱萸　白茯苓　去皮
五味子　肉蓯蓉　酒浸一宿焙乾
石菖蒲　巴戟　去心
遠志　去心　杜仲　去麄皮用生薑汁并酒合和塗炙令熟
楮實　舶上茴香　已上各一兩
苟杞子　熟乾地黃　各半兩
右擣羅爲末煉蜜入棗肉爲圓如梧桐子大每服三十圓温酒鹽湯下日進三服皆食空時　如早食併服之無妨　至五日覺有力十

日精神爽健半月氣力稍盛二十日目明一月夜思飲食冬月手足常暖久服無毒令人身體輕健筋骨壯盛怡悅難老更看體候加減如身熱加山梔子一兩心氣不寧加麥門冬一兩少精神加五味子一兩陽弱加續斷一兩常服齒牢永無瘴瘧婦人服之姿容光悅去一切病治子宮久冷

鐵瓮先生神仙祕法瓊玉膏 陳晦叔服此藥有驗

新羅人參二十四兩春一千下爲末　生地黃一秤十六斤九月採擣

雪白茯苓四十九兩木臼千下爲末　白沙蜜十斤

右件人參茯苓爲細末蜜用生絹濾過地黃取自然汁擣時不得用鐵器取汁盡去滓用藥一處拌和勻入銀石器或好甆器內封用如器物小分兩處物盛用淨紙二三十重封閉入湯內以桑木柴火煮六日如連夜火即三日夜取出用臘紙數重包瓶口入井內去火毒一

伏時取出再入舊湯內煮一日出水氣
取出開封取三匙作三盞祭天地百神
焚香設拜至誠端心每晨朝以二匙溫
酒化服不飲者白湯化之此膏填精補
髓腸化爲筋萬神具足五臟盈溢髓實
血滿髮白變黑返老還童行如奔馬日
進數食或終日不食亦不飢關通強記
日誦萬言神識高邁夜無夢想人年二
十七歲以前服此一料可壽三百六十

歲四十五歲以前服者可壽二百四十歲六十三歲以前服者可壽百九歲六十四歲以上服之可壽至百歲服之十劑絶嗜慾修陰功成地仙矣一料分五處可救五人癰疾分十處可救十人勞瘵修合之時沐浴志誠勿輕示人

一粒金丹治中風癱瘓口眼喎斜涎潮語澁渾身疼痛應一切風疾悉皆治愈張真甫舍人傳得之劉信叔

大川烏頭炮去皮臍　大黑附子炮裂去皮臍

新羅附子炮裂已上各二兩　五苓脂一兩

白殭蚕一兩去絲炒　白蒺藜一兩炒一去刺

没藥半兩研　朱砂半兩研

白礬一兩枯研　麝香淨肉半兩研

細香墨半兩　金箔二百片

右件前六味同爲末後四味研勻同合

和令勻用井花水一大盞研墨盡爲度

將汁搜和用杵臼内擣五百下和圓如

彈子大金箔爲衣窨乾每服一粒用生薑一兩去皮擦取自然汁將藥圓於汁內磨化盡用無灰熱酒一大盞同浸化溫服更量性多少喫溫酒一二升投之以助藥力用衣被蓋覆汗出爲効痛勢重者日進二服不拘時候

張天師留傳老擻少壯輕身強記駐顏悅色髮白變黑開心中迷忘聰明耳目神妙

賀州王承務方

李少卿若樸傳

石菖蒲 九節者能開心孔聰明耳目益智不忘出音聲治耳聾高志不老

兎絲子 補不足益氣力堅筋骨主口苦燥渴久服輕身延年

地骨皮 主五臟邪氣燥熱消渴裨益真氣久服輕身堅筋骨不老耐寒暑

遠志 補不足除邪氣益精神注智聰明耳目去皮膚中熱久服輕身不老好顏色益心

生乾地黃 填骨髓長肌肉去胃中宿食補五臟通血脉益氣力利耳目

牛膝 能助人筋骨偏治腰疼益真氣變白髮久服輕身不老耐寒暑

右件藥各用二兩先揔剉碎用酒浸之春夏五日秋冬七日慢火焙乾擣羅爲末煉蜜爲圓如梧桐子大每服空心温

酒下三十圓至五十圓百病俱退服至一百日老却少容服至一年髮如漆過二年顏如童子三年骨髓堅實四年鬼神自散精神爽清合藥并服時忌鷄犬見所傳不得過十三家湖州杜助教所傳葛仙翁六神圓用藥六味與此方同

鐵甕申先生交感丹俞居易侍郎傳

世人中年精耗神衰常言百事心灰蓋緣心血少而火不能下降於腎氣憊而水不

能上升至心中焦隔絶榮衛不和所苦者上則心多驚悸中則寒痞飲食減少下則虛冷遺泄甚至於陰痿不興臟氣滑洩愚醫徒知峻補下田非獨不能生水滋心而建僞失真立見衰悴夭折之由當自此始悲夫所處此方廣濟迷流然不可忽此藥品志必服之半年漸屏去一切暖藥又不可恃此而馳嗜慾然後力習秘固泝流之術其神効不可殫述質之天地切勿妄傳

居易之祖通奉遺訓云予年五十一歲遇鐵甕申先生授此秘術酷志行持服食一年大補平日所服暖藥一切屏盡而飲食嗜好不減壯歲此藥力之功大矣今年八十五享天然之壽眼目無憾獨此藥傳之理當普示群生同登道果藥後有湯與牙藥可同用之

伏神 四兩　香附子 一斤去毛用新水浸一夕炒令黃色

右爲末煉蜜圓如彈子大每服侵晨一

圓以後湯嚼下

降氣湯

伏神 二兩　香附子 半斤炒浸如前

甘草 一兩半炙黃

右爲末每服二錢沸湯點下

牙藥

香附子 五兩

右以生薑三兩研和滓汁浸香附子三夕炒焦黑存性爲末以青塩二錢拌匀

揩牙

洪氏集驗方卷第一

洪氏集驗方卷第二　癰疽

化毒排膿內補散　丞相兄刋是方於徽州予屢以施人皆効

治一切癰疽瘡瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出無用手擠惡肉自去不犯刀仗服藥後疼痛頓減此其嘗試之効也歙丞胡權初得方於都下異人時有苦背瘍者七十餘頭諸藥遍試不効因出是方示之衆醫環立相目而笑曰是豈癰疽所用藥耶固謂之曰古人處

方自有意義觀其所用藥性平和縱未能已疾必不至壞病服之何害延治藥與服以熱酒半升許下藥五六錢少頃痛減七分數服之後瘡大潰膿血流迸若有物自內拕之服之經月瘡口遂合若未嘗有所苦者又有苦腹疾者其痛異常醫者莫曉時意此藥頗能止痛試以餌之當日下膿二三椀許痛亦隨止乃腸癰也又一老人忽胷間發腫根脚

甚大毒氣上攻如一瓠然斜插項右不能轉動服藥明日毒腫既散餘一小瘤如栗許大又明日帖然如故又一人發腦疑此方不服既殞於庸醫之手明年其子復苦此與父之狀不異因懲父之失縱酒飲藥遂至大醉竟日衮卧地上酒醒病已去矣又一婦人發乳焮腫疼痛不可堪忍自謂無復生理又二婦人股間發腫大如杯椀服此皆脫然如失

蒙濟著不可悉數姑叙大略以示未知此方者人抵癰疽之作皆氣血凝滯風毒壅結所致治之不早則外壞肌肉內攻藏府去生遠矣詳味此方其所用者皆發散風毒流行氣血排膿止痛生肌長肉等藥五毒不試而坐收瘍醫十全之功其可尚已今按本草於逐味下聊疏藥性温涼與所治療雖處方妙指不可遽曉庶倉猝之際可以見其用藥大

意帝服之不疑

參參 微溫無毒主補五藏除邪氣通血脉破堅積療心腹鼓痛脅脇逆滿令以新羅者爲上擇團結重實滋潤者洗淨去蘆薄切焙乾

當歸 大溫無毒主溫中止痛除客血內塞客氣虛冷補五藏生肌肉治一切風一切勞破惡血養新血又外臺金櫃等方皆謂大補不足決取立効之藥凡氣血昏亂者服之即定謂能使氣血歸所當歸制名之義宜出於此今取川中來者擇大片如馬尾狀滋潤甜辣芬香者溫水洗薄切焙乾

黃耆 微溫無毒主癰疽久敗瘡排膿止痛逐五藏間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦煩悶熱毒活血以綿上來者爲勝狀如箭簳長二三尺頭不又者洗淨寸截搥破

以鹽湯潤透用盞盛蓋湯餅上一炊久焙燥隨衆藥入碾即成細末

芎藭 溫無毒主中風入腦頭痛寒痺筋攣拘急除腦中冷痛面上游風治一切風一切氣一切血一切勞損諸寒心腹堅痛中惡卒急腫痛腰脚軟弱半身不遂壯筋骨調衆脉破癥結治癰疽發背排膿消瘀養血長肉以川中來者爲上今多用撫芎大塊者淨洗切焙

防風 溫無毒治心腹痛四肢拘急經脉虛羸主骨節風男子一切勞劣補中益神通利五藏關脉五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脉擇新香者淨洗切焙

厚朴 大溫無毒主中風寒熱血痺死肌溫中下氣去留熱止煩滿厚腸胃去結水破宿血消化水穀止五藏一切氣痛宜用梓州來者肉厚而色紫掐之油出去麄皮切薑汁畧一宿爐熟焙燥切勿用杜朴

效當不減於酒也

神授癰疽靈方 唐呂西華遇胡僧授此方沈存中良方備載其事

白麥飯石 顏色黃白類麥飯者曾作磨者尤佳炭火燒赤醋中浸之十遍止爲末

白斂末 與石等分

鹿角 三二寸截之不用自脫者凡帶腦骨者即非自脫炭火燒之煙盡爲度擣爲末倍前二味

右並擣篩令細取多年米醋於鐺中煎魚眼沸即下前件末調如稀餳以篦子塗褥腫上只當瘡頭留一指面地勿令合以出熱氣如未膿當內消若已

桔梗 微溫有小毒主胷脇痛如刀刺腹滿腸鳴利五藏補血氣除寒熱破血消積止心腹脹痛補五勞養氣除邪又養血排膿補內漏療胷中寒肺脉數咽噪不渴時時出濁唾腥臭吐膿如粳米粥是肺癰治之用桔梗甘草各二兩水三升煑取一升分再服朝暮吐膿血即差今所在有之以有心味苦者爲真無心味甘者薺苨也主解藥毒恐於衆藥不利切勿誤用洗淨去頭尾薄切焙燥

白芷 溫無毒破宿血長新血治乳癰瘰癧腸風痔瘻排膿止痛生肌

桂 大熱有小毒一曰溫無毒爲諸藥先聘主溫中利肝肺氣去心腹寒熱補五勞七傷通九竅利關節破痃癖癥瘕消瘀血續筋骨生肌肉筒厚者宜入治藏及下部藥輕薄者宜入治頭目發散藥今宜用卷薄者古法帶皮桂每兩止取二錢半合用一兩者當買四兩候衆藥罷別碾方入

數人方用大薛荔又杜醫治瘍常以二萬錢活一人方用千金藤又寧國尉王子駿傳一方用金釵股皆自神其花海州士人劉純臣傳一方用金釵股皆自神其方求其草視之蓋一物也存中云倉卒求不獲只用乾葉爲散并甘草酒煮服然不及生者

靈寶膏治一切癰疽腦疽發背等疾 楊池州傳云是方得之異人和王施此藥前後活數百人甚有神驗

大茈蔞十枚 隔二三年陳者盡去其皮留穰子約有半升許用砂盆研細如粉

新胡桃十枚 不油者湯去膜研細如粉

滴乳香十塊 如大指頭大乳鉢內研細如粉

右用白沙蜜十兩同前藥於銀石器內

甘草 平無毒主藏府寒熱邪氣堅筋骨長肌肉解毒溫中下氣倍力生用

右平味選藥貴精皆取淨曬焙極燥方秤數參當歸黃耆各二兩餘各一兩除桂外一處爲細末入桂令勻每服自三錢加至五六錢熱酒調下日夜各數服以多爲妙服至瘡口合更服爲佳所以補前損杜後患也不飲酒人濃煎木香湯然不若酒力之勝也或飲酒不多能勉強間用酒調并以木香湯解酒功

大黃二兩微炒

右爲麄末每服三錢水一盞煎八分去滓不計時

發背灸法 郭廷圭知縣傳

先用蠟線度左手中指頭至手掌下橫紋止其橫紋有三兩條當以長而分明者爲正却將所度蠟線自尾閭骨取中逆量至脊槌骨如度之長以墨記之次以蠟線取中指中節量一寸中指中節

作頭當撮小若日久瘡甚肌肉損爛筋骨出露即於布上塗藥貼之瘡上乾即再換但攻萬中不穴無不差瘡切忌手觸宜戒之劉夢得傳信方亦載

治乳癰發背諸般瘡毒　丹陽僧傳

金銀花　一名忍冬草

右採葉研爲滓傅瘡口　花五出而白微香蒂帶紅色野生延蔓葉如薜荔而青　予見沈存中良方所載忍冬嫩苗治癰疽云江西醫僧鑒清善治背疽得其方用老翁鬚後在金陵聞醫王玭善治瘍其方用水楊藤觀之乃老翁鬚也又友人王子淵自言得神方活

戚姓陳者得此疾其妻兒告急而陳苦不之信迫不得已灸之才十壯其紅腫處漸消於是欣然聽命再灸二十壯覺熱毒之氣從腫處下如以手拓從尾閭骨發散陳至今無恙又云莊婦忽背間痒痛傴背以行問知其狀使以法灸隨手即愈如是非一不能盡記

發背灸法 葉子昂丞相傳

男左女右以手中指自上至手盡處第

極慢火熬三時辰其稠如餳糖多合少合准此每服二匙無灰酒半盞調下不拘時候甚者不過兩三服其効如神

治癰疽發背初覺毒氣攻擊赤腫焮痛方行在金翰林傳

犀角鎊一兩　玄參一兩

川升麻一兩　黃耆一兩

赤芍藥一兩　麥門冬一兩去心

甘草一兩　當歸一兩

黑極乾燥研爲細末乾糝之瘡口遂收
至今無恙
內消發背
杏仁三七粒去油令盡　巴豆三七粒
硇砂半錢　乳香半錢
右將上件藥一處研細次用淮棗三七
箇去皮核研碎又用丁香三七粒班茅
三七箇烏梅三七箇去核三味同爲末
通前藥拌勻用餅藥麵十文生麵十文

兩頭橫紋多當側取橫紋中長而分明者爲正却將所量蠟線橫於墨點處每邊各量一寸朱點記之此正灸穴處前以墨處乃用取中非灸穴也視背疽發於左則灸右發右則灸左甚則左右皆灸至三十壯而止婦人則用右手中指取度其灸法與男子同婦人妳癰凡發背發肋發腦發腿之類不論男女皆可灸郭云自得此法救人不可勝計有親

瞻礬 洗

右先剔去甲中肉傅藥瘡上縱有努肉

才傅即乾落

治腫毒發背一切癰疽經驗方 鄱陽都路分因請大仙得

此方徐綱鏤板印施便癰腸癰皆治

橫紋甘草 一兩炙乾碾爲細末

右分爲三服無灰熱酒調一服如人行

一里再一服三服併喫鄱陽徐綱忽患

右是赤腫三日不能履地醫治無効才

一路爲度却用此去自尾閭骨盡處量在腰間點定灸却用中指中間一節爲度自穴分左右背左處發則灸左穴右亦然止三十艾甚則左右穴皆灸婦人乳癰亦用此法治之

治背疽糝藥　童縣尉傳

龍遊有患背疽已潰如椀面大視五臟僅隔薄膜耳自謂必死有用大鄉魚一枚刳去腸臟以羯羊糞實其中烘焙焦

散次入衆藥一處急用柳枝不住手攪
候滴入水中成珠爲度候極冷貼瘡如
常法
又勝冰散
茵陳半兩焙　防風半兩焙
滑石一兩別細研　當歸半兩焙
地龍半兩碾　乳香半兩別研
螺青一兩研　馬牙硝半兩研各取末
右八味一處和勻用新汲水調塗腫處

以冷水搜果藥在內慢火煅一日莫令燒過候藥熟取出地上將盆蓋覆出火氣然後去麵只取藥細研入少許蒸餅末滴水為圓如菉豆大老者七粒壯者十粒旋入甘草少許用馬蘭酒吞下春用馬蘭苗四兩生者秋後用馬蘭根白芽四兩研細同酒半升研去滓吞下如不飲酒蜜水亦可只可三服

治甲疽努肉果甲膿血疼痛不差 出靈苑

得不拘時

又聖柳散

蒼术四兩米泔水浸一宿焙　連翹一兩焙

甘草一兩炙　大黃半兩切

人參半兩切　赤茯苓半兩切

黃芩二錢半煅存性　桔梗半兩

白术一分　枳殼一兩麩炒去白

南木香一兩切　益智一兩去皮切

白芷半兩焙　苦參一兩切

服此藥須臾之間即能移步再服全愈

治腫毒發背一切癰疽奪命膏 趙教授得之全州醫

屢有神驗已下三方次第用之

麻油 四兩熬一二沸　石蟹 一枚燒米醋淬寸黑又燒碎爲末

防風 一兩切焙　蛤蚧 一對煅存性

燈心灰 一分　蜈蚣 一條燒存性

全蝎 七箇燒存性　血竭 一分別研

黃連 半兩去蘆切焙　當歸 半兩切焙

右件爲末用文武火熬麻油滴水中不

生水蛭一名馬蟥蜞取數枚長寘椀水中用訖縱之冬月蟄於積水邊或田埜水道邊掘土取之

右用薄帋一片剪圓如瘡大仍看瘡膿頭有幾箇其帋對膿頭作小眼搭在瘡上將水蛭着在帋眼處每一膿頭用一水蛭要得先唾去膿其痛立止如無膿頭即以手指按之覺最熱處是也或用茶末以水調塗瘡上看先乾處即點記如不能辨即着在中間如膿頭只一箇而赤暈稍大即近中處加用水蛭如膿

不可令稀時時塗之勿使至乾

又應痛內托圓

赤芍藥一兩焙　當歸一兩焙

血竭一分研　麝香一分研

瓜蔞根二兩火煅存性　人參半兩焙

沉香半兩剉　茵陳半兩焙

全蝎七枚煅存性　大黃一分焙

右件十味粗匀爲末煉蜜圓如彈子大

每服一粒乳香湯化破服之或嚼喫亦

養之令動先洗去人皮鹹以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者張仲欽運使傳云紹興壬申歲沿檄至汀親目其事

洪氏集驗方卷第二

右件爲細末如渴時加硇砂兩別研
入每服二大錢水盞柳枝七寸同煎
至八分去滓温服來拘時
初發即用奪命膏貼如胷膈滿悶大腸
祕結即用應痛丸主之如四邊赤
腫日增即用勝冰散主之如煩渴不已
疾勢轉增即用勝柳散此疾淺深治法
次第也忌鷄肉濕麵疾愈半年方可食
治癰疽立効方小兒暑月頭額生癰亦可用

洪氏集驗方卷第三

蓯蓉茸附圓平補真元益養脾腎固精壯氣暖胃思食 督府王翰林方 丞相兄舊苦脚氣自服此藥十餘年不作

鹿茸 一兩先用草燒去毛切作片子用酥炙令香熟為度

蓯蓉 四兩酒浸一宿切作片子焙乾

兎絲子 六兩酒浸兩宿炒令半乾擣作餅子焙

牛膝 二兩酒浸一宿切焙

熟乾地黃 二兩炒焙

真烏藥 一兩

川五味子 一兩

附子 一兩炮去皮臍

白术 二兩

血咂盡痛定腫退可用膏藥貼之

紹興中汀州黃守武疽發肩背之間醫藥不瘥用水蛭立効因就寢蓋被稍煖睡覺衣被皆濕以燭視之乃瘡口自出血也水蛭咂盡惡血不曾貼膏藥身煖好血隨路而出急令取池中藕將藕節處泥抹瘡口其血立止按本草云水蛭攻癰腫毒腫取十餘枚啗病處取皮皺肉白無不差冬月中無蛭虫地中掘取暖水中

心頭疼怯寒肢體酸痛飲食少思氣短乏力敬焉悸自汗並能服之用藥如下 督府王翰林方

鹿茸 酥塗炙　附子 炮去臍

白术 炒　陽起石 燒赤

椒紅 炒出汗　成煉鍾乳粉

蓯蓉 酒浸炙　人參 去蘆

肉豆蔻 麵裹煨　川當歸 炒

牛膝 去蘆酒浸一宿　白茯苓

沉香　巴戟 去心上各一兩

甘草一兩炒　白茯苓一兩

陳橘皮一兩湯盪洗一次　厚朴二兩去麁皮用生薑自然汁塗炙紫色爲度

右件同擣爲麁末每服五大錢水一盞半生薑七片棗子二枚煎至七分去滓温服不拘時候

育腸圓治遠近一切赤白痢實腸胃進飲食

當歸一兩　肉豆蔻仁半兩粟米炒以黃爲度

訶子皮炮半兩　黃連去鬚一分

烏梅肉一分　櫻粟半兩炒黃黑色

天麻一兩　補骨脂一兩炒

葫蘆巴一兩炒　茴香一兩炒

乾淡木瓜一兩　沉香一分

木香一錢麵煨　丁香二錢不見火

右件擣羅爲細末酒糊爲圓如梧桐子大每服三五十圓空心臨臥米飲温酒鹽湯下

鹿茸世寶圓諸虛不足心脾氣弱腹脇脹急腸鳴泄瀉腹疼手足厥逆頑痺中滿惡

牛角鰓散

汁吞下溫酒米飲亦得每服三十圓

治五種腸風下血上厠糞前有血名外痔糞後有血名内痔大腸不收名脫肛穀道四面有努肉如妳名妳舉痔頭上有孔腸出名漏並皆治之

黄牛角鰓 一枝 搥碎　蛇脫皮 一條 白者

猪牙皂角 七莖　穿山甲 一處七十鱗

刺蝟 一兩 剉

右件五味入甆瓶子内以黄泥封固候

右件十三味依法修製並爲細末次入
鍾乳粉拌勻煉蜜爲圓如梧桐子大每
服四十粒鹽飯飲或鹽湯送下食前一
日三服
五解散治傷風感寒或內傷生冷頭目昏
痛身體壯熱胷膈不快乾嘔惡心怯風怕
寒體虛自汗
藿香葉一兩去土　人參一兩
白术一兩　半夏二兩湯盪洗七遍

臘藤子 一箇去穰剉碎別碾爲末 猪牙皂角 一兩

白礬 半兩

除臘藤子外右四味入甆瓶内鹽泥封固候乾先以小火燒令煙出方用大火煅令煙盡爲度取出攤冷杵羅細末入臘藤子末和匀每服一太錢温洒調下空心食前服

治五種腸風痔疾 饒州王康孺翰林傳

凡下血皆謂腸風糞後有血名内痔糞

右爲細末蜜煉熟圓大如菉豆許每服十五圓溫陳米飲食前 平江辛太丞傳 有加芎者尤妙

硫附鹽礬圓治經年久病腸風下血不止虛弱之甚者一服見効 已下二方上官彥成駐泊傳

附子 一兩炮去皮臍 別杵爲細末

綠礬 四兩用瓶子盛蓋之火煅食頃候冷取出入鹽一合硫黃一兩同礬研過依前入瓶子內燒如食頃候冷取出再研令勻爲極細末

右件二味藥末同合一處令勻以粟米粥爲圓如桐子大每日空心用生地黃

出於地上用盆合定四畔用土覆之去火毒然後擣羅爲細末患者先用胡桃肉半箇研爛同酒半盞調藥末二錢服之便効

阿魏良薑圓治三脘氣弱中焦積寒脾不磨飲食遲化喫物頻傷胷膈滿悶脇肋疞刺嘔吐噦逆噫醋惡心腹脹腸鳴心腹疼痛噎塞膈氣飜胃吐食飲食減少悉能治之

已下二方上官駐泊傳

乾先以小火燒令煙出後用大火煅令
通赤爲度取出攤開候冷擣羅爲細末
患者先用胡桃一箇分作四分一分臨
臥時細研如糊温酒下便睡先引出蟲
至五更時以温酒調下藥末三錢至辰
時更進一服久年不過三服立効
比金散治腸風下血方及治痔漏又名立
効散 饒州周道太丞傳
蝟皮 一箇 皂角刺 二兩

服大補益脾胃空腸令人能食去寒濕
強中溫暖如素來有沉寒積冷腹中時
作疼痛宜服之或無此證去硇砂常服
溫養中焦有益脾胃
麋茸圓治婦人風虛勞冷一切諸疾或風
寒邪氣留滯經絡氣血冷澁不能溫潤肌
膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能尅
消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾
寒月水不調乍多乍少或月前或月後或

前各外痔大腸頭出謂之脫肛穀道四邊有努肉謂之鼠妳痔頭上出血謂之漏此方通治之

黃牛角腮一箇　猪牙皂角二兩

虵皮一條　穿山甲二兩

大附子一箇炮去皮臍　當歸半兩炒

蒻葉四兩　麝香一錢

蝟皮一箇

右件一處砂瓶內用炭火煅令通赤取

陽起石一兩半夜間用磁罐子盛以酒二升煮一宿水洗焙乾乳鉢研如粉

右十二味同爲細末用酒蜜各等分熬成稠膏子搜和成劑入杵三千餘杵圓如梧桐子大每服三十粒漸加四十粒至五十粒溫酒鹽湯吞下空心日午服之法酒二十兩蜜二十兩慢火同熬成膏子圓

人參大溫中圓治三焦不順脾胃積冷心腹大痛嘔逆惡心兩脇刺痛脅膈滿悶腹脹腸鳴泄瀉頻併溫脾暖胃婺州李麾翰林傳

青皮 三兩　陳皮 二兩

良薑 二兩　紅豆 炒 二兩

桂 去麄皮 一兩　縮砂 去皮 二兩

蓬茂 炮 二兩　草菓子 去皮 二兩

乾薑 炮 二兩　萊菔子 炒 二兩

木香 二兩　硇砂 半錢

阿魏 一分 并硇砂用醋化去砂石研

右和麵煮糊爲圓如菉豆大每服五十粒淡薑湯吞下不拘時候日進二服久

洗淨搗碎入甑中蒸令熟却用所蒸湯淋三兩過取所淋糖櫻汁入銀銚慢火熬成稀膏用以和鷄頭末圓如梧桐子大每服鹽湯下五十圓久服固真元悅澤顏色括蒼吳寅仲久服有奇功此藥稍閑當以車前子末解之

治諸般惡痢腹中攪刺日夕頻併危惡不瘥神應乳香圓

安息一分酒浸瀝三日大滓研爲膏 呵子一錢

淋瀝不斷或閉不通百節酸疼頭頂作痛
相應臍腹腰腿痛痺不仁悉能主治大補
益元臟絶忌羊血解藥力

麋茸 火燒去毛薄切酥塗炙四兩　當歸 去蘆酒浸一宿焙乾二兩

鹿茸 火燒去毛薄切酥塗炙二兩　鹿角膠 麩炒二兩

大黑附子 炮去皮臍二兩　沉香 二兩不見火好者

肉蓯蓉 酒洗薄切焙乾三兩　牛膝 去蘆酒浸一宿焙乾二兩

熟乾地黃 酒洗焙乾秤三兩　赤石脂 一兩真者

破故紙 酒浸一宿炒二兩一方有麝香二兩

五倍子 一兩槌破去塵土 蔓京子 一兩斗洗令淨

右二味同杵爲末每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄滓熱淋洗留滓二服再依前法煎淋洗大能明目去澁痒

治大人小兒一切風虛昏眩神志不爽心氣不寧手足搐跳睡臥不穩虛風圓

麝一錢 五靈脂爲末銀器內炒煙盡爲度秤一兩

白附子 真大者炮烈半兩 天南星 大者炮去皮臍一兩

烏蛇 只用頂後肉去皮酒浸一宿乾秤一兩

人參去蘆頭一兩　白朮一兩剉

陳橘皮去白一兩　紫蘇子揀淨一兩

高良薑一兩剉　官桂去麄皮一兩

川乾薑五錢炮

右件七味爲細末煉蜜爲圓每一兩作十圓每服一圓煎生薑湯嚼下不拘時

水陸二仙丹

取雞頭去外皮取實連殼雜擣令碎曬乾爲末復取糖櫻子去外刺并其中子

丁香草菓散治大人小兒脾虛發熱發潮熱他藥不能治者服之如神 余真州傳

丁香 一錢半揀新辣者　草菓 三箇麵裹煨麵烈爲度

麥門冬 半兩去心湯洗　人參 二錢

茯苓 二錢半　半夏 二錢薑製

甘草 二錢炙　淡竹葉 數葉

右爲麄末分作六服用水一盞半薑三片棗一箇煎七分去滓不拘時服小兒加陳皮二錢去穰

乳香 一分酒少許化開瀝三日再用火焙鎔令乾研爲末

没藥 一分研爲末用安息香膏子和匀用生杏仁不以多少燒令煙出上焙膏子膏日乾爲度

右件四味研爲細末滴冰爲圓如菉豆大每服五圓七圓乳香湯下空心食前日三服加至三五十圓不忌毒物其効如神

治風毒上攻眼目澁痒疼不可忍者或上下臉胝赤爛浮翳瘡肉侵睛神効驅風散

出王氏博濟方

甘草 二兩生用　白附子 半兩

右爲細末以藥末一兩入白麵一兩用新汲水搜和爲圓每一兩分作十圓於新板上排定日內曬之如合須是伏中合

沉香蓽澄茄湯治腰腿間寒濕作痛 饒州雍醫傳

沉香 半兩　南木香 四錢

丁香 四錢　檀香 四錢

蓽澄茄 半兩　片子白薑黃 半兩

蟾頭 一箇大者炭火燒煙將盡取出不令成灰

赤脚蜈蚣 三條全者酒浸一宿焙乾

右除麝外同爲細末絶細再入麝同研匀以醇酒作糊爲圓桐子大每服一圓不拘時候或二圓以人參湯麝香湯嚼下或温酒亦得治小兒慢驚極妙

壯筋骨治脚膝疼痛四斤圓

宣木瓜 去穰切焙乾秤 牛膝 去蘆頭寸剉焙乾秤

蓯蓉 洗堀切焙乾秤 四天麻 細剉已上各半斤

和艾一炷如中指大更用三斡耳子先
着在患人臍中後安艾炷其上只一炷
覺臍腹間有聲即便汗出而愈

治風烏荆圓

川烏頭一兩炮去皮　荆芥穗二兩

右醋麵糊爲圓如梧桐子大每服二十
圓酒或熟水下有疾食空時日三四服
無疾早晨一服少府郭監丞少病風搴
搐頤頷寬䩄不收手承頷然後能食服

右件用無灰酒五升浸春浸五日夏浸三日秋浸五日冬浸十日日足取藥焙乾加附子二兩虎骨一兩虎骨細鎊附子炮去皮尖同爲細末用浸藥酒煮麵糊爲圓如梧桐子大每服五十圓温酒或鹽湯下空心食前服虎骨須用酥炙令蘇

妙應圓治婦人血經不調月事湛濁加之驚憂遂發痰瘧後汗出過多損耗氣血常服滋煖子宮調血養氣池州徐學諭傳

大錢服立差此藥神妙不可具述

良薑湯治陰寒積冷心腹大痛嘔逆惡心手足厥冷心胷不快腰背疼痛 婺州李麾翰林傳

高良薑 一兩 碎炒 官桂 一兩 去皮

當歸 去蘆頭用 一兩 剉炒 乾薑 一兩 炮

人參 一兩去蘆頭 吳茱萸 七錢半 炒

白茯苓 一兩 附子 半兩 炮

右爲細末每服二大錢水一盞半入生薑五片煎至七分去滓腹空服

當歸 去蘆頭二兩　延胡索 去土一兩

澤蘭 取葉一兩半　白芍藥 雪白者一兩

肉桂 去麄皮一兩不見火　牡丹皮 去骨一兩

川芎 一兩　木香 半兩不見火

石斛 去苗一兩　川薑 一兩炮

熟乾地黃 淨洗薄切焙乾秤二兩

右件修製了焙乾搗羅爲細末醋煮麵糊和圓如梧桐子大每服二十粒用溫酒或米飲吞下空心及晚飢服之

右爲細末醋煮稀糊圓如菉豆大不計時白湯下十五粒遇大府通利且止若氣發作失府不通即加至五十粒以通爲度此病須是服此藥令氣塊消然不可驟然多服須待積久消磨每日且只一二服覺得氣消不痛却只一日一服或三日二日一服仍旋服後面散子以補氣

常服散子

神仙透空圓治男子婦人偏正頭疼惡心產後體虛傷風憎寒頭痛洗頭沐浴傷風壯熱頭痛痰厥頭痛腎厥頭痛虛眩項筋緊急應一切頭痛 江州陳太丞傳

天麻 一兩洗　香白芷 一兩

半夏 一兩生用　天南星 一兩

乾薑 四錢生用　川芎 二兩洗

地龍 半兩鎚洗去土淨　川烏 一兩生用去皮尖

草烏 一兩生用去皮尖　細辛 半兩

自後遂苦心腹痛久之腹中結堰遇痛作時往往悶絶移時方蘇而常在夜間是時侍御作辟廱博士京師醫者皆不能治有齋生蜀人史堪載之者醫聞一時乃處此二方服一兩月間遂去根本後二十餘年復因憂悒此疾似欲再作而已微痛即再合服之數日而愈

治婦人產後胎衣不下　鄉人萬應之秘校傳

陳橘紅 三錢　青皮 去白 三錢

粉大甘草 七錢　藿香 去淨土 四錢

白荳蔻仁 半兩　天台烏藥 半兩

人參 半兩　縮砂仁 三錢

右爲細末每服一二錢入鹽點服

灸結胷傷寒不問陰陽二毒只微有氣者

皆可灸下火立効神功散

黃連 七寸爲末　芭豆 七粒去皮新瓦上出油

二味拌勻令患人仰面臥先用三斡耳

熟乾地黄 洗淨焙乾一兩 牡丹皮 半兩

附子 炮去皮尖半兩 金釵石斛 半兩

破故紙 炒半兩 山藥 半兩

肉桂 半兩去皮秤 白蒺藜 炒去刺半兩

巴戟天 去心秤一兩 肉蓯蓉 酒浸一宿一兩切焙

白茯苓 半兩去皮秤 澤瀉 微炒半兩

萆薢 半兩 白术 半兩

右件爲細末用煉蜜和爲圓如梧桐子大每服三十圓至四十圓用温酒或鹽

此六七服即差遂長服之已五十餘年
年七十餘強健鬚髮無白者此藥療腸
風下血尤妙累有人得効下血各服此
而差者一歲之內數人
烏金散治冒暑悶亂不省人事欲死及發
燥引飲無度咽中痰涎不下
不蛀皂角一斤刮去皮猛火炙令成麩炭仍須存性不可使成白灰也秤三兩
甘草一兩炙
右同爲細末以新汲水或溫熟水調三

用竹木夾定外以紙或衣物護之沈存中云長安石使君一日在闌閫中忽有呼其姓第回顧不見明日過市復聞呼聲曰我無求於人以爾有難特來救爾石謝之欲下馬與語其人止之褫衣領中出一書曰有難即用稠人中遂引去石歸視乃此方也石到京師趍朝立馬右掖門外爲他馬所趨折足墮地又爲馬踏手臂折舁至家屢氣絶急合此藥

治氣塊刺痛暮夜即作至不可忍多因氣中傷冷所致久而不治婦人尤宜服之已下二方

信守孟郎中充傳

鱉甲 去裙并膜醋炙半兩　當歸 去尾一兩

木香 半兩　青橘皮 去白一分

枳實 半兩　人參 半兩

荆三稜 半兩　没藥 研一分

血竭 研一分　檳榔 一分

半夏 二錢生用

豆坯散

治喉口熱毒至甚咽喉胷膈內連心肺疼痛飲水不下氣不能出死在須臾名曰馬閉 饒州上官醫傳 乙卯年春連甲寅冬老幼皆患此疾只三四日便死 吳江芒七都特多余合解毒雄黃丸治之

巴豆七粒 去殼膜研如泥

右以坏子一錢同研成膏子每用一字許醋煎皂角汁調令稀稠得所將鵝毛蘸藥掃於喉間良久咳唾出膿血或涎數升然後用第二法其法白礬飛過白僵蚕微切各半兩爲細末每服半錢新

人參 半兩　黃耆 半兩

當歸 半兩　白朮 一分

木香 一分　陳橘皮 去白一分

甘草 二分炙　青橘皮 去白一分

沉香 一分

右爲細末每服三四錢七水一盞薑二片同煎取七八分不計時服遇氣痛時每服添枳實末一二豆許

右陳侍御宜人嘗因不喜悅中食柑

凡產有產後胎衣不合諸血奔入久而血生衝心遂致不救者有產前失血過多胎衣乾澁不下者庸醫不曉例以破血藥治之不知血盡轉澁遂終不救舊有產婦胎衣不下呻吟痛楚聲不可聞忽有人教之用苧麻浸水兩大椀服之即時嘔吐胎衣便下遂得更生

安腎圓治本氣怯弱筋骨無力或時疼痛 信州李諒駐泊傳

湯送下食前空心服

治傷折內外損神授散 予屢用之甚驗

川當歸 半兩洗淨別擣 鉛粉 半兩洛粉最上

鵬砂 二錢

右同研細每服二錢濃煎蘇枋汁調下若損在腰以上先喫淡麵半椀然後服藥在腰以下先服藥後喫麵仍不住呷蘇枋汁更以糯米爲粥入藥二錢拌和攤在上或絹上封果損處如骨碎則更

服且畏半夜痛止後手足皆平復

普救散治四時傷寒渾身發熱四肢疼痛頭重眼疼不問陰陽二證並皆治之 永平龍知監施此藥

蒼术 一斤米泔水浸三日切焙乾　乾葛 半斤切焙

甘草 四兩炙赤色切細

右爲麄末每服二大錢水一中盞煎至七分去滓熱服如要出汗加連根葱白二寸同煎併兩服滓再煎一服不拘時候仍用沙銚不得犯銅鐵器 初發傷寒宜下此藥汗後勿服

汲水調下

肉豆蔻湯治胷膈痞塞不快脾胃有傷景廣傳

肉豆蔻 炮　草果子 去皮

石菖蒲　乾木瓜

良薑　乾薑

厚朴 薑多　甘草 炙各一兩

右等分爲細末每服一錢鹽湯點服

洪氏集驗方卷第三