UNIVERSITY OF MICHIGAN

國立臺灣大學圖書館藏

傷寒要旨藥方

炮炙煎煑例

凡湯皆㕮咀謂剉如麻豆大利湯欲生宜少水而多取也補湯欲熟

凡散皆杵羅細末

凡用生薑大棗竹葉粳米苦蔞實皆煎時入也膠飴朴硝麝阿膠皆湯成去滓後再入煎一沸令勻

凡方稱熬者皆爲炒篩者謂羅

厚朴去皮生薑汁炙

甘草炙

枳實去穰麩炒宜用商州大枳殼佳

牡礪熬

大黃本法用清酒洗今或於飯甑中略蒸

過或濕紙裹微煨

杏仁去皮尖

犀角鎊取屑

棗擘破煮

麦門冬去心杵

半夏湯洗七遍

鱉甲湯浸刮洗淨醋炙焦黄

生地黄如無即用乾地黄五兩當生者一斤

桂削去厚皮至有味處止

芒硝如無只用朴硝

橘皮去穰

附子炮裂去皮每箇作八片

麻黄去根節

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛
寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗
陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下
及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜臥
一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳
前後腫刺之小差外不解過十日脉續浮
者與小柴胡湯脉但浮無餘證者與本湯
不溺腹滿加噦者不治

大青龍湯 二證

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者本湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也

傷寒脉浮緩身不疼但重乍有輕時無少陰證者以本湯發之

小青龍湯 二證

傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而欬或渴或利或噎或小便不利小腹滿或喘

各隨證加減用藥
有法見本方中

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去欲解也本湯主之

乾薑附子湯 一證

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沉微身無大熱者

新加湯 一證

發汗後身疼痛脉沉遲者

麻黃杏子甘草石膏湯 一證

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者與本湯

白虎加人參湯 五證

服桂枝湯大汗出後大煩渴不解脉洪大者

傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾躁而煩欲飲水數升者

傷寒無大熱口躁渴心煩背微惡寒

陽明病若渴欲飲水口乾舌躁

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證者本湯

桂枝甘草湯 一證

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者

茯苓桂枝甘草大棗湯 證

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚

厚朴半夏生薑甘草人參湯 一證

發汗後腹脹滿者

伏苓桂枝白朮甘草湯 一證

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胷起則頭眩脉沉緊發汗則動經身爲振振搖者

芍藥甘草附子湯 一證

發汗病不解反惡寒者虛故也此湯主之

伏苓四逆湯 一證

發汗若下之病仍不解煩躁者

五苓散 七證

太陽病發汗後大汗出胃中乾煩躁不得眠欲得飲水者少少與飲之令胃氣和則愈若脉浮小便不利微熱消渴者

發汗已脉浮數煩渴者

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入則吐名曰水逆本湯主之

本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人渴而口躁煩小便不利者一方云忍之一日乃愈

太陽病寸緩關浮尺弱其人發熱汗出復

梔子豉湯 梔子甘草豉湯梔子生薑豉湯附六證

發汗後水藥不得入口爲逆若更發汗必吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹本湯主之若少氣者梔子甘草豉湯若嘔者梔子生薑豉湯

發汗若下之而煩熱胷中窒者

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者未欲解也

陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憒憒反譫語若加温針必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者

陽明病下之其外有熱手足温不結胷心中懊憹飢不能食但頭汗出者

厥陰下利後更煩按之心下濡者爲虛煩也

梔子甘草豉湯

太陽病發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者本湯

梔子生薑豉湯

太陽病發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若嘔者本湯

梔子乾薑湯 一證

傷寒醫以圓藥大下之身熱不去微煩者

梔子厚朴湯

傷寒下後心煩腹滿臥起不安者

真武湯 二證

太陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗地者

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此爲有水氣其人或欬或小便利或下利或嘔 有加減法見方中

禹餘粮圓 本方闕一證

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰腫者

四逆湯 十三證

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身疼痛清便自調者急當救表救裏本湯

病發熱頭痛脉反沉若不差身體疼痛當救其裏

陽明病脉浮而遲表熱裏寒下利清穀

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脉弦遲者此胷中實不可下也當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也當溫之

自利不渴者屬太陰以其臟有寒故也當溫之

少陰病脉沉者急溫之

厥陰病大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡寒者

傷寒大汗若大下利而厥冷者

下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表

厥陰病嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥者難治

霍亂吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脉微欲絶者

大汗若大下而厥冷者此湯

小柴胡湯　十一證

傷寒五六日中風往來寒熱胷脇苦滿嘿嘿不欲飲食心煩喜嘔或胷中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞硬或心下悸小便不利或不渴身有微熱或欬又有隨證加減法載本方中

血弱氣盡勝理開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作有時

嘿嘿不欲飲食臟腑相連其痛必下邪高痛下故使嘔也本湯主之服本湯已渴者屬陽明以法治之

傷寒四五日身熱惡風頸項強脇下滿手足溫而渴者

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此爲熱入血室其血必結故使作瘧狀發作有時

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下

滿口不欲食大便硬脉細者此爲陽微結必有表復有裏也脉沉亦在裏也汗出爲陽微假令純陰結不得復有外證悉入在裏此爲半在裏半在外也脉雖沉緊不得爲少陰病所以然者陰不得有汗今頭汗出故知非少陰也可與本湯設不了了者得屎而解

陽明病發潮熱大便溏小便自可胷脇滿不去者

陽明病脇下硬滿不大便而嘔舌上白胎者與本湯上焦得通津液得下胃氣因和身濈然汗出而解

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脇下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮者

本太陽病不解轉入少陽者脇下硬滿乾

嘔不能食往來寒熱尚未吐下脉沉緊者
厥陰病嘔而發熱者
傷寒差以後更發熱本湯主之脉浮者以
汗解之脉沉實者以下解之

大柴胡湯 七證

太陽病過經十餘日反二三下之後四五
日柴胡證仍在者先與小柴胡嘔不止心
下急 一云嘔止小安 鬱鬱微煩者爲未解也與本湯
下之

傷寒發熱汗出不解心中痞硬嘔吐而下利者

陽明病發

病腹中滿痛者此爲實也當下之宜大承氣大柴胡

傷寒後脉沉沉者內實也下之解

太陽病未解脉陰陽俱停一作微必先振慄汗出而解但陰脉微一作尺脉實者下之而解

病人無表裏證發熱七八日雖脉浮數者

可下之

小建中湯 二證

傷寒陽脉嗇陰脉弦法當腹中急痛先與本湯不差者小柴胡主之

傷寒二三日心中悸而煩者

柴胡加芒銷湯 一證

傷寒十三日不解胷脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡下之以不得利今反利者知醫以圓藥下之此非其治也

潮熱者實也先宜服小柴胡以解外後以本湯主之

柴胡加龍骨牡礪湯 一證

傷寒八九日下之胷滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者

桂枝去芍藥加蜀漆牡礪龍骨救逆湯 一證

傷寒脉浮醫以火迫刼之亡陽必驚狂卧起不安者

桂枝加桂湯 一證

太陽病燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從小腹上衝心者灸其核上各一壯與本湯所以加桂者以能泄奔豚氣也

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 一證

火逆下之因燒針煩躁者

桃核承氣湯 一證

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下

下者愈其外不解者尚未可攻當先解其外外解已但小腹急結者乃可攻之以此湯

抵當湯 四證

太陽病六七日表證仍在脉微而沉反不結胷其人發狂者以熱在下焦小腹當硬滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也

太陽病身黃脉沉結小腹硬小便不利者

爲無血也小便自利其人如狂者血證諦也

陽明證其人喜忘者必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜忘屎雖硬大便反易其色必黑者

病人無表裏證發熱者七八日雖脉浮數者可下之假令已下脉數不解合熱則消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血

抵當圓一證

傷寒有熱小腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥宜抵當圓

大陷胸圓 一證

病發於陽而反下之熱入因作結胸發於陰而反下之因作痞也所以成結胸者以下之太早故也結胸者項亦強如柔痓狀下之則和此藥主之

大陷胸湯 四證

太陽病脉浮而動數浮則為風數則為熱

動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒者表未解也醫反下之動數變遲膈內拒痛胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下因硬則爲結胸此湯主之若不結胸但頭汗出餘處無汗劑頸而還小便不利身必發黃

傷寒六七日結胸熱實脉沉而緊心下痛按之石硬者

太陽病重發汗而復下之不大便五六日

舌上躁而渴日晡所小有潮熱一云日晡所發心胷大煩從心下至小腹硬滿而痛不可近者

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者此爲結胷也此湯主之但滿而不痛者此爲痞柴胡不中與之屬半夏瀉心湯

小陷胷湯 一證

小結胷病正在心按之則痛脉浮滑者

文蛤散　一證

病在陽應以汗解之反以冷水潠之若灌之其熱被却不得去彌更益煩肉上粟起意欲飲水反不渴者服本湯若不差者與五苓散寒實結胷無熱證者與三物小陷胷湯白散亦可服一云三物小白散

柴胡桂枝湯　二證

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔

心下支結外證未去者

發汗過多亡陽讝語者不可下與本湯和其榮衛以通津液後自愈

柴胡桂枝乾薑湯 一證

傷寒五六日已發汗而復下之胷脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此爲未解也

十棗湯 一證

太陽中風下利嘔逆表解者乃可攻之其

人熱熱汗出發作有時頭痛心下痞硬滿引脇下痛乾嘔短氣汗出不惡寒者此表未解裏未和也

半夏瀉心湯 一證

傷寒五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不爲逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者此爲結胸也大陷胷湯主之但滿而不痛者此爲痞

柴胡不中與之宜是湯 此段已見大陽篇條下

大黃黃連瀉心湯 三證

太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽氣並竭無陽則陰獨復加燒針因胷煩面色青黃膚瞤者難治今色微黃手足温者易愈

心下痞按之濡其脉關上浮者此湯主之

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者表未解也不可攻痞先當解表表解乃可攻痞

解表宜桂枝湯攻痞宜此湯

附子瀉心湯 一證

心下痞而復惡寒汗出者

生薑瀉心湯 一證

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞硬乾噫食臭脇下有水氣腹中雷鳴下利者

甘草瀉心湯 一證

傷寒中風醫反下之其人下利日數十行穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心

煩不得安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故使硬也

赤石脂禹餘粮湯 一證

傷寒服湯藥下利不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之利不止以理中與之利益甚理中理中焦此利在下焦屬此湯復不止者當利其小便

旋復代赭湯 一證

傷寒發汗若吐若下解後心下痞硬噫氣不除者

桂枝人參湯 一證

太陽病外證未除而數下之遂脇熱而利利下不止心下痞硬表裏不解者

瓜蔕散 三證

病如桂枝證頭不痛項不強寸脉微浮胷中痞硬氣上衝咽喉不得息者此爲胷有寒也當吐之宜此散

病人手足厥冷脉乍緊者邪結在胷中心下滿而煩飢不能食者病在胷中當須吐之

白虎湯 二證

傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒百問方表寒裏熱則用白虎此乃反之恐悞也本湯主之

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者

黃芩湯 二證

太陽與少陽合病自下利者與此湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯

傷寒胷中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者此湯

桂枝附子湯 一證去桂加白术湯一證附

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而濇者此湯主之若其人大便硬 一云脾下心下硬 小便自利者去桂

加白术湯主之

甘草附子湯 一證

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者

炙甘草湯 一證

傷寒脉結代心動悸此湯主之脉按之來緩時一止復來者名曰結又脉來動而中止更來小數中有還者反動名曰結陰也

脉來動而中上不能自還因而復動者名曰代陰也得此脉者必難治

大承氣湯 二十一五證

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者知不在裏續在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

陽明病脉遲雖汗出不惡寒者其身必重短氣腹滿而喘有潮熱者此外欲解可攻裏也手足濈然汗出者此大便已硬也屬

此湯若汗多微發熱惡寒者外未解也桂枝湯主之其熱不潮未可與承氣湯若腹大滿不通者可與小承氣湯微和胃氣勿令至大泄下

傷寒若吐若下後不解不大便五六日上至十餘日日晡所發潮熱不惡寒獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣摸床惕而不安（一云順衣妄撮惕而不安）微喘直視脉弦者生濇者死微者但發熱讝語此湯主之一服利

則止後服

陽明病譫語有潮熱反不能食者胃中必有燥屎五六枚也若能食者但硬耳宜本湯下之

陽明病下血譫語者此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而寫之濈然汗出則愈汗出譫語者以有燥屎在胃中此爲風也須下者過經乃可下之下之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足漐漐汗出大便難而譫語者下之則愈

下利脉反滑當有所去下乃愈

下利差至其年月日時復發者以病不盡故也當下之

陽明病下之心中懊憹而煩胃中有燥屎者可攻腹微滿初頭硬後必溏不可攻之若有燥屎者與之

病人煩熱汗出則解又如瘧狀日晡所發

熱者屬陽明也脉實者宜下之脉浮虛者
宜發汗下之與本湯發汗桂枝湯
大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者
此有燥屎也所以然者本有宿食故也
病人小便不利大便乍難乍易時有微熱
喘冒一作怫鬱不能卧有燥屎也
得病二三日脉弱無太陽柴胡證煩躁心
下硬至四五日雖能食以小承氣湯少少
與微和之令小安至六日與承氣湯一升若

不大便六七日小便少者雖不受食一云不大便

但初頭硬後必溏未定成硬攻之必溏須小便利屎定硬乃可攻之

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難身微熱者此爲實也急下之

陽明病發熱汗多者急下之

發汗不解腹滿痛者急下之

腹滿不減減不足言當下之

問曰人病有宿食何以別之師曰寸口脉

浮而大按之反濇尺中亦微而濇也故知有宿食當下之

下利不欲食者以有宿食故也當下之

下利脉遲而滑者內實也利未欲止當下之

下利三部脉皆平按之心下硬者急下之

陽明少陽合病必下利其脉不負者爲順也負者失也互相尅賊名爲負也脉滑而數者有宿食也當下之

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之

少陰病自利清水色純青心下必痛口乾燥者可下之

少陰病六七日腹脹不大便者急下之

小承氣湯 五證

陽明病潮熱大便微硬者可與大承氣湯不硬者不可與之若不大便六七日恐有燥屎欲知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉

失氣者此但初頭硬後必溏不可攻之必脹滿不能食也欲飲水者與水則噦其後發熱者必大便腹硬而少也以此湯和之不轉失氣者切不可攻也

陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必硬硬則讝語本湯主之若一服讝語止者更莫復服

陽明病讝語發潮熱脉滑而疾者本湯主之因與一升腹中轉氣者更服一升若不

轉氣者勿更與之明日又不大便脉反微濇者裏虛也爲難治不可更與本湯也

太陽病若吐若下若發汗後微煩小便數大便因硬者與本湯和之愈

厥陰病下利讝語者有燥屎也宜用本湯

調胃承氣湯 七證

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與此湯

太陽病未解脉陰陽俱停一作微必先振慄

汗出而解但陽脉微者先汗出而解但陰脉微一作尺脉實者下之而解若欲下之宜本湯

傷寒十三日過經譫語者以有熱也當以湯下之若小便利者大便當硬而反下利脉調和者知醫以圓藥下之非其治也若自下利者脉當微厥今反和者此爲内實也本湯主之

太陽病過經十餘日心下温温欲吐而胷中痛大便反溏腹微滿鬱鬱微煩先此時

自極吐下者與本湯若不爾者不可與但欲嘔胷中痛微溏者此非柴胡湯證以嘔故知極吐下也本湯主之

陽明病不吐不下心煩者可與此湯

太陽病三日發汗不解蒸蒸發熱者屬胃也

傷寒吐後腹脹滿者

茵蔯蒿湯 二證

陽明病發熱汗出者此爲熱越不能發黄

也但頭汗出身無汗劑頸而還小便不利渴引水漿者此爲瘀熱在裏身必發黃

傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者

吴茱萸湯 三證

食穀欲嘔屬陽明也此湯主之得湯反劇者屬上焦也此湯主之

少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

厥陰病乾嘔吐涎沫頭痛者

麻子仁圓　一證

趺陽脉浮而濇浮則胃氣強濇則小便數浮濇相搏大便則硬其脾爲約此圓主之

梔子蘖皮湯　一證

傷寒身黃發熱者

麻黃連軺赤小豆湯　一證

傷寒瘀熱在裏身必黃者

麻黃細辛附子湯　一證

少陰病始得之反發熱脉沉者

麻黃附子甘草湯 一證

少陰病得之二三日此湯微發汗以二三日無證故微發汗也

黃連阿膠湯 一證

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧此湯主之

附子湯 二證

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之此湯主之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脉沉者

桃花湯 二證

少陰病下利便膿血者

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者

猪膚湯 一證

少陰病下利咽痛胷滿心煩者

甘草湯 一證桔梗湯附一證

少陰病二三日咽痛者可與此湯不差與

桔梗湯

苦酒湯 一證

少陰病咽中傷生瘡不能言語聲不出者

半夏湯 一證

少陰病咽中痛者 一法以白飲調即云半夏散一法云半夏有毒不當散服以水煎令

小冷少少嚥之當從湯法

白通湯 一證

少陰病下利者

白通猪膽湯 一證

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者本湯主之服湯脉暴出者死微續者生

通脉四逆湯 二證

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉微欲絶身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脉不出者

厥陰病下利清穀裏寒外熱汗出而厥此湯主之

四逆散 一證

少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者

烏梅圓 一證

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此爲臟厥非蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘令病者靜而復時煩者此爲臟寒蚘上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘蚘厥

者此圓主之又主久利

當歸四逆湯 二證

厥陰病手足厥寒脉細欲絶者

下利脉大者虛也以強下之故也設脉浮

革因爾腸鳴者屬此湯

當歸四逆加吴茱萸生薑湯 一證

厥陰病若其人内有久寒者宜服之

麻黄升麻湯 一證

傷寒六七日大下後寸脉沉而遲手足厥

逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止者爲難治本湯主之

乾薑黄芩黄連人參湯 一證

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣小腹者此欲自利也傷寒本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐者

白頭翁湯 二證

厥陰熱利下重者

厥陰下利欲飲水者以有熱故也

四逆加人參湯 一證

霍亂惡寒脉微一作緩而復利利止亡血也

理中圓 作湯加減法見本方二證

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五

苓散主之寒多不用水者與此圓 圓不及湯湯法依兩數又有加減法見本方

大病差後喜唾久不了了胷上有寒當以

圓藥溫之

通脉四逆加猪膽湯 一證

吐已下斷汗出而厥四支拘急不解脉微欲絶者此湯

燒褌散 一證

傷寒陰易之爲病其人身體重少氣小腹裏急或引陰中拘攣熱上衝胷頭重不欲舉眼中生花一作睩膝脛拘急者

枳實梔子湯 一證

大病差後勞復者

牡礪澤瀉散 一證

大病差後從腰以下有水氣者

竹葉石膏湯 一證

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者

蜜煎 土瓜根 大猪膽汁 一證

陽明病自汗出若發汗小便自利者此爲津液内竭雖硬不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根及大猪膽汁皆可爲導

白圓子 此廬州湯晦叔法仲景闕此故載之

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
讀未見書齋弢藏

此書偶從書友得之初不過重其為宋刻而
未知其為何人所著因見直齋書錄解
題有傷寒要旨二卷李檉撰列方千首而
類證於後皆不外仲景知此是李檉所
著也外間無別本刊行故人多不識似此
精妙宋刻人皆目為明板惟余則確然
信之以白金三兩餘購得卷中明之有乾
道辛卯歲刻于姑蘇郡齋字樣後人
以南宋孝宗朝乾道七年鐫板釋之
可云有識不知何人妄說以為即非宋

板示是明朝初年書作疑信參半
語可云無識目録後有跋云崇禎甲申
元宵鰈菴孫道兄見惠向置乱卷中
庚戌端節後雨如瀑布檢出裝好云
云但有圖章向無墨書姓名圖章又
糊塗莫辨未知其為誰何矣今余檢出
裝好適在癸亥端節竟日雨如瀑布
何情景恰相似耶想見讀書人不事
他事日以破紙為性命作消遣光陰
云計古人与余亦同此寂寞尔黄丕烈

此書為乾道辛卯刻于姑孰郡齋其為宋
板固無疑義而卷中惟避丸作圓外此若驚
若玄未有避者宜外人之疑為明刊也頃五
柳主人從都中寄余宋板洪氏集驗方
余開卷見其行款字樣与此相類閱
後刻云姑孰及乾道庚寅云云知一時
刊刻故板式相同迨出此相證見每
葉記刻工姓名有黃憲毛用等人乃知
二書同出二工之手庚辛兩年先後付
雕也然二書顏晦有同有不同者此書
載諸直齋書錄解題而洪氏集驗方

不載洪氏集驗方載諸涎令李氏宋板
書目而此書不傳豈非顯晦各異耶
茲何幸余之並藏兩書耶且是書
失傳已久雖殘編斷簡猶得收向
寶之所見亦可謂罕祕矣因再跋數
語於卷末甲子冬十一月望前三日蕘圃

此書不傳于世久矣故各家書目罕載之後從坊間揷架
見有傷寒要旨籤急取視之其標題曰傷寒要旨方次
行云當塗李檉與幾編輯吳會沈子祿承之校正續補知
已非李書之舊矣即所載諸方叙次略同而分兩法製衣輕
重多寡彼此互异益徵此殘宋本之可寶也要旨一卷沈所
未載更爲絕無僅有之書安得不視爲奇物耶 丁卯孟夏復翁

咸豐丁巳秀水楊象濟觀