

美家富貴是奢華一團和氣過天涯
漢王宋帝皆從習占斷風流第一家

白打場戶

十字為界

如打三間臙絲圍子各濶三尺四間濶四尺以上至入謝濶八尺如九間至十三間止得濶八尺不許加增每間濶四小步兩班並要合千人親看下頭踢喝筹左班踢出班圍外右班出圍便踢下拄贏右班一筹踢脫兩無輸贏左右班不許使雜踢住亦輸不許入步踢不許退步拐

新刻人瑞堂訂補全書備攷二十四卷

○胎教提法

詩曰

三十時辰兩日半二十八九君須美落紅將盡是佳期經水過時徒霍亂霍亂之時枉用功樹頭樹尾覓殘紅解得開花能結子何愁丹桂不成叢

解曰



一日十二時兩日半共成三十時也蓋婦人月信來止是有兩日半假如初一日子時月信來數至初三日巳時是也當此美之落紅將盡乃是月信行至二十八九時也佳期指陰陽交

種子門

○十月受胎圖訣

初月胎形

詩曰

初月胎形如珠露
未入宮羅在裩戶
猶如秉燭在風中
風緊之時留不住

劉五妹云初月受胎一點精華如草上珠露凝未有宮羅也在裩戶之所鄭玄莊云裩戶是繫裩之處未入腹內其形或散或聚如在月信報之

草胎散訣如本婦稟氣薄及病後受者須用

搆也盖此時子宮開而納精也金水即月信若過此時子宮已閉而不納精矣若經水有過不及者是血脉不調宜服後各藥餌也

○結胎受形

詩曰

洞裡桃源何処尋都來一廿三分深交歡之際君須記過却區區枉費心

解曰

洞裏者陰戶也桃源者子宮也在陰戶一廿二分深深入則泄精也且如胎不結而子难成是區區無益也若植桃源定生男產女

此方他或只是氣不和通用安胎和氣散專爲調理懷胎一月滿足少婦害羞時醫家不識設作阻經此胎常有暈惡心不思飲食六脉浮緊可進此藥

當歸　白芍各三錢　枳殼四錢　砂仁　川芎各一錢　甘草六分

右剉散分作二大服每服水一鍾半煎至七分空心熱服

二月胎形

詩曰

二月胎形北極中
如花初綻蓋珠宮
分枝未有宮羅內
氣受陰陽血脉同

二月胎形似花崔氏云其胎一月將足以受血近陰形似桃花分枝葉在母北極中

鄭玄莊云北極者陰戶裡六寸是也其胎入腹未入衣裏

○安胎和飲

凡有慣墮胎者一月間須進兩服保過五個月則不用也專治胎前二三個月多有人家挑磚換石移床鋪蓆傷触胎氣不安虛弱之體多有此證頭暈眼花惡心嘔吐不思飲食宜進此藥

桔梗　藿香　陳皮　蒼朮　砂仁各二錢　黃芩　益智仁各二錢　舊只殼三錢　厚朴　甘草　蘇葉各一錢　小茴香炒一錢五分

○論虛實

詩曰

他虛我實効乾坤以實投虛是的真總是兩家皆寡慾佳期相值始相親

解曰

男寡慾則實女寡慾則虛又值落紅將盡佳期調琴鼓瑟候彼先施陰陽如精先至而陰血後來則血裹精而乾道成如陰血先至而陽精後中血而坤道成且如結胎之後不可攪悅若恣一時之樂胎即動搖至子將成後交媾必多風疾俗謂胎疾

○占男女訣

詩曰

雙歲是雙單是單乾坤爻位兩相安中間正位玄机事產女生男在此間

解曰

上爻爲父下爻爲母中間正位爲下種之月假如父母年俱是單若單月下種是得乾卦爲男父母年俱是雙若雙月下種是得坤卦爲女餘皆倣此如下種之月以得節爲准如正月內得二月節作二月筭若節氣交度之際慎不可交接下種犯之恐成半陰半陽其胎夭折也慎之

易曰陽☰乾爲父☳震爲長男

右用白水煎至七分空心熱服

三月胎形

詩曰

三月胎形似血凝
有宮無室味無真
娘思食味千般愛
苦辣酸鹹並納成

三月胎形似蚕繭崔氏云其月胎形漸〻長如蚕一頭大一頭小形漸〻欲圓未入宮羅劉五妹云已成脐下漸〻有裹其形薄〻包之此三月胎形與二月俱同症

一問虛弱胎氣不和噁心嘔吐或觸動胎氣兼秋天氣寒熱相染照前次第加減用之



有瘧疾加青皮草菓各二錢 不可用常山

卦多陰☴坎爲中男☶艮爲少男

陽卦多☷坤爲母☴巽爲長女

陽是也☲離爲中女☱兌爲少女

○訣法

七七四十九問娘何月有除却母生年再加一十九是男逢單位是女必成雙是男若是女三五入黃泉今有一婦人年二十八歲三月受娠筭是男喜

○法曰

先下四十九子在位然後加上三月受娠三退七還一十共數五十二內除去母生年二十八歲止剩得二十四

有咳嗽加杏仁五味子各一錢

有潮熱不退加黃芩柴胡各三錢

有氣喘急者加沉香五分另磨和藥以服之

四月胎形



詩曰

四月胎形分四肢
入宮胎穩始成兒
食忌兎獐並毒物
免教胎內受邪虧

此月入宮羅之室崔氏云衣裹漸至丹田之所食忌兎獐毒物蒜藠有涎之菜鄭氏云諸毒物食之傷胎及食之傷氣和也

○活胎和氣散

此方專治胎前四五个月身体困倦氣急發

再加上一十九共是四十五是單故生男喜

又一婦人年二十一歲七月受娠先下四十九子加上七月是五十六除去母年二十一止剩得二十五再添一十九共是五十是雙故生女喜

此法最准不誤但要受娠月分明白及母年歲准甚驗〻〻若美得是男而生女或美得是女而生男其兒不過三五歲而入黃泉也

凡婦人有子其事有三年而相尅坟墓不祀此二者非藥可療若病婦服之疾用此藥方有效

熱飲食無味貪睡頭暈四肢痠軟宜進此藥

紫蘇葉四錢半　甘炒　小茴香一錢半

枳殼四錢半　厚朴　香附子各三錢

砂仁二錢　蒼朮　陳皮去白各二錢

右剉散分作四服每服用水二鍾半煎至七分空心服

五月胎形

詩目

五月男女分定時

前人說與後人知

五更在娘臍下轉

男左女右定無疑

○五月胎形訣法

勞傷血氣月候不調將理失宜飲食不節乘風取冷冷氣怯虛結於子臟決難有孕自少有疾多服熱藥天癸早耗終身無子女人血弱子臟冷滯久不生育丈夫勞傷氣四虛傷精氣不濃精清如水精冷如冰不能施化凡此皆不能服其藥耳

夫婦交会宜旺相月

春甲乙　夏丙丁　秋庚辛　冬壬癸

宜避忌日

晦朔弦望虹霓地動日月蒲蝕雷電霹靂天地晦冥大風驟雨大霧大寒大暑日月星辰之下神廟寺觀之中井

此月胎形男女分定周寄云令胎母前行使人喚之左回頭是男右回頭是女男思酸味女思甜味入室之內其胎安穩

○瘦胎飲

此方專治胎前五六個月妊困弱令胎母腹重貪睡飲食不知氣味肚中膨脹胎有些動此藥可進一二服斧聚胎氣精神

當歸二錢　白芍藥　益母草四錢

枳殼四錢　砂仁　香附子各三錢

甘草一錢　茯苓五錢　小茴香二錢半

右剉用清白水一鍾半煎至七分溫熱空心服

灶圈厠之所墳墓尸柩之傍
此受胎非止百倍損於父母及生子或
盲聾瘖瘂頑愚懶狂癃疲多疾不仁
不義不孝不壽

○求男女法

凡月候絕往一日三日五日交会者生
男如月候往二日四日交会者生女
六日以後則不成胎

○月候不調

或在月前或在月後或多或少或違月
不至或一月兩來此時有病主不孕
以藥調經

○月候既調

六月胎形

詩曰

六月胎形生髮毛
却在臍中漸匕高
飲食不同三二月
主娘愁悶又心嘈

六月胎形生髮毛長也崔氏云男魂降動其
左女魄降動其右故在母腹中漸匕浮動
如魚飲水一般

○瘦胎飲

此方專治在前五月內并調治六個月胎若
胎婦有瘦弱者多可服此瘦胎飲二劑護
其胎母身旺若臨產之時氣脉自然調和
易生更無憂患

日月如期而來按時而止其當有娠欲
娠月候調勻顏色肌膚如常但若沉
重煩悶不欲飲食又不知患之所在
脉息平和是孕也如此之症兩月後
經水不通則胎結矣
大凡婦人不孕蓋因月信不調必服此
藥可調

四物湯

當歸去苗 川芎 白芍 熟地黃酒炒 過焙乾

右各等分每服四錢水一盞煎至八
分空心溫服若崩中去血過多者加
膠艾五心熱可服後藥

又有壯健之婦休服其藥胎孕安穩臨分之
時自然精爽

七月胎形

詩曰

七月胎形漸見成
七精開竅有分明
七三二百有餘日
若有胎生亦成人

七精者眼有光鼻有氣耳有聞口知味各道
俱全

呂傳雅難經云七月已定亦有降生者成人
所以胎母行路艱難也

○知母補胎散

調理胎前七八個月胎動如石行步艱難脾

逍遥散

甘炒炙五錢　當歸去芦　茯苓去皮

芍藥　白朮　柴胡各一兩

右㕮咀每三錢水一盞煨姜一片菹荷少計煎至七分不拘時服

如婦人久無子者於五月內採益母連根透風陰乾不犯銅鉄石臼搗爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸溫酒送下服至十個月足次是有效

胎前產後無間諸症皆可服此藥丸逍遥散亦可服也

下聖散

專治婦人氣血兩虛懷姙無所榮養故胃虛弱時有氣急衝心胸前脹滿咳嗽誤食熱毒所以胎氣不安名曰子懸証

知母　蘇葉各二錢　枳殼四錢　益母草

黃芩　滑石各二錢　甘草　香附五錢

白芍二錢

右用白水一鍾煎至七分空心溫服渣再煎次服

八月胎形

詩曰

八月胎形始見真
孩兒腹內有精神
娘眠思食吞難下
困若憂愁躭悶行

此月主孕母心須悶噪思食不止劉五妹云四肢無力瘦削入倦飲食少思或平昔素有墮胎此藥性平滋血養氣必先月可服救貼則無患人宜避忌惱怒宜戒生冷酒醋熱物切宜慎之戒之

人參　白朮　熟地黃　砂仁炒

黃芪各五錢　甘草炙三錢　川芎

當歸　白芍炒各一錢　續斷八分

右用白水煎服

凡难產者三日不下宜服破血行經之藥俱無效余製一方以車前子爲君冬葵子爲佐只殼爲使已服午產一男衆醫皆以爲奇余白本草爲催生食美味如食糠皮令母困弱胎氣傷脾胃不和可用此藥

○和氣平胃散

專治婦人胎前八九個月胎兒長髮以致胎母脾胃虛弱而不調和溫熱相攻五臟六腑不和或變痢疾雜患之病此藥安胎和氣服之即有效驗

厚朴　黃連　茱苓　澤瀉　地榆各五錢

蒼朮三錢　升麻一錢五分　白芍三錢

豆蔻一錢五分　陳皮四錢　柴胡一錢半

甘草一錢

右用白水一鍾半煎至七分空心溫服

以此爲君國風謂採芋莒以防难産何不悟起迷名曰

○催生神應散

車前子一兩　冬葵子三錢　白芷三錢　舊枳殼三錢

右用白水煎不拘時温服

懷娠十月足者無痛脹亦可服連日未産者則加牛膝二錢痛而急墮則入大腹皮八錢欲産不産而無痛障者血虛則加白芍　川芎　川歸尾　紅花

又方單用黃葵子搗爛用紅酒調服即産

九月胎形

詩曰

九月胎娠重如山
母胎欲産得齊全
一夜一升三合血
古人曾見不虛言

凡婦人懷娠到此月数主胎娠時在母左右協下大動胎母知之憂悶不已懶進飲食心下躭驚不得舒暢若患疾苦急服保生如聖散

十月胎形

詩曰

十月滿足欲生胎
四肢膊縫骨脊開
産下要緊加防慎
莫令兒下賊風吹

○保生如聖散

此方專治婦人九個月胎欲産期忽然肚痛先行其水嬰兒不降爲因胎前誤食熱毒之物傷胎不順兒不降生宜服此藥

益母草一兩　砂仁二錢　陳皮一錢
益智仁三錢去皮　當歸四錢弱者多用
大枳殼一兩　砂仁二錢　甘炒六分
白芍四錢

右用白水二碗煎至一碗半不拘時温服

子煩證類

論曰姙娠四月六月多若煩悶按醫經此月胎形滿足四肢開縱方許降生劉五妹云方纔降生莫令兒落地上恐賊風吹之崔氏云初生嬰兒切宜好生包裹務宜慎之

○濟生産宝論

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象效法之有類原茲婦人之病與男子不同者亦有数焉古方以婦人病比男子十分难治不亦言之深乎但三十六病産育亦同男子無之其如外傷風寒暑温内積喜怒憂思飲食房勞虛實寒熱悉與丈夫一同也依源治療可