V
C217.8 8
C47

人瑞堂訂補全書備考卷之廿九

儒醫頭脉訣

○五運六氣歌

甲己化土乙庚金丁壬化木盡成林丙辛化水滔滔去戊癸南方火發明甲己化土運脾脉乙庚化金運肺脉丙辛化水運腎脉丁壬化木任肝脉戊癸化火運心脉初氣立春到春分三氣清明小滿旬三氣芒種并大暑四氣立秋到和分五氣寒露加小雪六氣大寒大雪同

○診脉要法

少年嫌伏弱　老大怕浮洪

醫學門

○諸穴法

風府名舌本在頂後髮際上一寸大筋內宛宛中傷寒病皆因風府所發　浮白二穴在耳後入髮際一寸　上焦寄于胃上口在心下下焦中焦寄于胃中脘下焦寄于胃下口在臍下一寸　期門二穴婦人屈乳頭向下盡處骨間男子及乳小者以一指爲率或人肥人乳下二寸瘦人寸半爲度　氣海在臍下一寸半氣海者男女生氣之處　丹田穴在臍下二寸又有在臍

男以氣爲主　女以血爲宗

○七表脉屬陽

寸脉浮　頭痛傷風汗自流　鼻不聞香大便閉　更兼壅塞在咽喉

關脉浮　眼花肝熱痛於頭　腹脹胃虛兼瀉痢　昏沉好睡目無休

尺脉浮　耳聾精滑夢便漫　大腸結滯肺氣急　女人得此不須憂

三部浮　氣促痰咳本休　肺臟感寒表衛熱　生津補益治無憂

寸脉芤　積血胸中嘔不休　若是腸鳴須急治　爲緣蠱毒在心頭

關脉芤　壅熱癰瘡暗變痒　須知積下三寸即關元穴　關元穴在脐下三寸乃陰陽之門户人身之根本精神之藏聚屬小腸足少陰任脉之會在關一分爲人迎右關一寸爲氣口

○脉脉總賦

欲測疾兮生死須詳脉兮有靈左辨心肝之理右察脾肺之情此爲寸關所主腎即門尺分并三部五臟易識七診九候難明莫夜循環榮衛須有定數男女長幼大小各有殊形復有節氣不同須知春夏秋冬建寅卯月兮木旺脉弦長以相從當其巳午心大而洪脾屬四季遲緩爲宗申酉是金

主爲肺宦　熱則腸癰病可憂

尺脉芤　要知在尺病源求　膀胱有積凝膿血　小便淋漓大不休

三部芤　大腸鳴處血應流　冷熱不調淋瀝病　脉詳左右在心頭

寸脉滑　面赤心煩多嘔噦　大便閉結小便難　更兼頭痛風涎痰

關脉滑　肝熱泪多頭得札　胃寒口臭大腸鳴　飲食不納脾家之

尺脉滑　男子便多腰部乏　女人月信必愆期　經水調症爲結靜

三部滑　氣攻臟腑痛似刮　更加寒熱小便難　四肢困憊宜詳察

爲肺微浮短濇宜逢月臨亥子是乃腎家之旺得其沉細各爲平脉之容既平脉之不衰反見鬼兮命危兒扶母兮疾速母抑子兮退遲得妻不同一治生死仍須各推

假令春得肺脉爲鬼得心脉乃是肝兒腎爲其母脾則爲妻春得脾而莫瘦冬見心而不治夏得肺而難起秋得肝木何疑哉乃論四時休旺之理明五行生剋之機要一隅而爲例則三隅而可知

○診候八式歌

左心小腸肝膽腎右肺大腸脾胃命女人反此背看之尺脉第三同斷病心與小腸居左寸肝膽同歸左關定腎居尺脉亦如然同意調和審安靜肺與大腸居右寸脾胃

寸脉實　面上生瘡風氣疾　女人胎
孕或因驚　陰上生瘡咽閉塞
關脉實　痃癖中焦心氣疾　或傷硬
物發風涎　亦主頭痛眞憂慼
尺脉實　伏陽在內因傷食　胃氣壅
熱骨蒸蒸　食少脾虛宜審的
三部實　陽狂燥急兩眼赤　大小便
秘口焦枯　鬼語發癍風氣逼
寸脉弦　胷中急痛不能言　肺臟結
時心緊逆　更兼驚恐氣相連
關脉弦　本臟氣虛發痕痃　肝乘虛
脹胃口冷　定妨飲食不能言
尺脉弦　須知水注滿丹田　臍下冷

脉從關裏論命門還與腎脉同用心仔細
須尋趁若診他脉覆手取要自看時仰手
認三部須教指下明九候了然心裡印大
腸共肺爲傳送心與小腸爲受盛脾胃相
通五穀消膀胱腎合爲津慶三焦無狀空
有名寄在胸中膈相應肝膽同爲津液府
能通眼目爲清冲智者能調五臟和自然
察認諸家病掌後高骨號爲關管下關脉
形宛然以次推排名尺澤三部還須仔細
看關前爲陽名寸口關后爲陰直下取陽
弦頭痛定無疑陰弦腹痛何方走陽數即
吐兼腦痛陰微即泄臍中吼陽實應知面

痛多盜汗　腰間強硬痛相連
三部弦　瘋癆走上氣相煎　手冷足
痠痛無力　女人風敗血淹延
寸脉緊　遍身痛疼應難忍　腎氣上
攻頭項疼　直言斷盡行須穩
關脉緊　肝氣頭疼心中窘　脇肋應
傷硬物來　欲吐不吐宜詳審
尺部緊　臍下障疼常隱匕　耳聾腎
虛髓精流　陰　痒痛尤難忍
三部緊　伏陽在內須詳診　致令神
亂發癲狂　解熱安魂言有準
寸脉洪　煩燥傷風熱在胸　須當急
治防傳種　凉膈連翹藥有功

赤風陰微盜汗勞兼有陽實大滑應舌强
陰數脾熱并口臭吹微浮弱定心寒陰滑
食滯脾家咎關前關後辨陰陽察病根源
應不朽
一息四至號平和更加一至大無疴三遲二
敗冷危困六數七極熱生多八脫九死十
歸墓十一十二絕魂磨三至爲遲一二敗
兩息一至死非恠遲冷數熱古今傳難經
越度分明載熱即生風冷生氣用心指下
須牢記
春弦夏洪秋似毛冬石依經分節氣阿阿緩
若春楊柳此是脾家居四季在意專心發

關脉洪　翻胃噦逆面赤風　脾臟肝
經俱受熱　更防觸犯貫干胸
尺脉洪　小便赤澁定難通　脚膝酸
疼便自可　忽然蒼黃便爲凶
三部洪　陽症傷寒體似烘　頭痛口
乾腸必結　應先發汗次宜通

○八裏脉屬陰

寸脉微　氣上冲心煩熱時　寒熱虛
驚加譫語　腸中結秘亦何疑
關脉微　氣連胸脇痛無時　腸胃之
間多壅滯　都緣虛熱致如斯
尺脉微　大便冷熱渾無時　心煩脇
脹吼而急　脚膝須麻或有之

細微靈機曉解通玄秘浮芤滑實弦緊洪
七表還應是本宗微沉緩濇遲并伏濡弱
相兼八裏同血營氣衛定息一萬三千
五百通

○諸病脉生死歌

陽毒健亂躁煩死狂言下利可偷生陰毒体
重背強死遍身寒者腹痛生傷寒熱病洪
大生沉而慢者知必死頭痛之症浮滑生
若濇短濇應難治肚腹膨脹浮太瘦虛小
之時應知死下利而微小者生浮而洪者
死瘧期實大頭狂易見功沉細之人徒費
力洪滑何憂女大生最嫌虛小無尋處水

三部微　小腸連胃冷虛醫　敗血漏
腳或白帶　回無顏色骨枯羸
寸脉沉　脾疼嘔吐悶連心　骨蒸寒
熱時翻吐　痰嗽傳尸病已深
關脉沉　腹中痃癖氣來侵　氣冷又
多嫌短促　只因腸內水停深
尺脉沉　脚膝痠疼不可禁　五臟俱
虛肢冷厥　小便淋濁類于淋
三部沉　冷熱不調腹脹心　臟腑既
虛腹脛冷　下元傷憊客邪侵
寸脉緩　項筋拘急相連紆　頭目昏
沉痛有時　舉動自然身體倦
關脉緩　氣憂大腸無嘔亂　口臭脚
氣上身浮大生莫教沉細幽冥之產乳之
喜脉浮洪指下微遲命必傾鼻衄之症宜
沉細應知浮大死爲隣心痛生于沉細浮
大一死何疑中風惟愁急實遲浮不必驚
惶嗜睡急須知寒濇死脉如浮滑定無危墜
血者惟妨實大若沉弱可必其生浮腫最
嫌微細滑而浮者可產脉緊細何憂中惡
一浮大與鬼相期咳嗽久嫌沉伏脉浮濡
指下有生機金瘡傷重愁緊數微細中毒
豈其宜遇久瀉宜見微細倘浮洪不產可
知審積氣常妨虛弱如牢緊厥疾輕稀惟
瘧瘵不應緊大若浮滑儘可施爲多汗者

虛腹脹澎　走注痛胸連背畔
尺脉緩　夜夢鬼交心恍乱　冷極當
知腹有癥　小便餘瀝分明斷
三部緩　背膊多攻邪氣乱　耳鳴本
是腎虛家　宜用神丹常補煖
寸脉濇　必主虛寒在胸隔　時常面
痒似微風　胃氣弱衰詳此脉
関脉濇　两目昏花多醫黑　脾家虛
冷食難消　補益湯丸方脫厄
尺脉濇　臍下雷鳴身冷厥　精淋多
招下部虛　两脚連腰難轉側
三部濇　傷風頭痛分明說　女子有
孕要安胎　無娠多應是敗血

凶干　數嘔吐者吉在細虛產後潮熱怕
急弦緩而滑者何須慮內實者凶于沉細
內虛反喜細沉內外虛死于沉濇得實滑
尚可延年諸失血忌浮洪實喜沉細弱小
之攻腸癖症惟憂濇細滑且大生意無窮

襍病生死脉歌

五十不止身無病數內有止皆知定四十一
止一臟絕却後四年多沒命三十一止只
三年二十一止二年應十五一止一年殂
已下有止看暴病

○暴病歌

兩動一止或三四三動一止六七死四動一

寸脉遲　心中寒氣無時逆
風時面痒　女人思慮亦如之
関脉遲　心慌多食不生肌
寒成癖塊　下焦冷痛早求醫
尺脉遲　脚重身衰爲色迷　恍惚夢
魂驚入水　女人帶下帕風吹
三部遲　腎虛精耗髓枯危　女人敗
血痛如刺　更防有孕或愆期
寸脉伏　積氣在胸心逆促　三焦壅
熱不調和　急用靈砂頻與服
関脉伏　水氣傷身并破腹　胸中痃
癖實難消　何用祈神并禳福
尺脉伏　小便濁澁如泔渥　都緣水

止即八朝以此推排但依次

○形症相反歌

健人脉病號行尸病人脉健亦如之長短瘦
肥並如此細心診候有依稀

○四時五行尅脉歌

春得秋脉定知死死在庚申辛酉裏夏得冬
脉亦如然還如壬癸爲期爾嚴冬診得四
季脉戊巳辰戌應是厄秋得夏脉亦同前
祇爲丙丁相形尅季月季夏得春脉尅在
甲寅病應極直逢乙卯亦非良此是五行
相鬼賊

春得冬脉只是虛更兼補母病自除若得夏

救不能消　腰腫氣膨仍破腹
二部伏　夜來盜汗渾如浴　四肢沉
厥虛熱生　傷寒此症爲陰毒
寸脉濡　力微汗少氣多虛　腹中着
見如雷吼　只爲勞心太過時
關脉濡　腰背身疼面黃虛　下血傷
風常怯冷　切須齒下驗相如
尺脉濡　心中散乱胃中虛　須知筋
弱緣精神　要治關元病始除
三部濡　冷熱成勞五臟虛　下元只
爲多傷敗　耳內蟬鳴病自除
寸脉弱　陽道虛羸精已涸　頭疼虛
熱汗自流　愼戒房惟宜早竟

脉緣心實還應瀉子自無虞夏秋冬脉皆如是在前爲實後爲虛春中若得四季脉不治多應病自除

○襍症生死脉歌

腹脹浮大是出厄虛小命殂須努力下痢微小卻爲生脉大浮洪無瘥日恍惚之病定顛狂其脉實牢保安吉寸關尺部沉細時如此未聞人救得消渴脉數大者滑虛小病深厄難脫水氣浮大可延生沉細應知是死別霍乱之候脉微遲氣少不語大難醫三部浮洪尚救得古今課定更無疑鼻衄吐血沉細且忽然浮大即傾危病人脉

關脉弱　雙目生花時閃爍　眼暈頭
痛腹脹生　徧体忽然潮熱作
尺脉弱　陰中冷痛肌如削　要知陰
絕是爲虛　四体痠疼宜妙藥
三部弱　客風吹面浮腫作　少年得
此死無疑　老耄逢之身安樂

○九道怪脉歌

長脉屬陽述於本位日長按之如持竿狀

狀若持竿舉有餘三關通度復還居三焦壅熱傳歸臟微匕發汗可痊除

短脉屬陰不及本位日短

短脉微生主氣宋曾停宿食腹難寬伏陽蒸內生寒熱湯滌腸中即便安

健不用治健人脉病揔行尸心腹痛脉沉細宜浮大弦長命必殂頭痛短濇應須死浮滑風疾必易除中風連噤遲浮吉急實大數三魂孤魚口氣粗難得瘥面赤如粧不久居中風髮直口吐沫噴藥悶乱豈復蘇咽喉拽鋸水鷄响搖頭上竄氣長噓病人頭面青黑暗汗透毛端恰似珠眼小目瞪不須治詐汗如油病莫生內實腹脹痛蒲盈心下牢強乾嘔頻手足煩熱脉沉細大小便澁死多真外實內熱吐相連下清注谷轉難安忽然診得脉洪大莫費神功定不痊內外俱虛身冷寒汗出如珠微嘔

虛脉 屬陰尋之不足尋之不足舉指無此脉多虛寒在腹恍惚心驚热煩速急投神益免險危

促脉 屬火寸之數已併寸口脉加者來遲寬皆生數而時止併居前積聚要思病見焉常居寸口生斑疹進死無疑退可延

結脉 屬冲或去或來結滯而舉不散或來或去止仍還結脉爲陰仔細看氣病連微利去蓋因積氣在腎間

代脉 屬陰指下尋之數而實起再不復還曰代動而伏起不能還氣多形羸改舊顏口不能言魂魄散盡陽氣耗伐應難

牢脉 屬陰指下尋之即有無曰牢牢脉沉沉病在胸骨間寒痛氣冲冲行經敗血并鼻衄血浮如牢枉用功

動脉 屬陰舉無再七度方逢体倦虛勞利血膿女子崩中宜多治血山崩漏難無功

細脉 屬陰來往難捉其狀如絲極其細小宜服五靈散加姜附猶下尋之極細微脛疲體冷不知時遺精髮直形枯瘦速多關元不可遲

○十死脉歌

脉息如湯鬥沸來殊無息數最難裁三陽數極亡陰候任有灵丹怎救回

泛匕來時歸最饒應指遲疑尾掉搖腎與命門皆憤結且觀夕死是沉消

煩忽然手足脉厥逆体不安寧命必殘上氣喘急候何寧手足温煖凉滑生反得寒逆脉厥逆必知歸死命須臾頃刻而尿血麻瘦形脉大之人命難諛唾血之脉沉弱吉忽加實大死來侵上氣浮腫肩息頻浮濇之脉即相成忽然微細應難救神功用盡也無生中惡腹脹緊細生若得浮大命逡巡金瘡血盛益虛細活急實大數必危身凡脉尺寸緊數形又似釵直吐轉增此患蠱毒惡須救速求神藥命難停中毒洪大命應生細微之脉必危傾吐血但出不能止命應難保過三交手大凡要看生死門太衝脉在即爲憑若動應神魂魂在止而不動命難停

○察色辨生死歌

欲愈之病目背黃眼胞忽陷定知亡耳目口鼻黑色起入口十死七難當面黃目青手亂頻邪風在胃亥其身面黑目白命門敗困極入目死來侵面色忽然望之青進之如黑卒難當面赤目白憂息氣待過十日定存亡黃黑白色起入目更兼口鼻有災殃面青目黃中時死餘後須看兩日強目無精光齒齒黑面白目黑亦遭殃口張魚唇不能合氣出不返命飛揚肩息直視及

隱匿而來還不動胥然語去數數
遊神飛魄散行屍候絕遇盧醫決不
療　湊指連匿三四五往又依前又
復來雀啄粟形無以異此真死候莫
疑情　脉來雙匿如彈石湊指非常
促且堅要知此是真腎脉期于戊癸
定踏泉　指應如刀振及時血枯胃
氣強支持若形閉尺爲凶犯四日之
中命必危　形狀渾然如轉豆屢轉
周旋息數無藏腑空虛真氣憊三元
正氣已漂浮　鮮索脉來無失約散
亂分辨兩畔君根本將亡真死候內
由龍竭外形枯　三息脉來方一止

將欲絕而不復還此名屋漏其死候
穀氣已亡脾絕矣　陰陽錯亂脉難
推應指如麻甚細微而絕胃枯荣衰
熱冥匿竟敵不須

○加減四物湯治經水不調

四物芍苦生地榆安胎芎白艾膠施血
風發熱并頭痛荆芥天麻香附米嘔
逆加參并白禾往來寒熱怎生醫牡
丹皮與乾姜人或用柴胡姜亦奇血
氣痛加蓬禾桂蒲黃胡索五靈脂血
虛竹葉人參入口渴門冬括蔞芎血
血風瘡加荆芥穗牛蒡風秋入青皮
腹脹枳實元川朴頭痛皇荆皇疾藜

傷寒一日二日間發熱頭疼及惡寒腰痛脉
浮真可見此脉從頭連腰還無汗麻黃湯
發散有汗傷風桂枝單大青龍湯表裏實
此屬太陽陽明間傷寒二日三日內目痛身熱
加一倍鼻乾不睡脉來長此脉往來緩者
是無汗惡寒用葛根有汗桂皮湯一劑便
實惡寒大柴胡此屬陽明胃經內三日四
日病轉深耳聾胸脇痛如針寒熱嘔逆口
乾苦此脉循脇絡耳真強盛之脉真可見
小柴胡湯宜酌酌似瘧婦人血結類此屬
少陽膽經尋病傳四日及五日腹痛咽乾
自溫的自利而渴脉微沉脉布脾胃絡咽

唇焦面腫蒼黑也難逃髮鬚錯亂及不語
尸臭元知命不高人中盡蒲兼苛青三日
須教喪九陰兩頰顴赤人疾久口張直氣
命難停足跌趾腫膝如斗十日須知難保
守項筋舒直定知殂掌腫無紋也不久唇
青体冷及遺溺背面飲食四日期手足爪
甲皆青黑能過八日定難醫脊疼腰重反
覆難此是骨絕五日看体重溺赤時不止
肉絕六日便高判手足甲青呼罵多筋絕
九日定難過髮直如麻半日死尋衣鬼語
十知麼

○傷寒六經傳變歌

○當歸散治經候不通

當歸散用五蒲黃灰炒穿山甲與當歸散同作末酒調最利月經方

○杜牛膝散治經閉五心煩熱

杜牛膝散善調經七閉五心煩熱蒸一用經花秘二膝當歸共末酒調行

○資血湯治室女經閉成痨

資血湯中二芍歸桂芎枳殼一冊皮四荆鞭草烏梅引經閉能通効可期

溫經湯治月水行或不行心煩刺痛

溫經湯二桂歸芎莪木丹皮芍藥同四草人參牛膝等不調經候用之攻

嗌四逆理中治臟寒腹滿脉浮桂枝入胸滿痰多瓜吐之此屬太陽脾經脉傷寒五日六日來多眠口燥舌乾訣此脉絡肺緊舌本指下脉沉實腎來舌乾須用小承氣不渴不乾四逆差汗出亡陽循膚屬此屬少陰腎經排傷寒六日七日到煩躁囊縮脉微緩筋急唇青四体皮脉循陰氣絡肝道脉若不浮小建中浮緩如瘧各半妙囊縮陰毒承氣加此屬厥陰肝經類

○傷寒六經正病

太陽頭痛身熱春強陽明目痛鼻乾不眠少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口爲之苦太陰腹滿自利口不知味而津不到咽少陰則舌乾口燥欬吟密則煩滿囊縮一日二日可發表而散三日四日宜和解而痊五六日便實方可議下七八日不愈又復再傳日傳二經名爲兩感經傳六日應無一痊

太陽無汗脉黃爲最太陽有汗桂枝可先小柴胡爲少陽之要領大柴胡行陽明之秘堅至三陰則難拘定法或可溫而或可下宜數變以曲全生意或可方而或可圓

○傷寒表裏

傷寒表症是如何無汗惡寒身熱多頭項俱

○千金不易湯治月水不斷

千金不易湯芎藭地黃芍藥白朮當歸茯苓甘草芍藥頭香附地榆

○小兒神色揔論

凡小兒病宜先觀形症神色然後察脉假如肝之爲病則面青心之爲病則面赤脾之爲病則面黃肺之爲病則面白腎之爲病則面黑先要辨別五臟形症次看眉受盆唇脂氣虛實閒白其標本而治之無不可者

○入門審候歌

觀形察色辨因由陰陽強弱堅柔若見身寒髮足冷要知有執莊皮來鼻

冷便知是瘡疹耳冷惡知風熱症渾身皆熱是傷寒上挑下冷傷食病五指稍頭冷發寒不可當若逢中指獨必定是傷寒中指獨自冷麻痘症相傳女右男分左分明仔細看

○面部觀形察色圖

小兒三歲以下有病須看虎口三關第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳病黑者中毒黃者脾之因也若現于風關爲重過于命關則難治矣

○虎口三關指紋圖訣

風氣命相參
青紅紫白惡病
黃黑水形殘
紅青熱在肝
紫白生驚猶
關中存五色
節節見紋班
未見三關節
相逢可保安
過了三關節
神仙不可攀
男左女右觀之一節留位風關
二節卯位氣關三節辰位命關

秘傳小兒痘疹治訣

大凡觀痘須要識生死辨体實知訣法

來脉浮取攝方施劑汗之和用十神主之傷寒裡症腹心膨不惡寒而惡熱蒸其脉數沉兼自汗汗便秘少之生

○婦人科

婦人一科有專攻餘病皆與男子同獨有胎前并產後血崩經候滯難通常使烏沉和氣飲逍遙散服最多功四物湯中加減用懷胎宜煖莫交逢婦人有病加減與男同

姜附性溫石補諸大孕婦忌用南星半夏乾寒大熱燥性之藥

○藥性賦

夫濟世之道莫先於醫療病之功莫先於藥醫者九流魁首藥者百草根苗圓散末膏藥性先識故云硼砂有爛肉之功巴豆有透腸之力丁香和胃乾姜快胸熟地黃補虛損大有奇功生地黃通血脉也爲至妙青皮陳皮最能理氣石脂龍骨極好生肌良姜性熱得菖蒲好治心疼羊角大寒入大黃可通臟結乳香沒藥止痛爲先荊芥薄荷消風第一金沸草款冬花能醫咳嗽天南星蕪半夏最化痰涎五靈脂專能治氣玄胡索佐之尤良黑牽牛極利小便加滑石並之又美硃砂祛邪伐惡犀角退熱治強痛竹瀝麥冬治膀胱有病芫花甘遂去水腫徧宜盧薈蟾酥療小兒痳患蛇床奇

乃世之良醫若不能知此訣決未必用藥失宜痘疹死症者反用藥調理須危而行生意者反棄而不治其不足誤人命者多矣其症雖云多端然舉其要亦不外乎寒熱虛實四者而已矣以虛而寒者大抵宜用溫補之藥實而熱者宜用清涼解毒之劑抑其太過引其不及歸之於中道而已誠能知是乃爲當世之良醫

○看目脉法歌訣

兩耳紅筋痘必輕　紫筋起耳重沉已
若已用藥相攻解　十個難求三五生

○發熱三朝決生死

一發熱時用紅紙條蘸麻油照心頭皮肉裡若有一塊紅者或遍身百成塊紅者八九日後決死勿治

一發熱時一日遍身即生紅點糊蜜如蚕種樣摸過不碍手者決死勿治

一發熱時腹中大痛腰如被棘及至報痘乾燥而前痘痛猶不止者決死勿治

一發熱時身無大熱腰痛腹不痛過三日後終生紅點堅硬碍手者勿藥者生所謂吉症

一發熱時渾身溫煖不時發驚者痘在心經而出也乃爲吉兆可治而愈

子治諸患亟瘡河北團參亦治咳嗽江南蛤蚧單療肺痿黃連厚腸藥能洗眼明目楓柳下氣又可退翳除昏甘菊花清心利頭赤茯苓利水破氣枳殼厚朴快氣寬腸枯梗枳實開胸快膈香附子破血治鼻骨碎補止痛住疼木香沉香分氣降氣麻黃桂枝發汗止汗當歸活血芎陳退痘生姜止嘔人參潤肺尤佳白术補中肉蔻止瀉甚美川芎石羔最治頭疼柴胡黃芩能除身熱蒼术除濕朱砂去水五味生津烏梅止血川烏草烏入骨搜風附子天雄回陽返本南硫紅豆消食補虛枝子連翹開心利熱葛根止渴又能開發全氣芎藭治頭痛亦可敷瘡退痘

○新增用藥健經賦

人參健脉附子回陽用木香而止氣加枳殼以寬腸半夏化痰不外粉霜桑白桂皮發汗蕪荑甘草麻黃瓜蒂吐痰鬱金退熱升麻乾葛最宜解渴枳柳大黃善能通泄白术乾姜而止嘔荆芥甦風黃芩芍藥以凉心苦參敗血且夫消毒腫黃連瀉火者青蒿雄黃能消於五臟射香通關於百毫茯苓定魂魄以除熱黃芪調中而補損勞心膈疼痛分豆蔻皆栗殼頭痛腦分川芎白

一發熱之時頭面上有一片紅其色如胭脂者六日已後決死勿治

○報痘三朝決生死門

一報痘之時頭面希少胸前背上皆無根窠紅潤頂突碍手有如水珠光澤者上吉也不須下藥而愈

一報痘之時腰腹疼痛不止口氣大臭其痘出紫里色點者決死勿治

一報痘之時自色皮薄而光根全無紅色或瓜帶一點紅三五日如綠豆樣此痘決不能貫濃久後成一胞清水擦破即死不可因其好者妄下藥

一報痘之時口鼻及耳出紅血不止者

石羔桔梗柴胡治傷寒而神効香茹蒼朮療疫癘以功高川烏草烏共何首以行風丁香木香與茴香而止氣紫菀治喘白礬潤肺常山草菓去瘧疾之戰攻香附宿砂解肚腸滯氣行經消積無非莪朮三稜喘咳失聲更加杏仁五味生姜柯子能取聲厚朴陳皮而潤肺知母貝母定氣喘而爲妙羌活獨活治頭痛之眼花竹瀝出聲菉豆破毒牡蠣止汗菖蒲治邪退肺熱下和百部去腎水當於五加治腑去虫黃柏芦薈養味進食青皮麥芽明目兮谷精草淋痛兮海金砂陰風滌掃以全蝎五臟宣通

決死

一報痘之時起紅班如紋者六日後決死

一報痘之時起黑班如痣狀肌肉有形塊黑者即時而死勿可治也

一報痘之時全不起頂如湯泡及燈草火燒者十日決主痒溺而死不可妄治

○起脹三朝決生死門

一報痘三日之後痘當逐漸起脹若紅縱頂絕肥滿光澤者不必用藥此吉兆也

一痘當起脹之時根窠全然不起頭面

必用巴白膜遮精疾藜青礬烏賊骨咽喉腫痛細辛皂角紫荷車豈知姜蕤石斛解手足之拘攣葶藶木通散胸中之積聚乳香沒藥治腰痛之强紫牛蒡防丰消皮間之燥痒五靈脂治血止痛百草霜有功同償朱苓澤瀉分陰陽而利心經枸杞蓯蓉生津液而補腎臟況且木賊洗肝澁泪胡桃注顏益精枝子凉心可無乎通草瞿麥菊花醫眼必用於炉甘決明胡椒快氣以爲妙海螵消瘻而有名巴戟鹿葺而與人延壽地黃犀角止鼻衄而命即長生麻黃桂枝不可妄投大戟芫花更宜斟酌

皮肉紅腫如瓠之狀者決死勿治

一痘當起脹之時遍身痘頂皆黑其有眼如釘孔紫黑者決死勿治

一痘當起脹之時遍身痘陷伏不起者腹中膨脹不能飲食氣促神昏者死

一痘當起脹之時或腰腹痛遍身俱是紫點如蚊虫咬全不發起者決死勿治

一痘當起脹之時黑陷悶亂神氣昏沉者決死勿治

○貫膿三朝決生死門

一痘當起脹三日後根窠紅潤貫膿充滿如黃蠟色二便如常飲食不減言

○引經藥報使

小腸膀胱屬太陽藁本羌活是本鄉三焦膽與肝包絡少陽厥陰柴胡強太陽陽明并足胃葛根白芷升麻當太陰肺脉中焦起白芷升麻葱白鄉脾經少與肺部異升麻兼之白芍詳少陰心經獨活主腎經獨活加桂良通經用此藥爲使豈能有病到膏肓

○六陳

枳殼陳皮并半夏茱萸狼毒及麻黃六般之藥宜陳久人用方知攻効良

○妊娠忌服

一

候也不必下藥

一痘當貫膿之時純是清水皮白而薄與水泡相似三四日遍身瓜破而死也

一痘當貫膿之時痘中乾枯全無血水名空瘡決死

一痘當貫膿之時吐痢不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者決死

一痘當貫膿之時二便不通目閉聲啞腹中脹滿肌肉黑者決死勿治

○結靨三朝決生死門

一痘當靨之時色轉蒼蠟成紫蒲萄色者一二日決從口唇四邊靨內腹中

蚖斑水蛭及蚩虫烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜代赭芫花射大戟蛇蛻黃雌雄牙硝芒硝牡丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥干姜桃仁通硇砂乾漆蟹甲瓜地茅根都不中

○用藥口訣

虛人用補兼下氣壯人清熱要理風醫瘧利便消暑痰病痢下氣解瘧工胎前須用涼冷下產後有熱要帶溫治腫還當清小便化痰血慣須醫風治癇鎮心清痰氣醫血調氣爲上功此是醫家用藥訣後之學者

收至兩眼然額上和脚一齊結靨落
皮而愈此乃吉症也不必驚疑下藥
一痘當靨之時遍身臭爛如拼搭不可
近目中無神氣者決死勿治
一痘當靨之時遍身發痒抓恰無膿者
皮捲如豆殼乾者決死勿治
一痘當靨之時發寒手足顫掉咬牙噤
口者即死
一痘當靨之時目閉腹脹足冷過膝者
決死勿治
一痘當靨之時痘瘢雪白全無血色過
後亦死可用助氣血藥以養脾胃預
先治之

要精通

○十八反

本草明言十八反逐一從頭說與君人參苦
參與砂參細辛玄參及紫參苦參丹參及
前藥一見藜芦便殺人白芨白蘞并半夏
瓜蔞貝母五般真莫見烏頭與烏喙逢之
一反疾如神大戟芫花并海藻甘遂已上
反甘草若還吐蠱用翻腸尋常用之都不
好蜜蠟莫與葱相覩石決明休見雲母藜
芦莫把酒來浸人若犯之都是苦

○十九畏

硫黃原是火之精朴硝一見便相爭水銀莫
與砒霜見狼毒最怕密陀僧巴豆性烈最
爲上便與牽牛不順情丁香莫與鬱金見
牙硝難合京三稜川烏草烏不順犀人參
又忌五靈脂官桂善能調冷氣石脂相見
便蹺蹊大凡脩合看逆順炮爐炙煿要精微

○治傷寒活套

圭萬　川芎　紫蘇　干葛　桔梗　柴胡
茯苓　半夏各等分　甘草減半　○水二鍾姜三片
如瘧痢加烏梅草菓旁熱加茯苓麥門冬
五味子　口渴加木瓜干葛　鼻衄加蒲
黃地骨皮茅根　小便不利加木通朱苓
澤瀉　大便不利加大黃朴硝　咳嗽加

已上二十四日生死形症之說詳矣須
是熟讀玩味則臨症之時便知何証
爲生何証爲死何者當治何者不治
治者決保其生不治者決許其死七
生先見其明如此則手到即痊矣

○小兒痘疹傳經論

凡痘疹之初發者乃壬癸水也水既流
出則其源必乾鮮不作渴是三者金
木土也先獨發達此無所疑發好吉
兆傳於心者其瘡紅蜜是也傳于肝
者其毒少也傳于肺者其疹稀也傳
於脾者其疹疎也傳于小腸者其疹
亦少不能起發者是也傳于大腸者