圖像本草蒙筌卷之二

新安陳嘉謨廷采纂輯

門生　歙邑葉棐　鮑倚　校刊

婿胡一貫　姪晨

潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

草部中

芎藭　味辛。氣溫。升也。陽也。無毒。生川蜀。名雀腦芎者。圓實而重狀如雀腦此上品也用治凡病證俱優。產歷陽。屬廬州府名馬銜芎者。根節大莖細狀如馬銜含止齒根血獨妙京芎關中所種關中古西京多種蒔因而得名功專療偏頭疼台芎出台州。屬浙江只散風去濕撫芎出撫郡。屬江西惟開鬱寬胸。餘產入藥不堪煑湯浴身則可。一名香果。嘗載圖經。秋採曝乾拯疴。形擇重實潔白。油者勿用惡黃耆山茱狼毒。畏硝石滑石黃連。反藜蘆使白芷。乃手少陽本經之藥。又入手足厥陰二經。堪佐升麻。升提氣血

止本經頭痛。血虛頭痛之不可遺。餘經頭痛亦宜用俱各加引經藥散肝經諸風頭面遊風之不可缺。上行頭目。下行血海。通肝經血中之氣藥也。治一切血。破癥結宿血。而養新血。及鼻洪吐血溺血。婦人血閉無娠。治一切氣。毆心腹結氣。諸般積氣併脇痛痰氣疝氣。中惡卒痛氣塊。排膿消瘀長肉。兼理外科。溫中燥濕散寒。專除外感。得牡蠣療頭風旋暈吐逆。得細辛。治金瘡作痛呻吟。同生地黃煎。禁崩漏不止。用陳艾湯調末。試胎孕有無。婦人經斷三四月用此藥服之腹內覺動是孕否則病也所忌須知。單服久服。犯則走散真氣。令人暴亡。務加他藥佐之。中病便已。○蘼蕪係芎苗葉。地產又尚雍州。屬陝西卻風眩止泄瀉。除蠱毒鬼疰。主欬逆驚癇。

謨按芎藭不宜單服久服。犯則走散真氣。令人暴亡。無乃因其氣味辛溫。辛甘發散之過。丹溪嘗此示人也。又古一婦人感患頭風服芎半年。一旦暴死。亦載經註。善戒可嘩。迹此觀之。芎散之禍。信弗輕矣。故今明醫。每用四物湯。治虛怯勞傷。減去其芎。亦鑒此轍。奈何鄉落愚民。罔明藥性。時採土芎煎茶。謂啜香美體氣稍實。僥倖無虞。儻涉虛羸。鮮不蒙其禍者。惟歸天命。果真天作孽耶。抑自作孽耶。

鳳翔府芎藭

永康軍芎藭

芎藥　味苦酸。氣平微寒。氣薄味厚。可升可降。陰中之陽。有小毒。近道俱生。淮南獨勝。開花雖顏色五品。入藥惟赤白二根。山谷花葉

單根重實有力。家園花葉盛。根輕虛無能。反藜蘆。惡硝斛。苦硝石斛畏硝石鼈甲小薊。使烏藥沒藥雷丸。入手太陰肺經。及足太陰脾臟赤白因異。製治亦殊。赤芍藥色應南方。能瀉能散。生用正宜。白芍藥色應西方。能補能收。酒炒纔妙。若補陰酒浸日曝勿見火赤利小便去熱。消癰腫破積堅。主火盛眼疼。要藥。白和血脉緩中。固腠理止瀉痢。爲血虛腹痛捷方。已後數條。惟白可用。得甘草桑爲輔佐。兼主治寒熱腹疼。熱加黃芩。寒加肉桂。與白术同用補脾。與參耆同用益氣。與川芎同用瀉肝。凡婦人產後。諸病。切忌煎嘗。因其酸寒。恐伐生發之性故也。儻不得已要用。桂酒肉桂煎酒漬炒少加。血虛寒人。亦禁莫服。經云。冬月減芍藥。以避中寒。則可徵矣。

謨按芍藥。何入手足太陰也。蓋酸澁者爲上。爲收斂停濕之劑故爾。雖主手足太陰。終不離於收降之體。又至血海。而入九地之下。直抵於足厥陰焉。氣味酸收。又何利小便也。蓋腎主大小二便。用此益陰滋濕。故小便得通。仲景治傷寒。每多月者。卻非以其主寒熱利小便乎。一說芍藥本非通利之藥。因其能停諸濕。而益津液。故小便自利。於義亦通。又何謂緩中也。蓋損其肝者。緩其中。卽調血止痛之謂。丹溪云。芍藥惟止血虛腹痛。然諸痛並宜辛散。此僅酸收。故致血調血調則痛自止。豈非謂緩中也。

澤州芍藥

黃芩 味苦。氣平大寒。味薄氣厚。可升可降。陰也。陰中微陽。無毒。所產尚彭城屬山東。凡用擇深色剔去肉朽。刮淨外衣。薄片咀成。生炒

如式單惡葱實勿令同煎畏丹砂牡丹藜蘆用山茱龍骨引使枯飄者名〔宿芩〕入手太陰上膈酒炒爲宜堅實者名〔子芩〕入手陽明下焦生用最妙宿芩瀉肺火消痰利氣更除濕熱不留積於肌表間子芩瀉大腸火養陰退陽又滋化源常克溢於膀胱內一赤痢頻併可止一赤眼脹痛能消得五味蒙蠣（五味子牡蒙牡蠣）育妊娠得白朮砂仁安胎孕療鼠瘻同耆斂赤豆（黃耆白斂赤小豆）治腹疼同厚朴黃連又煎小清空膏（載丹溪方）單味而清頭腦總除諸熱收盡全功〔子〕研細煎湯治腸澼膿血

耀州黃芩

潞州黃芩

〔黃連〕味苦氣寒味厚氣薄可升可降沉也陰也陰中微陽無毒宣〔連〕出宣城（屬南直隸）肥麄苗少（去苗收者）〔川連〕生川省瘦小苗多（帶苗收者）並取類鷹爪連珠不必分地土優劣日曝待甚乾燥布裹捋（音落）淨鬚苗治諸火邪依各製炒火在上炒以醇酒火在下炒以童便實火朴硝虛火釅醋痰火薑汁伏火（火伏下焦者）鹽湯氣滯火同吳茱萸血瘕火拌乾漆末食積瀉亦可服陳壁土（向東者妙）研炒之（硝茱漆土俱研細調水和炒）肝膽火盛欲毆必求猪膽汁炒又治赤眼人乳浸蒸或點或吞立能劫痛勝烏附（烏頭附子）畏款冬惡芫菊（芫花菊花）玄參忌猪肉冷水爲使黃芩龍骨入手少陰心經巴豆遇之其毒即解可熬膏煎液任合散爲丸香連丸廣木香和攙爲腹痛下痢要藥茱連丸吳茱萸佐助乃吞吐酸水神方如止消渴便多單研蜜爲丸亦効同枳殼治血痔同當歸治眼瘡佐桂蜜煎服空心（黃連爲君佐官桂少許煎百沸入蜜空心服之）使

心腎交於項刻鎮肝凉血（凡治血防風爲上使黃連爲中使地榆爲下使）調胃厚腸益膽止驚癇瀉心除痞滿去婦人陰戶作腫愈小兒食土成疳消惡瘡惡癰卻濕熱鬱熱○又種生羌胡國土因以胡黃連爲名乾如楊柳枯枝折斷一線煙出氣平寒味尤苦甚心內黑皮略淡黃惡玄參菊花亦解巴毒忌猪肉悞食令人洩精療癆熱骨蒸治傷寒欬嗽溫瘧多熱即解久痢成疳竟除補肝膽劫目痛尤靈理腰腎斂陰汗最捷小兒盜汗潮熱婦人胎蒸虛驚並宜用之不可缺也

謨按苦先入心火必就燥黃連苦燥乃入心經雖云瀉心實瀉脾臟爲子能令母實實則瀉其子也但久服之反從火化愈覺發熱不知有寒故其功効惟初病氣實熱盛者服之最良而久病氣虛發熱服之又反助其火也

宣州黃連

廣州胡黃連

桔梗　味辛苦氣微溫味厚氣輕陽中陰也有小毒嵩山（註前）雖盛近道亦多交秋分後採根噬味苦者入藥蘆苗去淨泔漬（洗宋泔漬一宿）焙乾入手足肺膽二經畏白芨龍眼龍膽開胸膈除上氣壅清頭目

散表寒邪。毆脇下刺疼。通鼻中窒塞。咽喉腫痛急覓。中惡蠱毒當求。逐肺熱。住欬下痰。治肺癰排膿養血。仍消恚怒。尤卻怔忡。又與國老（甘草）並行。同爲舟楫之劑。載諸藥不致下墜。引將軍（大黃）可使上升。解利小兒驚癇。開提男子血氣。○〔薺苨〕別種。味甘氣寒。在處山谷生。苗與桔梗似。根甚甘美。可亂人參。土人取蒸扎匾以充人參賣者。卽此是也。善解諸毒。別無所能。蛇蟲毒搗敷。藥石毒生服。以毒藥與之共處。其毒氣自旋消無。野猪被毒箭中傷。亦每食此物得出。

潤州薺苨

蜀州薺苨

和州桔梗

〔桔樓實〕味苦甘。氣寒。味厚氣薄。屬土有水。陰也。無毒。春生山野僻處。苗係藤蔓引長。葉作叉有毛。（似甜瓜葉）花淺黃六瓣。（似葫蘆花）實結拳大。青漸赤黃。皮黃蒂小。正圓者名〔桔〕。皮赤蒂麄銳長者名〔樓〕。名傳雖異。證治相同。霜降採收。囫圇搗爛。或煅蛤蜊粉和（擇紫口者煅研桔樓一斤蛤粉半斤）或研明礬末攙（桔樓一斤明礬四兩）各以新瓦貯盛。置於風日處所。待甚乾燥。復研細霜。明礬者號如聖丹。用薑汁打糊丸就（生薑湯吞下出何良碧方）蛤蜊者勝眞海粉。可多備聽用一年。（出諸證辯疑方）並主痰喘欬哮。服下神効立獲。取〔子〕剝殼。用仁滲油（重紙包裹磚壓滲之）只一度。免人惡心。毋多次。失藥潤性。畏牛膝乾漆。及附子烏頭。惡乾薑。使枸杞味甘補法

捷性潤下氣佳令垢滌鬱開。故傷寒結胸必用俾火彌痰降。凡虛怯癆嗽當求。解消渴生津。悅皮膚去皺。下乳汁。炒香酒調未服（取仁炒香熟爲末酒調一七覆面臥少時）止諸血並炒入藥煎湯（一切血症並治）莖葉搗汁濃煎中暍（音謁）傷暑服効。○又（天花粉）即栝樓根。挖深土者曝乾。刮麄皮淨咀片。善潤心中枯渴大降膈上熱痰腫毒排膿潰瘍長肉。消撲損瘀血。除時疾熱狂敺酒疸去身面黃。通月水止小便利。仍治偏疝。酒浸微煎。如法服之。住痛如刼（先以錦袋包煖陰囊取天花粉五錢以醇酒一碗早晨漬至下午微煎滾於天空下露過一宿次早低凳坐定雙手按膝飲下即愈如未効再服一劑）造（粉）調粥日食。亦潤枯燥補虛。

栝樓根名天花粉（內有花紋天然而成故名之）

衡州栝樓

均州栝樓

（貝母）味辛苦氣平微寒。無毒荊襄多生。苗莖青色。葉如大麥葉。花類鼓子花。近冬採根曝乾聽用。有瓣如聚貝子。故人以貝母名。黃白輕鬆者爲良。油黑重硬者勿用。去心咀片。入肺行經消膈上稠痰。久欬嗽者立効。散心中逆氣。多愁鬱者殊功。仲景治寒實結胸製小陷胸湯。以栝樓子黃連輔斯作主。（因味辛散苦瀉故能下氣今方改用半夏悞也）海藏療產後無乳。立三母散。用牡蠣知母尊此爲君。（煮猪蹄湯調服）足生人面惡瘡。燒灰油敷收口。產難胞衣不出。研末酒服。離懷時疾黃疸

能毆赤眼膚瞖堪點除疝瘕喉痺止消渴熱煩○又丹龍睛係獨顆瓣無分拆儻悞煎服令遍身筋不收持藍汁黃精合飲即解

謨按世俗多以半夏有毒棄而不用每取貝母代之殊不知貝母乃太陰肺經之藥半夏乃太陰脾陽明胃經之藥何得而相代耶且夫欬嗽吐痰虛勞吐血咯血痰中見血咽痛喉閉肺癰肺痿婦人乳難癰疽及諸鬱證此皆貝母爲向導也半夏乃爲禁用若涎者脾之液也美味膏粱炙煿大料皆生脾胃濕熱故涎化稠粘爲痰久則生火痰火上攻故令昏懵不省人事口噤偏廢僵仆蹇澁不語生死旦夕自非半夏南星局可治乎若以貝母代之則束手待斃矣

貝母實



丹龍睛圓無瓣者勿用

貝母

款冬蓋　味辛甘氣溫陽也無毒生常山縣名屬浙江山谷及上黨註煎水傍葉大成叢似葵花出根下如菊百草中惟此不顧冰雪最先春者也原呼鑽凍今名款冬擇未舒嫩蓋採收去向外裹花零殼甘草湯浸一宿待乾揉碎纔煎惡硝石皂莢玄參畏麻黃辛夷貝母仍畏四味芩連耆葙黃芩黃連黃耆青葙使杏仁宜紫菀治肺癰膿血腥臭止肺欬痰唾稠粘潤肺瀉火邪下氣定喘促卻心虛驚悸去邪熱驚癇補劣除煩洗肝明目又毆久嗽燒煙吸之

ヤマフキ　十二六
フキ

晉州款冬花

紫苑　味苦辛。氣溫無毒。近道多生。眞定（郡名屬北直隸）獨勝。根甚柔細。春初採收。水洗淨去頭。蜜浸宿焙用。忌雷丸遠志。惡瞿麥天雄。畏茵陳蒿。使款冬蕋。主欬逆痰喘。肺痿吐膿。治小兒驚癇。寒熱結氣。虛勞不足能補。蠱毒痿躄堪毆。仍佐百部款冬。研末薑梅湯下。共治久嗽。立建神功（款冬、蕋各一兩百部五錢爲末每服三錢生薑烏梅湯送下食後及臨臥時各一服）○女苑　氣味同。漢中（郡名屬陝西）川谷產。一名白菀。惟畏鹵鹹。紫苑缺時用此可代。亦主驚癇。寒熱氣喘。又止霍亂。瀉痢腸鳴。除肺傷欬勤。去膀胱支滿。

解州紫菀

ソシ　十六
ヲニノシユクサ
シヲン

馬兜鈴　味苦。氣寒。陰中之陽。無毒。山谷俱有。野坂尤多。藤蔓繞樹而生。結實如鈴。五瓣去革膜。取向裏匾子。入藥劑。微炒燥爲良。燒煙熏痔瘻。蜃瘡。煎湯劫痰結喘促。去肺熱止欬。清肺氣補虛。○根名青木香。亦爲散氣藥。

信州馬兜苓

ムマノス、十八



滁州馬兜鈴

本香　味甘苦。氣溫。味厚於氣。降也。陰中陽也。無毒。出自外番。來從閩廣。形如枯骨。苦口粘牙。凡欲用之。勿見火日。合丸散。日際熏乾。煎熟湯。臨服投未。氣劣氣不足能補。氣脹氣窒塞能通。和胃氣如神。行肝氣最捷。散滯氣於肺上膈。破結氣於中下焦。毆九種心疼。逐積年冷氣藥之佐使。亦各不同。破氣使檳榔。和胃佐薑橘。止霍亂吐瀉。嘔逆翻胃。除痞癖癥塊。臍腹脹疼。安胎健脾。誅癰散毒。和黃連。治暴痢。用火煨。實大腸。辟瘟疫邪。禦霧露瘴。易老云。總調諸氣之劑。不宜久久服之。

謨按王海藏謂本經云。主氣劣氣不足。藥性論謂安胎健脾。是皆補也。衍義謂瀉胸腹窒塞。積年冷氣。日華子謂除痞癖癥塊。是皆破也。易老總謂調氣之劑。不言補。不言破。諸說不同何也。恐與補藥為佐則補。與瀉藥為佐則瀉。故云然也。

滁州青木香

廣州木香

大茴香（即懷香子）味辛。氣平無毒。鄉落多生。秋月方採。殼有八角。子赤藏中。嚼甚香甜。鹽酒炒用入心腎二臟及小腸膀胱。主腎勞疝氣小腸吊氣。攣疼。理乾熱脚氣。膀胱冷氣腫痛。開胃止嘔。下食。調饌止臭生香。為諸痿霍亂捷方。補命門不足。要藥。療惡腫癰毒。搗根葉汁吞。○又小茴香。家園栽種類蛇床子。色褐輕虛。亦治疝散疼。每同煎取劾飲饌大料。增入尤奇。○別種蒔蘿。出自閩廣。顆粒似蔓椒開口。（俗呼蒔蘿椒內有黑子但皮薄色褐不紅耳）氣味比茴香更辛。散氣除脇肋膨

調饌殺魚肉毒。消食開胃。溫中健脾

大茴香

小茴香

廣州蒔蘿

蘹香子

香附子（即莎草根）味苦甘。氣微寒。氣厚於味。陽中陰也。無毒。近道郊野俱生。高州（屬廣東）出者獨勝。狀如棗核。周匝有毛。秋取曝乾。忌犯鐵器。預春熟。童便浸透。復搗碎。砂鍋炒成。若理氣疼。醋炒尤妙。乃血中氣藥。凡諸血氣方中。所必用者也。快氣開鬱。逐瘀調經。除皮膚瘙癢。外邪。止霍亂吐逆內證。炒黑色。禁崩漏下血。調醋末。敷乳腫成癰。宿食可消。泄瀉能固。毆熱長毛髮。益氣克皮毛。久服利人（辣利之劑）亦當解悟。又引血藥至氣分而生血。故因而稱曰婦人要藥也

謨按本經諸方。用逐瘀血調經。是下氣而推陳也。用治崩漏不止。是益氣而止血也。又云。引血藥至氣分而生血。是又能補。何如言相背戾。用相矛盾耶。雖然。是亦陰生陽長之義爾。但本經未嘗言補。惟下老湯用之。言于老人有益。意有存焉。蓋于行中兼有補。補中兼有行。正如天之所以為天者健。而有常也。健運不息。所以生生無窮。即此理也

澧州莎草

益智 味辛。氣溫。無毒。嶺南州郡。歲歲有生。去殼取仁。研碎入藥。主君相二火。入脾肺腎經。在四君子則入脾。在集香丸則入肺。在鳳髓膏則入腎。三經而互用者。蓋有子母相關意焉。和中氣及脾胃寒邪。禁遺精併小便遺溺。止嘔噦而攝涎唾。調諸氣以安三焦。更治夜多小便。入鹽煎服立効

雷州益智子

縮砂蜜 味辛苦氣溫無毒。產波斯國中及嶺南山澤苗高三四尺許（類高良薑苗莖）葉有八九寸長（闊半寸許）開花近根嬌嬈。結實成穗。連綴皮緊厚多皺。色微赤黃。子八漏一團。粒如黍米。故名縮砂蜜也。秋採陰乾。精製如式。先和皮慢火炒熟。纔去殼取仁研煎。與益智子人參爲使。入脾。與白檀香荳蔻爲使。入肺。黃蘗茯苓爲使。入膀胱腎。赤白石脂爲使。入大小腸。除霍亂。止惡心。卻腹痛安胎。溫脾胃下氣。治虛勞冷瀉。併宿食不消。止赤白洩痢。及休息痢證。總因通行結滯。服之悉應如神。起酒味甚香。調食饌亦妙

新州縮砂蜜（即砂仁）

草菓 味辛氣溫升也陽也無毒惟生閩廣八月採收內子大粒成團外殼緊厚黑皺凡資入劑取子剉成氣每熏人因最辛烈夏月造生魚鱠亦多用此釀成故食饌大料方中必仗以爲君也消宿食立除脹滿去邪氣且卻冷疼同縮砂溫中焦佐常山截疫瘧辟山嵐瘴氣止霍亂惡心

謨按草菓本經原未載名今考方書補其遺缺但性辛烈過甚凡合諸藥同煎氣獨熏鼻則可知矣雖專消導大耗元陽老弱虛羸切宜戒之

草菓仁

白豆蔻 味苦辛氣溫無毒胡國多生嶺南亦產一名肉菓形類彈丸油色肥實佳麵包煨熟用所入經絡推手陽明療心腹脹疼卒成霍亂者可止理脾胃虛冷不消宿食者能溫男婦傷暑血痢有功小兒傷乳吐瀉立効痢疾助之白粥飲吐瀉佐以生薑湯

廣州肉豆蔻

白豆蔻 味辛氣大溫味薄氣厚陽也無毒原出外番今生兩廣苗類芭蕉最長葉如杜若不凋開花淺黃結子作朵生青熟白七月採收入手太陰肺經別有清高之氣散胸中冷滯益膈上元陽溫脾土卻疼退目雲去障止翻胃嘔消積食膨

廣州白豆蔻

草荳蔻　味辛。氣溫。陽也。無毒。交趾（國名）多生。嶺南亦有。苗類杜若梗根似高良薑。花作穗。嫩葉卷之而生。葉漸舒。花漸出。如芙蓉淡紅實結苞。至秋成殼而熟。秋方老。殼方黃。似龍眼微鎮。外皮有稜（如梔子稜）無鱗甲中子連綴（亦似白豆蔻多粒）甚辛香。應時採收。曝乾收貯。入劑剝殼取子。行經惟胃與脾。去膈下寒。止霍亂吐逆。毆臍上痛。逐客忤邪傷。酒毒尤消。口臭即解。

謨按草豆蔻。用治中脘冷疼。鮮有得其真者。市家多以草仁假代。安獲奇功。考究圖經著明形色。俾後醫士過目即知。即但可取効病人。抑亦不受欺於賣者也。

草荳蔻

霍香　味辛甘。氣微溫。味薄氣厚。可升可降。陽也。無毒。嶺南郡州。人多種蒔七月收採。氣甚芬香。市家多攙棉花葉茄葉假充。不可不細擇。爾揀去枝梗入劑。專治脾肺二經。加烏藥順氣散中。奏功于肺。加黃耆四君子湯內。取効在脾。入傷寒方。名正氣散。理霍亂。俾嘔吐止。開胃口。令飲食增。禁口臭難聞。消風水延腫。

蒙州藿香

高良薑　味辛苦。氣大溫。純陽無毒。高良係廣屬郡。今誌改名高州薑。乃地土所生。形多細小而緊。健脾消食。下氣溫中。除胃間冷逆衝心。卻霍亂。轉筋瀉痢。翻胃嘔食可止。腹痛積冷堪毆。○結實秋收。名紅豆蔻。善解酒毒。餘治同前

儋州高良薑

雷州高良薑

胡椒　味辛。氣大溫。屬火有金。無毒。來從南廣。出自西戎。蔓生苗莖軟柔。長僅寸半。延發枝條細嫩。與葉相齊。子結條中。兩兩相對。其葉晨開暮合。合則將子裹藏。陰氣不沾。故甚辛熱。狀如鼠李。六月擣收。番人呼為昧履支。中國稱曰胡椒子。殺一切魚肉菰蕈之毒。調諸般食饌湯飲之需。下氣去風痰。溫中止霍亂。腸胃冷痢可卻。心腹冷痛堪除。療產後血氣刺疼。治跌撲血滯腫痛。食勿過劑。損肺傷脾。○又草澄茄。柄麄帶圓。係嫩胡椒。青時摘取。一云向陽生者為胡椒。向陰生者為澄茄。化穀食。理逆氣。多効消痰癖。止嘔噦殊功。染鬚髮香身。逐鬼氣。除脹傷寒欬噫。亦每用之。○山胡椒所在俱生。顏色烏。顆粒略大。止痛破滯。俗用亦靈。

胡椒

防風　味甘辛。氣溫升也。陽也。無毒。種生沙苑。屬河南根類蜀葵。秋後

採收曝乾入藥。殺烏頭大毒惡藜斂芫薑（黎蘆白斂芫花乾薑）撐堅實脂潤爲良去蘆頭釵股不用係太陽本經之藥又通行脾胃二經職居卒伍卑賤之流聽命卽行隨引竟至盡治一身之痛而爲風藥中之潤劑也治風通用散濕亦宜身去身半已上風邪梢去身半已下風疾收滯氣面頰尤瀉肺實有餘歐眩暈頭顱更開目盲無見故云除上焦風邪要藥儻或誤服反瀉人上焦元氣爲害豈淺淺哉花止痛骨節間亦治風効子消穀胃脘內又調食香葉收採煎湯主風熱汗出

防風

ハマヲホヱ

防已　味辛苦氣平寒陰也無毒多生漢中府（醫陝西）通行十二經畏草薢敍雄黃毒惡細辛宜使殷藥狀與木通近似氣吹亦貫兩頭賣家因難得眞多採似者假代殊不知氣味大異無益有傷凡覓拯疴甚宜細審種因根苗各治名分漢木兩呼漢防已是根破之紋作車輻解黃實馨香木防已是苗皮皺上有丁足子青白虛軟宗此辯認庶不差訛並刮淨麄皮纔咀成薄片漢者主水氣名載君行（音抗）木者理風邪職僉使列故云腰已下至足濕熱腫痛脚氣及利大小二便退膀胱積熱消癰散腫非用漢者不能成功若療肺氣喘嗽膈間支滿併除中風攣急風寒濕瘧熱邪此又全仗木者以取効也

謨按東垣云防已性苦寒純陰能瀉血中濕熱通血中滯塞補陰泄陽助秋冬瀉春夏之藥也譬諸於人則險而健者類之夫

險健者每每幸災樂禍遇有風塵之警必竟借爲亂階然而見善亦喜見惡亦怒如善用之可使禦敵兇暴之人衝突險固之地亦不爲無益者也故凡瞑眩之藥聖人安得因之而便廢耶亦必存之以待善用今夫防已聞其臭則可惡下咽則令身心煩亂飲食減少藥之瞑眩誠爲拇拙至於通行十二經以去濕熱壅塞腫疼反治下注脚氣除膀胱積熱而庇其基則非此不可誠爲行經之僊藥也然雖藥力之能亦在人善用而不錯爾復有不可用者數端今悉舉陳使知警省如飲食勞倦陰虛內熱元氣穀氣已虧之病而以防已瀉去大便則重亡其血此不可用一也如大渴引飲是熱在下焦氣分宜滲瀉之其防已乃下焦血藥此不可用二也如外感風寒邪傳肺經氣分濕熱而小便黃赤甚至不通此上焦氣病禁用血藥此不可用三也若人久病津液不行上焦虛渴宜補以人參葛根之甘溫儻用苦寒之劑則促危亡此不可用四也仍不止如此但上焦濕熱者皆不可用若係下焦濕熱流入十二經以至二陰不通必須審用可也學者宜併覽之

興化軍防已

黔州防已

紫蘇　味辛氣微溫無毒各園圃俱栽葉背面並紫氣味香竄者甚美五月端午日採乾發表解肌療傷風寒甚捷開胃下食治作脹滿易差脚氣兼除口臭亦辟梗下諸氣略緩體稍虛者用宜子研

毆痰降氣定喘潤心肺止欬逆消五膈破癥堅利大小二便卻霍亂嘔吐

紫蘇

簡州蘇

荊芥　味辛苦氣溫氣味俱薄浮而升陽也無毒山谷生在處有作蘇香氣又名假蘇夏末採收陰乾待用須取花實成穗能清頭目上行發表能解利諸邪通血脉傳送五臟下瘀血除濕痺破結聚散瘡痍搗和醋敷風腫疔瘡研調酒理中風强直仍治產後血暈杵末攙入童便

成州假蘇即今荊芥是也

白芷　味辛氣溫氣味俱輕升也陽也無毒所在俱生吳地尤勝氣甚香竄又名芳香根收處暑蛀無是日收則不蛀色選黃澤効速惡旋覆使當歸通行手足陽明二經又爲手太陰經之引使也乃本經頭痛中風寒熱解利之要藥亦女人漏下赤白血閉陰腫之僊丹煊炒黑用作面脂去面瘢散目癢止目淚去肺經風寒治風通用療心腹血痛止痛多宜外散乳癰背疽內托腸風痔瘻排膿消毒長肉生肌一切瘡瘍並用調治與細辛辛夷作料治久患鼻塞如神○葉

名蒿麻道家常採煎湯浴體能殺尸蟲

澤州白芷

ヨロイクサ　十四

細辛　味大辛氣溫氣厚於味。升也陽也無毒。山澤多產華陰（縣名屬陝西）獨良葉類馬蹄。莖如麥蘖其根甚細其味甚辛。藥中惟採根煎故。因名曰細辛也。賣者多以杜蘅假代。殊不知氣雖小異。入口吐人。不可不細擇耳反藜蘆忌生菜畏滑石硝石。惡狼茱（狼毒山茱萸）黃耆。雖手少陰引經乃足少陰本藥。或用獨滑為使。或佐曾青棗根止本經頭痛如神。治諸風濕痺立効。安五臟尤益肝膽。溫陰經旋去內寒利竅通精氣下氣得歸芍牡本芎芷甘草（當歸芍藥牡丹皮藁本川芎白芷甘草）療婦人血閉神方。得決明魚膽羊肝（石決明青魚膽青羊肝）止風淚目疼劫劑寒邪發在裏之表。合麻附三味煎湯（麻黃附子細辛湯載仲景方）口臭及匱齒腫疼。煮濃汁熱舍冷吐過半錢單服。令氣塞命傾

信州細辛

ヒキノヒタイクサ

麻黃　味甘辛。氣溫氣味俱薄。輕清而浮升也。陽也。無毒。青州彭城（並屬山東）俱生。滎陽中牟（並屬河南）獨勝惡細辛石葦。宜陳久年深。凡欲用之。須依法製去根節單煮數沸。傾上沫。用火焙乾。任合丸散煎湯

方不令人煩悶以厚朴爲使入手足四經手太陰經本經之藥陽明經榮衛之藥而又入足太陽經手少陰經也發汗解表治冬月正傷寒如神毆風散邪理春初眞溫疫果勝泄衛實消黑斑赤疹去榮寒除身熱頭疼春末溫瘧勿加夏秋寒疫切禁因時已變溫熱難抵劑之輕揚仍破積聚癥堅更劫欬逆痿痺山嵐瘴氣亦可禦之若蜜炒煎湯主小兒瘡疱患者多服恐致亡陽止汗固虛根節是妙

謨按東垣云麻黃治衛實桂枝治衛虛雖俱治太陽之經其實榮衛藥也肺主衛心主榮麻黃爲手太陰之劑桂枝爲手少陰之劑故冬月傷寒傷風欬嗽者用麻黃桂枝即湯液之源也然麻黃又爲在地之陰陰當下行何謂發汗而升上經云味之薄者陰中之陽麻黃屬陰氣味俱薄薄則陰中有陽可知矣安得不爲輕揚之劑升土而發汗乎但入手太陰經經亦不能離少陰之本體也

茂州麻黃



同州麻黃



葛根 味甘氣平寒氣味俱薄體輕上行浮而微降陽中陰也無毒各山谷俱生成藤曼旋長春初發葉秋後採根入土深者力洪去皮用之効速殺野葛巴豆百毒入胃足陽明行經療傷寒發表解肌治肺燥生津止渴解酒毒卒中卻溫瘧往來散外瘡疹止疼提中胃氣除熱花消酒不醉殼治痢實腸生根汁乃大寒專理天行

時病。止熱毒吐衄去熱燥消渴。婦人熱悶能甦。小兒熱痞堪卻葛粉甘冷。醉後宜食。除煩熱利大小便壓丹石解鴆鳥毒葉敷金瘡搗爛蔓祛喉痺燒灰

成州葛根

海州葛根

蘆靈僊 味苦氣溫可升可降。陰中陽也無毒隨處平澤俱有。不聞水聲者良先於衆草而生莖方數葉相對花開淺碧。根甚密稠。冬月採根陰乾日選丙丁戊巳去蘆酒洗忌茗麵湯消膈中久積痰涎。除腹內痃癖氣塊散爪甲皮膚風中瘀痛利腰膝[illegible]冷疼。蓋性好走。能通行十二經爲諸風濕冷痛要藥也。仍毆癥瘕[illegible]療折傷虛者切禁用之。多服疏人眞氣

石州威靈仙

寧化軍威靈仙

秦艽 味苦辛。氣平微溫可升可降。陰中陽也無毒出甘松龍洞及河陝諸州。長大黃白色爲優。新好羅紋者尤妙。用菖蒲爲使。入太陽手經。養血榮筋。除風疸肢節俱痛。通便利水。散黃疸遍体如金除頭風解酒毒。止腸風下血。去骨蒸傳尸。

石州秦艽

寧化軍秦艽

藁本　味辛苦。氣溫。氣厚味薄。升也陽也無毒。多產河東。亦生杭郡春採根曝三十日成因其根上苗下。狀與禾藁相同。故以藁本爲名爾。惡蘭茹。畏青箱。氣力壯雄。風濕通用。止頭痛巔頂上。散寒邪巨陽經。得白芷作面脂。同木香辟霧露。○實以鬼卿爲譽主風流入四肢

寧化藁本

荊州藁本

蘇州薄荷

味辛苦。氣溫。氣味俱薄。浮而升。陽也。無毒。又名雞蘇。各處俱種。姑蘇龍腦者第一。龍腦地名。在蘇州府儒學前。此處種者氣甚香窠。因而得名。古方有龍腦雞蘇丸。即此是也。五月端午日採乾。與薤作菹。相宜。和蜜炒餞益妙。入手厥陰包絡。及手太陰肺經。下氣令脹滿消弥。發汗俾關節通利。清六陽會首。毆諸熱生風。退骨蒸。解勞乏。善引藥入榮衛。乃因性喜上升。小兒風涎。尤爲要藥。新病瘥者忌服。恐致虛汗亡陽。猫悞食之。即時昏醉。蓋亦物相感爾。

香薷音柔味辛氣微溫無毒三伏堪爲菜蔬兩京亦每栽種入藥拯病隨處可收大葉者種優陳年者効捷主霍亂中脘絞痛治傷暑小便澁難散水腫有徹上徹下之功肺得之清化行熱自下也去口臭有撥濁回清之妙脾得之鬱火降氣不上焉解熱除煩調中溫胃○又有一種名石香薷延生臨水附崖葉細辛香弥甚今多採此拯治亦佳

香薷

麥蕤女萎 味甘氣平無毒泰山山谷多生滁州舒州俱有葉長而狹表白裏青莖幹黃精相同強直似竹有節故一名玉竹又名地節咸取象也根大如指一二尺長色黃多鬚甘美可啖開青花春末結圓實夏初入劑採根竹力刮淨蜜水浸宿文火烘乾勿誤取鈎吻黃精二物俱似萎蕤但萎蕤節上有毛莖斑葉尖處有小黃點爲異須仔細辯認真假考古方多用畏鹵鹹勿加益氣補中潤肺除熱主心腹結氣虛熱濕毒治腰脚冷痛天行熱狂止眥爛雙眸逐風淫四末澤容顏去面黑黯調氣血令體康強○又種女萎辛溫氣味與萎蕤全別似白斂蔓生開白花結細子在荊襄每名曰蔓地楚今人常謬以爲白頭翁採得陰乾去頭上白蓋剉成細片拌豆淋酒蒸從巳至申方取曝用主霍亂腸鳴洩痢灑淅風寒理遊氣上下無常癲癇寒熱消食毆積出汗散邪

謨按萎蕤本經與女萎同條考其諸註有指一物二名有謂自

是二物。又後女萎與前女萎同名。亦云功用並同。信非二物。疑乃剩出一條也。但考陳氏所註謂古方用者。又似差殊。胡洽治時氣洞洩匿下。有女萎丸。治傷寒冷下。結腸丸。亦有女萎。治虛勞小黃耆酒。云下痢者。加女萎。詳此數方所用。乃後加圈女萎緣其性溫。主霍亂洩痢故也。又茵芋酒用女萎。主賊風手足枯痺。四肢拘攣。女萎膏治身體瘰斑剝。乃似前與萎蕤同條女萎緣其主風淫四末。及去黑黯澤容顏。故陳藏器亦謂更非二物。是不然。況此女萎性平味甘。後條女萎性溫味辛。性味既殊。功用又別。安得爲一物乎。又續命鼈甲湯。治傷寒七八日不解。鼈甲湯。治脚弱並用萎蕤。又萎蕤飲主風熱項急痛。四肢骨肉煩熱。萎蕤丸主風虛熱發即頭痛。乃似前與女萎同條。萎蕤緣其主虛熱濕毒故也。二者主治既殊。則非一物明矣。又云萎蕤一名地節極似偏精疑即青黏即華佗所服漆葉青黏散是此也然世無復能辨者。未敢爲信。姑著之以俟明達折衷爾。

滁州萎蕤

舒州女萎

菓耳實　味苦甘。氣溫。葉苦辛微寒。有小毒。本生蜀川。今發各處。一名蒼耳實。小刺多。羊過即粘綴毛中。故又名之曰羊負來也。秋採微炒入藥。最忌猪肉米泔。散疥癬細瘡。遍身瘙癢者立効。毆風濕周痺。四肢攣急者殊功。止頭痛。善通頂門。追風毒。任在骨髓。殺疳蟲濕蠱。主惡肉死肌。益氣開聰明。強志煖腰膝。亦堪久服。明目輕

身。根葉逢端午收藏。辟惡入病家無畏。汁攙小便同飲。去疔腫如神。援安舌下流涎。治目黃好睡。若被犬咬。急服彌佳。痔發肛門。煎湯熏妙

滁州菜耳

天名精　味甘辛。氣寒無毒。各處江湖俱生。平原川澤尤盛。與蔞荷同狀。逢夏秋抽條。花開紫白相兼。葉似菘菜而小。本經別款地菘即此是也。五月採曝。一種數名。辛味似薑。有麥句薑之號。香氣如蘭。有蟾蜍蘭之稱。仍謂蝦蟇藍。因藍狀頗類。又呼天蔓菁。爲蔓菁略同。別說載名天門精。爾雅載名茢蕻豕首。昔劉燼曾拔塞剖麞而蹶起。晉劉燼射一麞剖除臟腑。拔此草塞腹內。麞蹶而起。燼隨而去。草頻剖如此三度。後世復相傳云活鹿草。亦曰劉燼草。名之疊出如許之多。苟弗考詳。寧無疑惑。單用垣衣爲使。專療折傷金瘡。拔腫毒惡疔。下瘀血血瘕。利小便以逐積水。除結熱而止渴煩。追小蟲。去濕痺。亦堪久服。耐老輕身

謨按一種數名者甚多。名各有因者誠少。此名疊出。咸載所因。但既稱活麞之功。當亦著濟人之効。歷考古傳方劑。並無用之。各省明醫絕無識者。有用之藥。不得濟用當時。徒列多名。正所謂雖多亦奚以爲也。

ハマツガナ　十五
イヌノシリ
イノシリクサ

明州天名精

防葵　味甘辛。苦氣寒無毒。一云。有小毒。不生他郡。惟產襄陽。屬荊廣

一本三莖。一莖三葉。中抽大幹。花開幹端。色白如幹開花葱葉類葵葉色青。根若防風香竄故因名防葵也。三月三日。採根曝乾最易蛀損須時曝之依時入水能浮。切勿悞用狼毒二根形頗相類但防葵根浮水狼毒根沉水略少異耳善惡大差用宜謹慎藥劑修合。製法須知。甘草湯浸成塊一宵。黃精汁拌咀片炒燥。主膀胱熱結尿溺不通。治鬼瘧癲癇驚邪狂走。疝瘕腸洩堪理小腹支滿能毆。強志除腎邪。益氣堅筋骨。血氣瘤大如椀摩醋塗上即消。中火者。不可服之。令恍惚如見鬼狀。

ヤマナスヒ　十七

襄州防葵

蛇床子

味苦辛甘氣平無毒在處田野俱產揚州襄州獨勝春生苗葉成叢青碎彷彿蒿狀。開白花細綴百餘一窠。四五月開結黃子輕虛。粒如黍米。近秋收採。背日陰乾。所惡之藥有三。牡丹巴豆貝母。入藥取仁炒用。浴湯帶殼生煎。治婦人陰戶腫疼。溫煖子臟。療男子陰囊濕癢。堅舉尿莖。斂陰汗。卻癲癇。掃瘡瘍。利關節。主腰胯腫痛。祛手足痺。頑大風身癢難當。作湯洗愈。產後陰脫不起。絹袋熨收。婦人無娠。最宜久服。

蛇床子

草龍膽　味苦澁氣大寒氣味俱輕陰也無毒山野俱有苗高尺餘葉類龍葵略尖根同牛膝甚苦故因名草龍膽也須近冬月方採其根甘草湯浸一宵漉出曝乾待用仗貫衆爲使惡防葵地黃止溲痢去腸中小蟲卻驚癇益肝膽二氣胃中伏熱及時行溫熱能除下焦濕腫併酒疸黃腫堪退療客忤瘖氣治癰腫口瘡敵驚癇殺蠱毒酒浸爲柴胡輔佐上行治眼目赤疼努肉必加翳障通用空腹勿服令人溺遺

信陽軍草龍膽

襄州草龍膽

[illegible]　味甘酸氣寒氣味俱厚沉而降陰也陰中微陽無毒淮北雖生不可入藥漢中所出方可拯病蓋因形大而長尾有兩岐爲異耳但易蛀朽須密收藏製宗雷公酒浸曝用畏海蛤文蛤二藥入太陽少陽足經君五苓散中因其功長於行濕佐入味丸內引桂附等歸就腎經去陰汗大利小便瀉伏水微養新水故經云除濕止渴聖藥通淋利水仙丹久服輕身多服昏目葉壯水臟通血脉行乳汁催生實主風痺除濕邪强陰氣益腎服久無子惟面生光

謨按澤瀉多服雖則昏目暴服亦能明目其義何也蓋味鹹能瀉伏水則胞中留久陳積之物由之而去也瀉伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故昏目二者不可不知

十九

邢州澤瀉

瞿麥　味苦辛。氣寒降也。陽中微陰。無毒。生泰山川谷。今處處有之。結實與麥同形。故因名曰瞿麥。立秋收採。風際陰乾。惡螵蛸。使蘘牡（蘘草牡丹）利小便。君主可用。決癰腫。佐使堪爲。去目瞖。逐胎。下閉血出刺。

十六

絳州瞿麥

[illegible]草　味甘淡。氣平。味薄降也。陽也。陽中陰也。無毒。產江淮山谷。如指大藤莖。正月採收。陰乾入藥。因孔節相貫。吹口氣即通。故此得名。去皮咀片。瀉小腸火鬱不散。非他藥可倫。利膀胱水閉不行。與琥珀相等。消癰疽作腫。療脾疽嗜眠。解煩噦。開耳聾。出音聲。通鼻塞。行經下乳。催產墮胎。實結如小木瓜。名曰鷰腹（白瓤黑核）。亦能治翻胃證。除熱三焦。根治項下癭瘤。多取絞汁頓服。○又種心空有瓠與燈草同。乃通脫木。立名憑揉碎用。潔白輕虛可愛。女工每剪飾花。利水使陰竅通和。退腫令癃閉舒泰。更治產後下乳如神。

[illegible]按通草通脫木經云。行水專利小腸。且多他證之治。既爲良藥。當勿傳訛。奈何時醫每以通草認作別條。木通以通脫木。反呼名曰通草。致使市家真僞混賣。悞人甚多。殊不知本草立名。各有意寓。通脫木因瓠中藏。脫木得之。名竟直述。通草藤莖不

甚長大故以草稱木通係俗指葡萄藤莖且大且長特加木字總曰通者孔竅悉同行水利腸固並建効其治他證雖百木通不能及一通草矣齊驅並駕安得謂乎況木通栽多家園皮薄堅確實名葡萄通草產自山谷皮厚軟柔實名鷰腹通脫木輕虛潔白皮木脫除三者內似外殊極易分別名正言順何得悖違只緣堅信耳聞不復詳考經意錯亂顛倒莫覺其非醫悞猶閑病悞深可憫也

ヤケニカズラ　十八

興元府通草

玄參　味苦鹹氣微寒無毒春生深谷莖方葉似芝蔴又如槐柳細長秋取傍根正根初白乾旋紫黑鼻聞微臭咀片忌銅誤犯餌之噎喉喪目古人深戒吳載醫通醫通惡者棗薑柴生薑山果反藜蘆五味可爲君藥惟走腎經強陰益精補腎明目治傷寒身熱支滿忽忽如不知人療溫瘧寒熱往來灑灑時常發顫除女人產乳餘疾毆男子骨蒸傳尸逐腸內血瘕堅癥散頸下痰核癰腫蓋此乃樞機之劑管領諸氣上下肅清而不致濁治空中氤氳之氣散無根浮游之火惟此爲最也

ヨシクサ　十二

江州玄參

沙參　味苦甘氣微寒無毒江淮俱多寃句註前尤妙叢生崖壁上苗高二尺餘葉類枸杞有叉枒根若葵根而筋大近夏花開白色瓣瓣有白粘膠圖經嘗云此爲小異秋後採根曝用中正白實者佳

反藜蘆惡防已乃足厥陰本經藥也治諸毒排膿消腫安五臟益肺補肝止疝氣絞疼散浮風瘙癢除邪熱去驚煩易老用代人參形實不同蓋取味之苦甘瀉中兼補略相類爾

十二

淄州沙參

丹參　味苦氣微寒無毒山谷有在處多莖方稜長尺餘青色葉相對似蔞荷有毛花紅紫夏開根麄長冬採畏寒水石也反藜蘆專調經脉勻善理骨節痛生新血去惡血落死胎安生胎破積聚癥堅止血崩帶下脚痺軟能健眼赤腫可消散癭贅惡瘡排膿生肉辟精魅鬼祟養正毆邪更治腸鳴幽幽滾下如走水狀

ニコタクサ　アニクサ　十二

隨州丹參

青葙子　味苦氣平微寒無毒園圃俱有江淮獨多莖直似蒿青紅葉大如柳柔軟花上紅下白形類鷄冠（即野鷄冠花純白者勝）子黑匾而光粒同莧實六月收取多治眼科去肝臟熱毒上衝青盲臀腫除心經火邪暴發赤障昏花堅筋骨鎮肝益腦髓聰耳莖葉亦妙春採陰乾治風熱瘙癢於皮膚療疥痔蟲蜃於下部止金瘡去血塞鼻衄來紅

按本經款內載曰子名草決明意謂功專治眼特假別名以

美之非真爲決明子也若以爲然則原揭諸簡端何不直書而但曰青葙子乎正猶沙參一名知母龍眼一名益智名同而實異也且別條所載決明子藥粒狀稍大主治尤優世醫弗明或偏執一不免得此失彼大辜藥味之能矣幸而此曰草決明彼曰決明子兩名雖一上下字差略此分別不同讀者不可不識也

アマクサ　十五
ノチイトヤ

滁州青葙子

木賊　味甘微苦無毒苗長尺餘寸寸有節產白秦隴諸郡色青凌冬不凋夏將莖收手搖節淨憑煎湯液任合散丸益肝膽退目瞖暴生消積塊止月經久滴極易發汗大能疎邪得麝香牛角腮治休息痢證得芎歸餘糧石治赤白崩中得桑耳槐鵝療腸風下血得槐子枳殼療痔瘻來紅

トクサ　十五

秦州木賊



惡實即牛旁子　味辛苦氣平無毒原產鄧州屬河南今生各處葉如茵芋葉長大實似葡萄核褐黃殼類粟稗小而多刺鼠過之則綴惹不落故又名曰鼠粘子也秋後採取製宜酒蒸止牙齒蝕疼散面目浮腫退風熱咽喉不利及腰膝風凝陂風濕癮疹盈肌併瘡瘍毒盛生吞一粒即出瘡頭明目補中潤肺散氣

蜀州惡實

敗醬 味苦鹹氣平微寒無毒俗呼苦蕸菜多生深谷中入劑用之夏初收採因似敗豆醬氣故以敗醬為名入足少陰腎經及手厥陰包絡除腫癰排膿散血破癰結催產落胎去疽痔疥瘙卻毒風痿痺鼻洪吐血能止腹痛凝血可推

江寧府敗醬



白蘞 味苦鹹氣平大寒無毒逆道處處俱生根類牛膝短小三月三日收採陰乾惡黃耆大黃乾薑及乾漆山茱大棗主中風身熱支滿忽忽人事不知療溫瘧寒熱痠疼洗洗有時發作狂惑鬼邪堪卻傷中淋露可除利氣益精下水滲濕

滁州白薇

白前 味甘辛氣微溫無毒出江浙蜀川生洲渚砂磧葉如柳樹葉苗似完花苗根麄長與牛膝頗同但堅脆音翠而柔軟鮮有凡資入藥秋後採根甘草湯浸一宵折去蕻鬚焙用欬嗽上氣能降胸膈

逆氣堪毆。氣壅膈倒睡不得者殊功。氣衝喉呼吸欲絕者立効。仍治氣塞咽嗌時作水鷄聲鳴。故古人氣嗽方中。每每用之不遺。亦以其善主一切氣也。又能保定肺氣。溫藥佐使尤奇。

謨按白薇白前近道俱有。苗莖根葉形色頗同。儻誤採收。殺人頃刻。必辯認的實。方入藥拯疴。白前似牛膝麁長堅脆易斷。白薇似牛膝短小。柔軟能彎。仍噬汁味相參。庶不失。於差悞。此醫家大関鍵匪特一藥爲然。凡相類者。俱不可不細察爾。

成州白前

ノカヾミ　カヾミクサ　十三

舒州白前

白鮮　味苦鹹氣寒無毒。山谷俱有。苗莖只餘（嫩可作茹）葉稍白。似槐葉尤繁。花淡紫（四月開）如蜀葵略小。根與蔓菁彷彿。心實皮色白黃。二月採根取皮。差晚則虛惡也。因鼠作羊羶氣息。故俗加羊字呼名。（俗呼爲白羊鮮）惡桔梗螵蛸。及茯苓萆薢。療遍身黃疸濕痺。手足不能屈伸。治一切癩毒風瘡。眉髮因而脫落。消女人陰腫。或產後餘疼。止小兒驚癇。併淋瀝欬逆時熱發狂。飲水多多。煎服尤宜。葛洪治鼠瘻有膿。熬白鮮皮膏。吐出立愈。李兵部理肺嗽不已。製白鮮皮湯。飲下即差。

ヒツジクサ　十三

滁州白鮮

薇銜　味苦氣平微寒無毒素問名曰麋銜南人謂之吳風草也根莖赤黑花開淺黃葉叢生似莞蔚有毛種兩般分大小各喚大者名大吳風草小者名小吳風草麋鹿有疾銜此草差素問之名又因此出產漢中川谷及寃句邯鄲屬陝西秋採莖葉陰乾須得秦皮爲使主風淫濕痺致歷節痠疼療吐瀉驚癇及鼠瘻癰腫卻熱除痿蹙逐水消暴癥婦人服之絕產無子

謨按神農經中藥之靈者不計千百何獨麋銜矢醴並著素問擅名滑氏讀鈔亦嘗論及乃曰矢醴麋銜治人疾也豈誠二藥果有過乎諸藥之能以致喋喋贊美之如是邪蓋緣上古之人俗尚質朴人所病者多中實邪二藥專攻正與相對用每輒効故錄其名中古以來咸溺酒色病之着體虛損居多藥宜補調難行攻擊由是鷄矢淬酒無復下咽麋銜之名絕不聞耳正孟子所謂彼一時此一時故也不然利前之藥豈有不利於後乎

薇銜

菴蕳子　味苦氣微寒微溫無毒苗如蒿艾處處叢生十月採實陰乾荊實薏苡爲使江南人家亦多種此以辟蛇也消食明目益氣輕身主女人經澁不通扶男子陽痿不舉消水氣作脹散瘀血成癰打撲折傷風寒濕痺腰膝重痛骨節痠疼多服獲効全安久服延年不老

寧州菴蔺子

ヒキヨモキ　十五

狗脊　味苦甘。氣平微溫無毒。深谷多生。在處俱有。根採類金毛狗脊。故假爲名。酒蒸須從巳至申。纔咀入劑。惡敗醬。使草薢。治腰背强疼。關機緩急。理脚膝軟弱。筋骨損傷。女子傷中欠調。老人失溺不節。周痺寒濕。並可醫痊。

溫州狗脊

イヌワライ　十二
ゼンマイ

茵陳蒿　味苦辛。氣平微寒。陰中微陽。無毒。隨處俱產。泰山者良。葉細青蒿。雖同。葉背白色却異。秋後葉落。莖梗不凋。至春復發舊枝。故因名茵陳蒿也。所行經絡。惟足太陽。專治疸症發黃。入劑。使爲君主。佐梔子附子。分陽熱陰寒。陽黃熱多。有濕有燥。濕黃加梔子大黃湯服。燥黃加梔子橘皮湯煎。如苗澇則濕黃。苗旱則燥黃。濕則瀉之。燥則潤之意也。陰黃寒多。只有一證。須加附子。共劑成功。解傷寒大熱。仍除退瘴瘧。風熱悉逐。行滯止痛。寬膈化痰。久服輕身益氣耐老。

江寧府茵陳

カワラヨモキ　十五

絳州茵陳蒿

〔草蒿〕即青蒿　味苦氣寒無毒。山谷川澤隨處有生。葉實根莖並堪入藥。春夏採用。莖葉爲宜。入童便熬膏。退骨蒸勞熱。生搗爛絞汁。卻心痛熱黃。瘜肉腫癰。燒灰淋濃湯點。洩痢鬼氣。研末調米飲吞。秋冬用之。取根與實。實須炒過。根乃咀成。愈風瘮疥瘙。止虛煩盜汗。開胃明目。辟邪殺蟲。○〔白蒿〕即蓬蒿。別名。似青蒿而葉麄上有白毛錯澁　補中氣。治濕黃。長毛髮殊功。○〔邪蒿〕似青蒿細軟利。腸胃通血脈。續不足有功。○〔牡蒿〕葉長齊頭。一名齊頭蒿　充皮膚血脈滿盛。○〔角蒿〕花罷作角。主口齒疳。慝惡瘡。○〔藨蒿〕比小薊略殊。下氣破血。○〔茼蒿〕與黃菊近似。安心養脾。○又〔馬先蒿〕類芫蔚葉。俗呼虎麻芫蔚。亦理風濕癩瘍。

謨按諺云。三月茵陳四月蒿。人每誦之。只疑兩藥一種因分老嫩而異名也。殊不知葉雖近似。種却不同。草蒿葉背面俱青。且結花實。茵陳葉面青背白。花實全無。況遇寒冬。尤大差異。茵陳莖幹不凋。至春復舊。幹上發葉。因幹陳老。故名茵陳。草蒿莖幹俱凋。至春再從根下起苗。如草重出。乃名草蒿。發舊幹者。三月可採。產新苗者。四月纔成。是指採從先後爲云。非以苗分老嫩爲說也。

茅根　味甘氣寒無毒曠野平原無處不產本爲蓋屋草俗呼過山龍收採洗去衣皮掐斷忌犯鐵器甘美可啖斷穀甚良下淋利小便通閉逐瘀血除客熱在腸胃止吐衄因勞傷解渴堅筋補中益氣苗破血且下水腫花止血仍署金瘡又有茅針一名茅笋禁崩漏塞鼻洪腫毒未潰服之一針便潰一孔屋茅陳久酒浸煎濃吐衄血來服亦即止爛茅老屋上及蓋墻者得醬汁和研斑瘡蠶咬瘡可敷屋四角茅收治鼻洪尤驗取茅屋滴溜水飲殺雲母石毒須知○又種管音茲花甘溫無毒亦止吐衄可貼多瘡



倍者　味辛氣溫有毒西域多有蜀浙亦生葉青似茅故此爲譬其根獨莖而直旁附細根內肉黃白多涎外皮麄褐二月八月採根曝乾梵語呼阿輪乾陀南人呼婆羅門蜜咀禁鐵器製浸米泔去赤汁毒出無防忌雨般牛肉牛乳主心腹冷氣不能食療腰足攣痺不能行丈夫虛損勞傷老人失溺無子益肌膚明耳目助陽道長精神久久服之通神强記傳云十斤乳石不及一斤倍茅亦表其功力爾誤服中毒舌脹者急飲大黃朴硝數杯仍以末摻舌間遂旋愈也

甘蕉根　味甘。氣大寒無毒。種類不一。地產亦殊。川蜀者。作花大萼堪觀。卷葉中抽幹作花。初生大萼如倒垂菡萏。閩廣者結實極美可啖。他處雖有。花實俱無。近歲都下。往往種之。並係芭蕉莖葉頗同。實非共一種也。此指有子者爲是。須待立秋後採根絞汁服。主天行狂熱悶煩誤服金石燥渴。產後脹悶。奇効悉臻。搗爛敷去小兒赤遊丹毒。大人發背癰疽風瘮頭瘡。神功立應。蕉油在於皮內。竹筒插入吸來。如取漆法煩渴飲差鬚髮塗黑。暗風癇悶暈欲倒。急飲下一吐便甦。子生青熟黃可曝乾寄遠。北地以爲珍果。食每蒸熟取仁。潤心肺生津通血脉填髓。○芭蕉根性雖相類。醫方內不載拯疴。但吸其油亦能黑髮。

芭蕉花

甘蕉根

景天　味苦酸。氣平。無毒。一云有小毒。人家園亭多以盆植莖葉堅厚。隨插隨生。俗名掛壁青。謂無土養不瘁。又名慎火草。因治火瘡立差。煎湯浴小兒熱刺痱瘡。搗爛敷小兒赤遊丹毒。金瘡蠱毒兼療風驚熱燥。總醫。花香細淺紅。帶赤白能止。

景天

徐長卿　味辛氣溫無毒淄齊淮間俱有畢濕川澤皆生春煖茂榮冬寒枯槁葉如柳葉兩兩相當根類細辛匾匾短小氣齅亦似三月採收麄杵以少蜜拌勻磁甑蒸三伏曝用去蠱毒疫疾殺鬼物精邪溫瘧祛惡氣逐久服强悍輕身延年

徐長卿

黃藥根　味苦氣平無毒藤生三四尺高莖根[illegible]類萬州屬廣東人者緊重他處者輕虛十月採根外科多用主咽喉痺塞及諸惡腫毒瘡疽治蛇犬咬傷併馬走心肺積熱生搗取汁亦含亦塗子肉味酸消癭甚捷收須浸酒日飲數杯見効即停不爾項縮

黃藥

黃藥根



石龍芻　味苦氣寒微溫無毒生長山谷濕地九節多味者良又名龍鬚織席堪用五月採莖日曝九月採根陰乾通小便不利熱淋除內傷不足虛瘀殺鬼疰惡毒去尿管澁疼潤皮毛槁枯卻心腹邪氣久服延壽明目輕身○敗蘆煎湯治淋亦効

石龍芻

石龍芮　味苦氣平。無毒。雖生川澤。惟出益州（蜀州四）一叢數莖。一莖三葉。葉芮芮短小多缺。子綴綴色黃味辛。（如葶藶）又云。有兩種類。水生者。葉光澤子圓。陸生者。葉有毛子銳。入藥劑內。水生者佳。二月八月採皮。五月五日收子。以大戟爲使。畏蛇蛻吳茱。平胃氣欠和。胃熱作痛。補陰氣不足。莖冷失精。風寒濕痺。齊敺。心腹邪氣竟解。通利關節。悅澤皮膚。久服明目輕身。令人結孕育子。其陸生者。天多另名。取少葉。揉繫臂上一宵。作大泡。狀如火熛。焮赤善惡懸隔。不可不知。

石龍芮

絡石　味苦。氣溫。微寒。無毒。陰山峻壁隨處有之。多包絡石上。或蔓延木上。莖節着處。即生根鬚。葉圓凌冬常青。花白結子。畧黑與薜荔。木連。地錦。石血等。同一類焉。人家亭圃石山亦每種植。翫飾採莖葉入藥。擇附石爲良。畏貝母菖蒲。使牡丹杜仲。喉閉不通。欲絕水煎湯下。立甦。背癰焮腫延開。蜜和汁服即効。堅筋骨。強健腰足。利關節。潤澤容顏。去風熱死肌。解口舌乾燥。蛇毒心悶。堪散刀斧瘡口可封。久服輕身。通神明目。延年耐老。○薜荔。同絡石。莖葉麄大如藤。治背癰。將葉採收。煎酒飲下。利即愈。○木連。味苦。附木而生。苗藤似寄生。黃綠直上。枝葉如石韋。豐厚且圓。任採煎湯。或收浸酒。初服壯陽卻病。久服耐老延年。藤汁。取之堪敷風毒。掃白癜風瘮。除疥癬瘰癧。子生大類蓮房。一年一熟。房劈內多白汁。久漸黑凝。破血甚良。依時收採。子亦入藥。並載圖經。○地錦。味甘葉

木連（ニサキノカツラ）
地錦（ニシキシカ）

如鴨掌。藤蔓著地隨節有根亦綠木石沿長。每耐寒凍不瘁。煎汁浸酒。破血止疼。祛産後血凝逐腹中血瘕○又種石血亦以血攻狀與絡石相同。但葉尖而半赤。石崖多産。收取無時。煎酒建功。墮胎亦速。

絡石（ツタ、テイカ、ツウ）

十八

二卷畢