3 V
G141.75
C421

圖像本草蒙筌卷之三

新安陳嘉謨廷采纂輯

門生　歙邑葉棐　鮑倚
婿胡一貫　姪晨　校刊
潭陽後學劉孔敦　若樸　增補

草部下

附子　味辛甘。氣溫大熱。浮也陽中之陽也。有大毒。係烏頭傍出故附子僉名。皮黑體圓底平。山芋狀相彷彿。畏人參黃耆甘草。併黑豆烏韭防風。惡蜈蚣。使地膽。種蒔川蜀（蜀人春每種蒔）冬月收採者汁全。頂擇正圓一兩一枚。不刀大。製宗陶氏槌法。以刀去淨皮臍。先將薑汁鹽水各半甌。入砂鍋緊煮七沸。次用甘草黃連各半兩加童便緩煮一時。撈貯罐中。埋伏地內。晝夜週畢。囫（音忽）圇（音輪）曝乾。藏須密封。用旋薄剉。仍文火復炒。庶劣性盡除。氣因浮中有沉。功專走

而不守。凡和群藥可使通行諸經以爲引導佐使之劑也。除四肢厥逆。去五臟沉寒。噤閉牙關。未納鵝管吹入。紅突丁毒。末調釅醋塗消。口瘡久不差。醋麵和末貼脚底。脚氣暴發腫。醋汁攪末敷患間。漏瘡剉片如錢。封口加艾可灸。煖脚膝健步。堅筋骨强陰佐入味丸中。壯元陽益腎。非附子不能補下焦陽虛故入味丸加桂附乃補腎經之陽六味丸去桂附蓋補腎經陰也丹溪謂加爲少陰向導恐非是君术附湯內。散寒濕溫脾。陰經直中真寒。薑附湯煎可禦。此須生用不在製拘。助甘緩參芪成功。健潤滯地黃建効。內傷熱甚。速入勿疑此藥治外感證非徧身表凉四肢厥者不可僭用經云壯火食氣故也治內傷證縱身表熱甚而氣虛脈細者正宜速入經云溫能除大熱是也俗醫不知。誤爲補劑。日相習用寧不殺人。孕婦忌煎。墮胎甚速。○立春生者。乃謂烏頭。因有脚類烏烏頭顱。竟假名爲醫家呼喚。氣味製度。俱與附同。本經云。春採爲烏頭。冬採爲附子。又云附子頂圓正。烏頭頂歪斜。宗此別之。庶弗差謬。忌豉汁。惡藜蘆。反半夏括蔞。暨貝母芨斂白芨白斂遠志爲使諸經通行。理風痺。卻風痰。散寒邪。除寒痛。破滯氣積聚。去心下痞堅亦能墮胎。孕婦切忌。煎膏名射罔。須識敷箭射禽獸即亡。倘誤中人。甘草急嚼。藍青萍草。亦可解之。○烏喙音諱兩岐頂上兩岐相合狀如牛角。喙者乃烏之口。因類亦假爲名。一應俱同烏頭。惟使別用莽草。主風濕陰囊癢癢。止寒熱。歷節掣疼。亦墮妊娠。更消癰腫。○天雄亦係一種。其體略細而長。氣味相同。製度弗異。惡腐婢。使亦遠志。忌豉汁。制須乾薑專補上焦陽虛善治一切風氣。敺寒濕痺。緩急拘攣。卻頭面風。往來疼痛。助武勇。力作不倦。消結積。身輕健行。調血脉益精。墮胎孕通竅。○側子狀如棗核。又從附子旁生。畏惡無差。但宜生用。理脚氣驗。散風瘮良。掃鼠瘻惡瘡。劫冷氣濕痺。如前墮孕。女科當知。○毗穗亦一名木鼈子者是。令人喪目。藥中忌之。

謨按附子烏頭烏喙天雄側子射罔木鼈子七名實出一種但治各有不同今尊會編附其總論天雄長而尖者其氣親上故曰非天雄不能補上焦陽虛附子圓而矮者其氣親下故曰非附子不能補下焦陽虛烏頭原生苗腦形如烏鳥之頭得母之氣守而不移居乎中者也側子散生傍側體無定在其氣輕揚宜其發四肢克皮毛爲治風瘮之神妙也烏喙兩岐相合形如烏嘴其氣鋒銳宜其通經絡利關節尋蹊達徑而直抵病所也煎爲射罔禽獸中之即死非氣之鋒銳捷利者能如是乎又有所謂木鼈子乃雄喙烏附側中有毗穗者其形摧殘其氣消索譬如疲癃殘疾之人百無一能徒爲世累且又令人喪目宜其不入藥用也

四卷木部中有此同名專入外科之用

附子　ハイホ　ヲウ　ノヌイモ　十七

大附子　八角附子　烏頭形　烏喙形



頂圓正

成州烏頭

天雄

天雄形

峽州側子

側子形



天南星　味苦辛氣平可升可降陰中陽也有毒下澤極多在處俱有苗類荷梗直起高僅尺餘葉如蒻葉杪生兩岐相抱花若蛇頭黃色子結作總鮮紅根比芋猶圓肌細膩且白本經載虎掌草即此後人以天南星改稱亦與鬼蒟蒻相侔每逢冬月間悞採殊不知蒟蒻莖斑花紫根極大肌麄南星莖青花黃根略小肌細炮之易裂得此纔真製須多泡生薑湯七八次佳或研填入牯牛膽臘月黑牯牛膽一箇用南星研末取汁拌勻填入內風乾過年成塊剉碎復炒拯痾方書謂之牛膽南星即此是也倉卒不能得此依前薑湯泡或火炮並殺毒堪用但性慴烈也乃上行治肺經本藥欲下行資黃蘗引之畏生乾薑及黑附子散跌撲即凝瘀血墜中風不語稠痰利胸膈下氣墮胎破堅積誅癰消腫水摩箍蛇蟲咬毒醋調貼破腦傷風瘤突額顱麝加敷愈先用小針十數枚作一把瘤上微刺通竅用新南星醋摩加麝少許日用一次雖如核大半月全消

江寧府天南星

滁州天南星

半夏一名守田味辛微苦氣平生寒熟温沉而降陰中陽也有毒山谷川澤處處有之苗起一莖莖端三葉根名半夏八月採收反烏頭惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲忌羊肉羊血海藻飴糖使宜射干柴胡經入足膽脾胃久藏入藥同橘皮謂二陳生嚼戟喉生用則麻戟人喉龍宜沸湯製七次仍加薑制繞可投瓶若研末擣少枯礬明泡過半夏四兩入枯礬一兩共研拌薑汁捏作小餅諸藥包裹風際陰乾此又名半夏麵也片則力峻麵則力柔總主諸痰驗證佐助火痰黑老痰膠加苓連栝樓海粉寒痰清濕痰白入薑附蒼朮陳皮風痰卒中昏迷皂角天南星和痰核延生腫突竹瀝白芥子攙助痰厥頭疼上痰飲脇痛散逆氣除嘔惡開結氣發音聲脾瀉兼嘔心汗且歛蓋脾惡濕半夏專能燥濕勝水故爾孕婦忌用恐墮胎元如不得已用之復加薑汁炒過消渴并諸血證尤禁莫加因燥反助火邪眞陰愈被熬害津枯血耗危殆日侵不得不預防也生半夏消癰腫成顆者摩水敷蠍子螫人塗上即愈婦人產後暈絕爲丸塞兩鼻中能頂刻回甦此扁鵲捷法

謨按內經云腎主五液化爲五濕自入爲唾入肝爲淚入心爲汗入脾爲痰入肺爲涕丹溪又云有痰曰嗽無痰曰欬因嗽而動脾之濕也半夏惟入脾以瀉痰之標不能入腎以瀉痰之本然欬無形嗽有形無形則潤有形則燥所以爲流濕潤燥之劑

也。又小柴胡湯中。加之以治傷寒。寒熱。半助柴胡以主惡寒。半助黃芩而能去熱。及往來寒熱。皆用之有各半之意。故因而名曰半夏云。本經別以守田目之者。蓋緣夏半前後。人多耘蒔在田。斯又指名而生意也

第二卷貝母款後 謨 按宜參看

齊州半夏

カタホソヒカクチ
カラスヒシヤク

京三稜 味苦辛。氣平。陰中之陽。無毒。生荊襄陂澤。近霜降採根。狀若鯽魚黃白體重者美麵包火炮。加醋復炒過靈色白屬在氣邊。專破血中之氣故消癥瘕血塊證兼毆積聚氣滯疼。虛者忌煎。恐損真氣。○仍有三種亦附其名。黑三稜色若烏梅輕鬆。去皮則白。○草三稜形如鷄爪。屈曲。根上生根。○石三稜色黃體重堅硬如石。總消積氣。主治相同。

淄州京三稜



邢州京三稜

蓬莪茂 味苦辛。氣溫無毒。多產廣南諸州。或生江浙田野。子如乾椹葉似蘘荷。莖錢大略高。根類薑成塊。茂生根底相對似卵大小不常。九月採收。依前炮製。色黑屬在血分。氣中之血專毆。破痃癖

止心疼。通月經。消瘀血。治霍亂積聚。理惡疰邪傷入氣藥。仍發諸香。在女科。真爲要劑。凡求速効摩酒單嚥。

端州蓬莪茂

骨碎補　味苦。氣溫。無毒。陰濕山谷。生長最多。根着樹石上。有毛。葉附兩小葉相對。每一大葉邊附小葉槎牙兩兩相對。不結花實。至久乾黃。入藥採根刮去毛用。補骨節傷碎。療風血積疼。破血有功。止血亦効。本名曰胡孫薑。唐明皇以其主折傷甚驗。故易名骨碎補也。

溫州蓬莪茂

溫州骨碎補

舒州骨碎補

牡丹　味辛苦。氣寒。陰中微陽。無毒。多生漢中巴郡。花開品色異常。富貴表先賢贊揚。賞玩爲當世貴重。凡資治療。惟採根皮。家園花瓣層。根氣發奪無力。山谷花單瓣。根性完具有神。赤專利多。白兼補最入劑之際。不可不知。今世多取桔梗皮代充。或採五加皮雜賣。乖謬殊甚。選擇宜精。經入足腎少陰。及手厥陰包絡。忌葫蒜。畏菟絲。凉骨蒸不遺。止吐衄。必用除癥堅瘀血。留舍於腸胃中。散冷熱血氣。攻作於生產後。仍主神志不足。更調經水欠勻。治風癇。定

搐止驚。療癰腫。排膿住痛。

謨按牡牝乃天地稱。牡則爲群花首。花爲陰成實。葉爲陽發生丹。係赤色象離。陰中之火能瀉。故丹溪云。地骨皮。治有汗骨蒸。牡丹皮。治無汗骨蒸。蓋有見於此爾。本經又云。主神志不足。神不足。手少陰也。志不足。足少陰也。張仲景八味丸用者。又非主於斯乎。

滁州牡丹

ウカカホヨクサ　ハツカクサ

大小薊　味甘苦。氣溫。一云氣涼。無毒。雖係兩種。氣味不殊。隨處田野俱生。北平今改順天出者力勝。蓋薊門以薊取名則可徵矣。凡資治療用須採根。大薊高三四尺餘。葉多青刺而皺。花開如髻。赤若紅藍。北人因之呼爲千針草也。破血捷。消腫奇。吐衄唾咯立除。沃血崩中即止。去蜘蛛蠍子咬毒。平焮突痛甚癰疽。並搗爛絞濃汁半甌。攙童便或醇酒飲下。小薊苗高尺許。花亦如前。但葉略差。有刺不皺。僅理血疾。不治外科。

大薊　小薊

劉寄奴草　味苦。氣溫。無毒。山側道傍。春煖即產。凡用入藥。隨時採收。下氣止心腹急疼。下血卻產後餘疾。消焮腫癰毒。滅湯火熱瘡。

子　研泡熱水下咽。腸瀉無度者即已。原因劉裕。小名寄奴。用此以治金瘡獲効。竟指名曰。劉寄奴草也。

カツヲクサ
カラノミカトグサ

滁州劉寄奴

紅藍花　味辛甘苦。氣溫。陰中之陽。無毒。各鄉俱蒔。五月旋收。因葉似藍。故此爲譽。堪染顏色可作臙脂。欲留日曝乾。入藥手揉碎。惟入血分。專治女科。下胎死腹中。爲未生聖藥。療口噤血暈。誠已產仙丹。多用則破血通經。酒煮方妙。少用則入心養血。水煎却宜。喉痺噎塞不通。搗取生汁。旋嚥。天行[illegible]瘡難出。研細子。末酒吞。[illegible]搗敷遊毒殊功。○胭脂滴聤耳立効。

クレノハナ
クレノアヒ
クレナイ
ベニノハナ

紅藍花

延胡索　即玄胡索　味辛苦。氣溫無毒。來自安東。縣名屬南直隸　生從奚國。因避宋諱。改玄爲延。形類半夏色黃。用須炒過咀片。專入太陰脾肺。一云。又走肝經。調月水氣滯血凝。止產後血衝血暈。跌撲下血淋露崩中。心腹卒疼。小腹脹痛。並治之而即効也。

茅山玄胡索

西玄胡索

鬱金　味苦氣寒純陰屬土與金有水無毒色赤兼黃生蜀地者勝體圓有節類蟬肚者眞倘或入藥難求採山茶花可代燒灰存性研細調服涼心經下氣消陽毒生肌禁尿血除血淋兼毆血氣作痛破惡血止吐血仍散積血歸經因性輕揚上行又治鬱過殊効名由此得

曾載本經

鬱金

薑黃　味辛氣溫無毒圖經云是經種三年已上老薑也多生江廣江西湖廣亦產蜀川色比鬱金甚黃形較鬱金稍大論主治功力又烈過鬱金破血立通下氣最捷主心腹結氣併疰忤積氣作膨治產血攻心及撲損瘀血爲痛更消癰腫仍通月經

讀按鬱金薑黃兩藥實不同種鬱金味苦寒色赤類蟬肚圓尖薑黃味辛溫色黃似薑爪圓大鬱金最少薑黃常多今市家惟取多者欺人謂原本一物指大者爲薑黃小者爲鬱金則世間之物俱各大小不齊何嘗因其異形而便異其名也此但可與不智者道爾若果爲是則鬱金亦易得者又何必以山茶花代耶

宜州　薑黃

浸州　薑黃

艾葉　味苦氣生寒熱溫陰中之陽無毒各處田野有以複道者爲佳初春布地生與草高狀頗類但葉背白風動微香每端午朝天

明多採。或懸戶資禳疫癘。或藏家防治病邪。煎服宜新鮮。氣則上達。灸火宜陳久。氣乃下行。揉碎入四物湯。安胎漏腹痛。搗汁攙四生飲。止吐衄唾紅。艾附丸（同香附米醋糊丸）開鬱結。調月經。溫煖子宮。使孕早結。薑艾丸（同乾薑未蜜丸）敺冷氣。去惡氣。免證久纏。和研細雄黃。熏下部。䘌疰濕痺。及疥癬神効。和蠟片訶子。熏痢後寒熱急痛。并漏殊功。作炷灸諸經穴不差。鑿竅拔風濕毒尤驗。實取入藥。令人有娠。助水臟壯陽。煖腰膝明目。○又（九牛草）產均州山（屬湖廣）葉圓長背白有芒。莖獨植高二尺許。氣香似艾。採亦端陽。治諸般風勞。止遍身疼痛。

謨按艾葉。本經及諸註釋。悉云生于田野。類蒿複道者爲佳。未嘗以州土拘也。世俗反指此爲野艾。至賤視之。端午節臨。僅採懸戶。辟疫而已。其治病症。遍求蘄州所產。獨莖圓葉背白有芒者。稱爲艾之精英。倘有收藏不吝價買。彼處仕宦。亦每採此。兩京送人。重紙包封。以示珍貴。名益傳遠。四方盡聞。今以形狀考之。九牛草者即此。人多不識。並以艾呼。經註明云。氣雖艾香。實非艾種。醫用作炷。以灸風濕痺疼。癆熱積聚。嘗獲効者。亦因辛竄。可以通利關竅而已。謂之全勝。真艾未必能然。大抵人之常情。貴遠賤近。泥于習俗。膠固不移。縱有本經之文。諸家之註。何嘗着一目。視以爲真僞之別耶。噫可勝嘆哉。可勝嘆哉

蘄州艾葉

地榆　味苦。甘酸。氣微寒。氣味俱薄。陰中陽也。無毒。山谷俱有。生長

入月採根曝乾。惡麥門冬。宜人頭髮。雖理血病。惟治下焦。止婦人帶下崩中。及月經不斷。卻小兒疳熱瀉痢。毆積瘀時行止痔瘻來紅禁腸風下血。散乳痓。愈金瘡。因性沉寒。故諸血熱者可用。倘若虛寒水瀉冷痢。切宜忌之。

第一卷五加皮款後 謨按宜參看

江寧府地榆

衡州地榆

紫草　味苦。氣寒無毒。人家園圃多有種栽。三月採根。可煎染紫。凡資入藥。去根取茸。益氣補中。通竅利水。治目黃成疸。療腹滿作疼。合膏敷瘑癬瘡瘍。單煮托跳痘瘡癤。

單州紫草

茜草　味苦。氣寒。陰中微陽。無毒。多產郊原。一名地血。苗牽長蔓延草上。根紫色。收採春初。煎汁可染絳紅。入藥勿犯銅鐵。療中多蠱毒。吐下血如爛肝。治跌久損傷。凝積血成瘀塊。虛熱崩漏不止。勞傷吐衄時來。女子經滯不行。婦人產後血暈。凡諸血證並建奇功。除乳結爲癰。理體黃成疸。

茜草　茜根

アカネ　十八

馬鞭草　味甘苦。氣微寒。有小毒。江淮州郡多。村墟陌路有。苗葉類菊。又若狠牙。高二三尺莖圓。抽四五穗花紫（春開細碎紫色秋復再花）穗較鞭鞘不異。故以馬鞭爲名。主下部匱瘡。併金瘡積血作疼。研末敷妙（曾治楊梅瘡用此煎湯先熏後洗湯氣纔到便覺爽快候溫洗之痛腫隨減）通女人月水。及血氣成癥結瘕生搖煎良（醉酒煎服）去小腹卒痛難當。禁久瘧發熱不斷。絞腸沙即効。纏喉痺極靈。殺諸般疰蟲。消五種痞塊

馬鞭草

クマツヽラ　十六

夏枯草　味苦辛。氣寒無毒。曠野平原隨處俱有。葉類旋覆花似丹參。冬至後發生。夏至時枯瘁。故謂夏枯草也。四月收採。洗淨陰乾。凡用拯疴王瓜爲使。破癥堅瘻瘤結氣。散瘰癧鼠瘻頭瘡。寒熱堪毆。濕痺兼卻。

謨按夏枯草。稟純陽之氣。得陰氣即枯。故逢夏至梗枯也。丹溪有言。善補養厥陰血脉之功。能治肝虛目疼。冷淚不止。羞明怕日。久視昏花。用夏枯草五錢。香附子一兩。研細爲散。茶調下咽。服之誠有神功。惜乎本經未之及也。

滁州夏枯草

ウルキ ウツホグサ 十五

百部 味甘苦氣微溫。又云微寒。無毒。一云有小毒。隨處生長。用惟取根。勞開去心。酒浸火。炒。主肺熱上氣。止年久欬嗽急求。治傳尸骨蒸殺寸白蚘蟲。須用。又專治蟲。亦可去疳。燒湯洗牛馬。身蟲不生。燒煙薰樹木。蛀蟲即死。人家燒爐盡逐蠓蠅。

峽州百部

ホトツラ 十八

百合 味甘。氣平。無毒。洲渚山野俱生。花開紅白二種。根如葫蒜。小瓣多層。人因美之。稱名百合。白花者。養臟益志。定膳安心。逐驚悸狂叫之邪。消浮腫痞滿之氣。止遍身痛。利大小便。辟鬼氛。除時疫欬逆。殺蠱毒。治外科癰疽。乳腫喉痺殊功。發背搭肩立効。又張仲景治傷寒壞後已成百合病證。用此治之。固此名同。然未識有何義也。蒸食。能補中益氣。作麵可代糧。過荒。赤花者。僅治外科。不理他病。凡採待用。務必分留。

滁州百合

ユリ 二十七

成州百合

前胡　味苦。氣微寒。無毒。山谷多產。秋月採根。色白兼黃。氣香甚竄。凡用入藥。須日曝乾。畏藜蘆惡皂莢。以半夏爲使。去痰實如神。胸脇中痞滿立除。心腹內結氣即逐。治傷寒傷熱。又推陳致新。消風止頭疼。保嬰利疳氣。

ウタナ
ミツハタサ

壽州前胡



旋覆花　味鹹甘。氣溫無毒。一云冷利。有小毒。叢生深谷之中。名金沸草。顏色深黃如菊。人又呼金錢花。七月採收曝乾入藥。治頭風明目逐水濕通便。去心滿噫氣痞堅。消胸結痰唾膠漆。驚悸亦止寒熱兼除。倘病者稍涉虛羸。防損氣不宜多服。葉理金瘡止血。

杜　王風濕續筋。

カマノツホ　十五
ヨクルマ

隨州旋復花



大黃　味苦。氣大寒。味極厚。陰中之陰降也。無毒。形同牛舌。產自蜀川。必得重實錦紋。勿用輕鬆朽黑。使黃芩一味。入陽明二經。欲使上行。須資酒製。酒浸達巔頂。上酒洗至胃脘中。並載舟楫桔梗少停。仍緩國老甘草不墜。有斯佐助。纔去病邪。如欲下行。務分緩速。欲速生使。投滾湯一泡。便吞。欲緩熟。宜同諸藥久煎。方服。入劑多寡。看人實虛。蓋性惟沉不浮。故用直走莫守。調中化食。要時水穀利通

推陳致新。頃刻腸胃蕩滌奪土鬱無壅滯。定禍亂建太平。因有峻烈威風特加將軍名號仍導瘀血更滾頑痰破癥堅積聚止疼敗癰疽熱毒消腫勿服太過下多亡陰。若研末鷄清調稠可敷上火瘡取効

誤按大黃極寒硫黃極熱二黃氣味懸隔。何號將軍相同蓋硫黃係至陽之精。大黃乃至陰之類一能破邪歸正。挺出陽精一能推陳致新戡定禍亂並有過乎諸藥之能宜其同得居上之號也。

十七

ヨホシ

蜀州大黃

〔連翹〕味苦氣平微寒氣味俱薄輕清而浮升也陽也無毒莖短微赤葉狹常青。花細辯深黃實作房黃黑因中片片相比。狀如翹應故名。凡用採收須擇地土生川蜀者實類椿實殼小堅似椿實未開者外完而無跗萼剖則中解。氣甚芬香纔乾便脫莖間。不擊自然落下。生江南者實。若菡萏殼柔軟外有跗萼抱之解脉絕無香氣自少。乾久尚着莖上任擊亦不脫離。以此爲殊惟蜀最勝去梗旋研入劑方靈餘剩密藏氣味免失經入少陰心臟手足少陽陽明瀉心經客熱殊功降脾胃濕熱神効毆惡癰毒蠱毒去寸白蟲蚘蟲瘡科嘗號聖丹血證每爲中使通月水下五淋義蓋取其結者散之故此能散諸經血凝氣聚必用而不可缺也實人宜用。虛者勿投

○〔連翹〕係根之名。仲景方云去熱。本經未載此亦附之。

兗州連翹

イタチクサ

射音夜干　味苦。氣平微溫屬金有木與水火陰中陽也無毒。川澤郊原隨處生長葉如翅羽扇。俗呼烏翣根。一說葉類萱草堅强根多短鬚黃黑。花開四種紫白紅黃丹溪取紫爲眞。只因試過有驗三月三日。採根曝乾。凡藥劑投煎務米泔浸宿。散結氣旋平癰毒逐瘀血竟通月經。止喉痺刺疼。敺口熱穢臭。去因勞而發之濕熱潰硬腫殊功。行太陰厥陰之積痰。消突核甚捷。仍治胸滿氣脹。更療欬急涎多。

滁州射干

カラスアフキ

篇蓄　味苦氣平無毒春月布地生在處沿路有苗類瞿麥。根若蓬蒿葉細竹葉相同莖赤釵股近似節間花綻。色微青黃。五月採收陰乾入藥主浸淫疥癢疽痒。治丹石發衝眼疼。去小兒蚘蟲療女子陰蝕

冀州篇蓄

ニハヤナギ　十二八

苦參　味苦氣寒沉也純陰無毒田野山谷隨處有生採根曝乾嚼之極苦反藜蘆莫入惡貝母菟絲使宜玄參惟作丸服不入湯散治腸風下血及熱痢刮痛難當療溫病狂言鼓心燥結胸垂死赤癩眉脫者歐風有功黃疸潰溺者逐水立効掃遍身瘙癢止卒暴心疼除癰腫殺疥蟲破癥瘕散結氣養肝氣明目止淚益腎精解渴生津利九竅通便安五臟定志子生作茨十月堪收亦明日輕身惟久服有驗

成德軍苦參

秦州苦參

牛子　味苦氣寒有毒不拘處處有之種春時旋生苗作藤蔓繞墻垣籬塹待秋月方開花如鼓子花碧色日出開日西闔結實白皮裹外成毬葉發枝間有三尖角子藏毬內亦三稜九月採收曝乾多有黑白兩種黑者屬水力速白者屬金効遲炒研煎湯並取頭末除壅滯氣急及痃癖蠱毒殊功利大小便難併脚滿水腫極驗

莫按東垣云牽牛非神農經藥出名醫續註云味苦寒能除濕利小便治下疰脚氣據所說氣味主治俱誤凡藥中用牽牛者少則動大便多則瀉下如水乃道氣之藥試取嘗之味則辛辣久嚼雄壯漸漸不絕非辛而何續註謂味苦寒果安在哉牽牛但能瀉氣中濕熱不能瀉血中濕熱凡濕從下受下焦主血是血中之濕宜用苦寒之味也張仲景治七種濕證小便不利無一藥犯牽牛者非不知牽牛能瀉濕利小便也為濕病之根在

下焦。是血分中氣病而不可用辛辣氣藥反瀉上焦太陰之氣故也仲景尚不敢輕用。夫何世醫。不分血氣而一槩用之乎。夫濕者水之別稱有形者也若肺先受濕則宜用之。今則不問有濕無濕。但傷食或欲動大便或有熱證或作常服尅化之藥罔不用之豈不誤哉殊不知牽牛比諸辛藥瀉氣尤甚。張文懿公。嘗謂牽牛不可躭嗜。脫人元氣吾初疑藥有何躭嗜。後每見人因酒食病痞者多服神芎丸等藥皆犯牽牛。初服則快藥過復痞仍前再服隨藥而効由是愈信。躭嗜久服暗傷元氣而猶不知悔悟也治當益脾健胃。使元氣生發自然腐熟水穀此治無以加矣經云。辛瀉氣肺氣病者無多食辛。況飲食勞倦。所傷在胃。胃氣不行。心火乘之胃受火邪。名曰熱中。脉經云。脾胃主血其所生病。當于血中瀉火潤燥。破惡血瀉胃之濕熱也胃熱上

[illegible]肺受火邪。當用黃芩之苦寒以瀉火當歸之辛溫以瀉血經桃仁之辛甘油膩以破惡血兼除燥潤大便然猶不可專用須于黃耆人參甘草諸甘溫甘寒補元氣瀉陰火正藥內兼而用之。何則上焦元氣已自虛弱津液不足口燥舌乾若反用牽牛氣味俱陽。大辛之藥重瀉其已虛之元氣復耗其津液利其小便以致陰火愈甚。故重則死輕則夭誠可憫也牽牛感南方熱火之化所生者也血熱而瀉氣差悞甚矣若病濕勝氣不得施化致大小便不通則宜用之耳濕去則氣得周流所謂五臟有邪更相平也經云。一臟不平以所勝平之火能平金而瀉肺者即此也。近世錢氏瀉黃散中。獨用防風過于他藥一二倍者以防風辛溫能于土中瀉金之子。不使助母也經云從前來者為實邪。謂子能令母實故以所勝平之也。晦菴語錄中有秋食薑

則天人天年經止言辛瀉氣而晦菴云然戒之深也何則秋分食薑令人瀉氣故禁之夏月食薑不禁者熱氣生旺之時宜以汗散薑能發汗以越其熱也薑尚如此況牽牛乎可見味辛之物皆有宜禁之時亦猶牽牛不可一槩用之也

十八

アサガホ

越州牽牛子

葶藶 味辛苦氣大寒沉也陰中之陰無毒一云小毒用之當熬陝西河北俱多曹州屬山東出者獨勝延生田野收採夏間粒如黍匾小微黃製隔紙文火略炒[illegible]蠶石龍芮使榆皮得酒良種因甜苦兩般證量輕重各用苦葶藶行水走泄迅速形壯證重者堪求甜葶藶行水走泄緩遲形瘦證輕者宜服苟或鹵莽易致殺人逐膀胱伏留熱氣殊功消面目浮腫水氣立効肺癰喘不得臥非此難痊葶藶大棗瀉肺湯主之出仲景方痰飲欬不能休用之易愈主癥瘕積聚結氣理風熱瘙癢疿瘡久服虛人須記勿犯

曹州葶藶

丹州葶藶



澤蘭 味苦甘一云苦辛氣微溫無毒水澤多生家園亦種苗高二三尺許紫節方莖有四稜葉尖對生有毛但不光潤八月花開白色

狀與薄荷花同初採微辛此爲異耳採收入藥防已使良理胎產百病淹纏女科須覓消身面四肢浮腫濕中宜求破宿血去癥瘕殊功行瘀血療撲損易効散頭風目痛追癰腫瘡膿長肉生肌利門通竅○根色紫黑地筍爲名與粟根相侔凡血證俱治女人產後堪作菜蔬○又種益妳草收彷彿澤蘭葉類莖色略異細認纔知果益妳續斷乳如神仍去痔收脫肛最捷炙令香燥漬酒飲之

徐州澤蘭

梧州澤蘭

葫蘆巴　味苦氣溫純陽無毒本經云乃番國蘿蔔子也原本產諸胡地今亦蒔于嶺南春月生苗夏間結子子作細莢至秋採收得桃仁大茴香治膀胱疝氣効三味麩炒各等分研末半以酒糊丸半爲散每用五七十丸鹽酒下散以熱米飲調下與丸子相間空心服日各一二服即効得硫黃黑附子療腎臟虛冷佳毆脹滿腹脇中退青黃面頰上

キハチス　十五
南蠻大根

廣州葫蘆巴

草薢　味苦甘氣平無毒盛出河陝荊蜀蔓生葉作三叉秋月採根狀類山芋一種莖有刺者根白實一種莖無刺者根軟虛種雖兩般白者爲勝又與菝葜小異凡收切勿混真蓋菝葜根作塊赤黃草薢根細長淺白博物誌亦曰菝葜與草薢相亂時人每呼白菝

莫者即萆薢也利刀切片酒浸烘乾凡用拯痾忌食牛肉畏葵根牡蠣及柴胡大黃爲使宜意苡仁治痺盡風寒濕腰背冷痛止筋骨掣痛除補水臟益精縮小便明目逐關節久結老血攪肌膚延生惡瘡仍主恚怒傷中尤療老人五緩○菝葜別種亦係蔓生俗呼金剛根又呼鼈兒攪根延發山野地採根秋月切片曝乾浸赤汁煮米粉嘗辟時疫瘟瘴極驗搗碎末釀醇酒飲去風毒脚痺殊佳止小便益血氣腰背疼甚煎服亦靈

謨按近道所產呼爲冷飯團即萆薢也俗之淫夫淫婦多病楊梅瘡劑用輕粉愈而復發久則肢體拘攣變爲癰漏剉萆薢三兩或加皂角刺牽牛各一錢水六碗煎耗一半溫三服不數劑多差原因水衰用挾相火凌土土屬濕生肌肉濕熱鬱于肌腠故爲癰腫經曰濕氣害人皮肉筋脉是也萆薢味甘淡去脾濕濕去則榮衛從筋脉柔肌肉長而拘攣癰漏並愈此亦理也初病服之不效者火盛而濕未鬱萆薢長于去濕而劣于去熱病久則火衰而氣已耗氣耗則濕鬱用之去熱故効也

興元府萆薢



荊門軍萆薢



預知子　味苦氣寒無毒出淮南及漢黔諸州係藤蔓附大水直上葉三角綠色背淺面深實五月作房生青熟赤子藏房內六七多枚如皂角子褐斑似飛蛾蟲光潤欲求極貴因得甚難取二枚綴衣服領中遇毒物則有聲側側能先知覺故有此名服須去皮研

細湯下。殺蟲誅蠱諸毒並毆根搗水煎。獲効尤速。

ドクシリ

預知子

蕎薟　味苦。氣寒。有小毒。一云去熱。無毒。沃壤多生。平澤亦有。氣作猪臭。故名蕎薟。（此草多生江東。其處語言呼猪爲蕎。呼臭爲薟。因其氣類。故此名之。）五六七月採收。（五月五日六月六日七月七日並宜收採。）枝葉花實俱用。（惟去麄莖。）蜜酒層層和灑。九蒸九曝完全。細末研成蜜丸豆大。蚤起空腹吞服。酒下多寡隨宜。療暴中風邪。口眼喎斜者立効。治久滲濕痺。腰脚痠痛者殊功。搗生汁服之。主熱鬱煩滿。服多則吐。惟少爲宜。

メナモニ

海州蕎薟

謨按此草處處俱生。視之多有異狀。金稜銀線素根紫荄。對節生枝。方梗圓葉。如式修製服。誠益人百服。則耳目聰明。千服則鬚髮烏黑。追風逐濕。猶作泛閑古方。每竭贊揚。深功難盡。著述可見。至賤之類。却有殊常之能。醫者不可因賤而不收。病家亦勿謂賤而不製服也。

鶴蝨　味苦。氣平。有小毒。平原曠野俱有。莖圓一二尺高。葉皺大。彷彿紫蘇花。白黃儼若甘菊。八月結子。粒細而尖。任收散文爲丸。大

能殺蟲追毒蚘蟯蟲咬心腹卒痛者肥肉汁調下即安砒霜毒吞腸胃未裂者濃虀汁送下立吐

除州鶴虱

成州鶴虱

酸醬實　味酸氣平寒無毒園囿田坂處處有生春開白花旋結青殼子藏殼內大若櫻珠臨熟盡變深紅五月堪取啖食孕婦吞下立分娩無憂小兒食之能除熱有蟲根搗汁極苦治黃疸易消葉採陰乾亦利水道定志益氣解燥除煩。

酸漿

石韋　味苦甘氣平微寒無毒叢生山谷石上者真不聞人聲水聲者効葉長似柳背有黃毛不拭射人肺中即成欬嗽難治務先去淨炙拌羊脂炒變焦黃方入藥劑得菖蒲妙使杏仁良治遺溺成淋通膀胱利水療癰疽發背去惡風止煩益精氣補五勞除邪熱安五臟○生瓦上者瓦韋爲名治淋亦佳本經曾載

海州石韋



〔海金沙〕本經不言氣味只云出産黔州屬雲南一二尺高株材葉小七月收取拔起全科晴日襯紙地間將此曝於紙上以杖敲擊自落細沙且曝且敲沙盡爲度用爲丸散專利小腸得梔子牙硝蓬砂可共療傷寒狂熱本註又云小便不通臍下滿悶者用此一兩臘茶五錢絕細研成煎生薑甘草梢調下三錢不通又再服之旋可以取効也

黔州海金沙

〔海藻〕味苦鹹氣寒無毒一云有小毒東海所生葉類萍藻根着水底石上莖如亂髮而烏七夕收採性反甘草治項間瘰癧消頸下瘰癧利水道通癃閉成淋瀉水氣除脹滿作腫碎百邪鬼魅止偏墜疝疼○又種麄長乃名海帶柔軟堪以繫物入藥多用催生亦療風淫兼下水濕○〔昆布〕亦係海菜治與海藻同功散結潰堅並著奇効

謨按榮氣不從外爲癰腫堅硬不潰仗此可消蓋三藥味俱鹹經云鹹能軟堅隨各引經藥治之則堅無不潰肺無不消也



海藻

常山　味苦辛氣寒無毒川蜀多生湖浙亦有擇如鷄骨入藥方靈忌菘菜鷄肉葱畏玉札勿令犯截溫瘧吐痰沫殊功解傷寒感寒熱立効水脹堪逐鬼蠱能消勿滚熱下咽必露冷過宿（凡服此須頭晚煎熟露天空下一宿次早纔服）年老久病人全忌形瘦稍虛者少煎蓋性悍兇峻逐甚捷功不掩過者也○苗名蜀漆味苦純陽五月收採陰乾使宜稽萋桔梗散火邪錯逆破癥瘕堅除痞結積凝碎蠱毒鬼疰久瘧兼治欬逆但切勿多服亦防惡吐

蜀漆



常山

甘遂　味苦甘氣大寒有毒多產京西川谷二月採根陰乾狀若連珠使宜瓜蒂反甘草惡遠志破癥堅積聚如神退面目浮腫立効食停胃內有之即嘔水結胸中非此不解蓋氣直透所結之處專于行水攻決利從穀道出也凡用斟酌切勿妄投

甘遂

白斂　味苦甘氣平微寒無毒一云有毒隨處蔓生深林猶盛根如鷄鴨卵三五同窠採待中秋時黑皮洗淨破片以竹穿日曝入藥與白芨並行反烏頭使代赭退赤眼除熱散結氣止疼理小兒溫瘧驚癇療女子陰戶腫疼殺火毒爲火煨湯泡聖藥治外科敷背癰疔腫神丹

白斂　カミクサ　ヤマカミ　ホト　十八

白芨　味苦辛氣平微寒陽中之陰無毒多出石山苗高尺許葉青兩指大莖端生一苔花開紫紅實熟黃黑根如菱米節間有毛二八月採乾紫石英爲使惡理石畏杏仁名擅外科功專收斂不煎湯服惟熬膏敷除賊風鬼擊痱緩不收去潰瘍敗疽死肌腐肉敷山根額之下鼻之上止衄塗疥癬殺蟲作糊甚粘裱畫多用

白芨　カミクサ

白附子　味甘辛氣溫純陽無毒一云有小毒巴郡涼州俱多砂磧卑濕纔有獨莖發葉甚細周匝生于穗間形類天雄入藥炮用治面上百病可作面脂主血痺冷疼且行藥勢敺諸風冷氣解中風失音摩醋擦身背汗斑尤去疥癬用茄蒂裹邊燃藥擦三日愈忌淨洗研末收陰囊濕癢併滅瘢痕

白附子

白頭翁　味苦氣溫可升可降陰中陽也無毒一云味甘苦有小毒山谷田野在處有之苗作叢柔紵稍長葉生杪有毛不澤毛細白色風來反靜風去則搖與獨滑赤箭苗莖三者無差異也近根底處白茸寸餘狀類老翁名由此得交秋收採向日曝乾一云陰乾入藥拯疴蠡實爲使主溫瘧陽狂寒熱治癥瘕積聚腹疼逐血愈金瘡䘌風煖腰膝消瘰癧散癭瘤小兒頭禿羶腥及兩鼻血衄神効男子陰疝偏腫併百節骨痛殊功牙齒痛亦除赤毒痢必用經云腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故必用此純苦之劑以堅之也

白頭翁

商陸　味辛甘酸氣溫有毒一名樟柳多產郊原葉如牛舌舒長純青色莖高三尺柔脆青赤色秋開花作孕色赤白兩般花赤者根赤相同花白者根白無異白根入藥劑專利水對證可煎赤根見鬼神甚有毒貼腫堪用儻鹵莽誤服必痢血喪身釋文又云如人形者有神其根有似人形雙手雙足者能通神今術家每云樟柳神者即此是爾實亦入神之藥花名荔花尤良若陰乾搗末水吞能治人健忘善悟服後臥思所事開心復記詳明並墮妊娠孕婦切忌

謨按白根治水方載多般或取根雜鯉魚熬湯或咀粒攙粟米

煑粥。或搗生汁調酒。或和諸藥爲丸空心服之。並可獲効。赤根貼腫方亦不同。喉痺窒塞不通。醋熬敷外腫處。石癰堅如石者。搗擦取軟成膿。如或搗爛加鹽總敷無名腫毒。古讚云。其味酸辛。其形類人。療水貼腫。其効如神。斯言盡之矣

并州商陸

鳳翔府商陸

王不留行（即剪金花）味苦甘。氣平。陽中之陰。無毒。江浙近道俱有。莖青。七八寸長。葉尖如小匙頭。花開係黃紫色。子如黍粟殼黑微圓。三月採根莖。五月取花子。先灑酒蒸一伏。復浸漿水一宵。微火焙乾。收留待用。主金瘡止血逐痛。治女科催產調經。除風痺風痙內寒。消乳癰背癰外腫出刺下乳止衄。毆煩

成德軍王不留行

江寧府王不留行

蒲公草（即黃花地丁草）味苦。氣平。無毒。一云構耨草。俗呼孛孛丁。田側道傍逢春滿地。葉如苦苣。有細刺。花類金錢。開莖端。斷其莖（莖中空如蔥狀）白汁竟流。開罷花飛絮隨起。絮中有子。落地則生。庭院有之。因風吹至。採宜四月五月。經入陽明太陰。煎汁同忍冬。臨服加醇酒。潰癰腫。消結核。屢著奇功。解食毒。散滯氣。每臻神効

蒲公草

穀精草 味辛。氣溫無毒。生長穀田中。採收三月後。花白葉細。圓小似星。故又名戴星草也。理咽喉痺塞。止牙齒風疼。口舌諸瘡。眼目瞖膜。並堪煎服。取効霎時。又餵馬驢騾。能殺蟲顙內。益力健步。長毛生驟

秦州穀精草

江寧府穀精草



旱蓮草 一名鱧腸 味甘酸。氣平無毒。濕地多生。苗若旋複。花細而白色。實圓而作房。摘斷枝莖汁出漸黑。或煎酒服。或熬膏敷。染白髮回烏。止赤痢。變蔞鬚眉稀少。可望速生而繁。火瘡發紅。能使流血立已

旱蓮艸

金星草 味苦。氣寒。無毒。多生陰濕石上。葉長凌冬不凋。背有黃點兩行。狀若金星相對。故因得此名也。五月採收。風乾入藥。解毒消腫。專理外科。凡百初起惡瘡。但諸未潰。陽毒沿頸。瘰癧發背癰疽。或剉碎煮酒頻吞。或研末調水旋服。或煎汁淋洗。或搗爛敷塗。并可建功。立能獲効。諸丹石毒悉解。硫黃毒亦能毆根。搗浸真麻油

搽頭大生毛髮

施州金首生草

佛耳草 味酸氣熱無毒郊原野坂處處有之春生苗尺餘夏開花黃色葉與馬齒莧類細小微有白毛俗呼黃蒿人每收採搗爛和米粉作粿柔韌音軟而香美可嘗藥劑凡資曝乾纔用以款冬爲使治寒嗽及痰尤去肺寒大升肺氣切勿過服損目失明

佛耳艸

燈籠草 味苦氣大寒無毒在處俱有八月採收花實根莖並堪入藥苗高三四尺許花紅而類燈籠故此爲名專主熱嗽蓋因苦而除燥熱輕能治上焦故也丹溪嘗云燈籠草治熱痰嗽佛耳草治寒痰嗽

燈籠艸

三白草 味甘辛氣寒有小毒出自襄州屬生臨池澤每交初夏之月葉端半白如霜農人候以蒔田三葉白草便秀故此爲譽用惟取根利大小便逐脚膝氣除痞滿去瘧破堅癖毆痰疔腫仍消積聚尤卻

三白艸 カタミヨクサ 十六

燈心草 味甘氣寒。屬金與火無毒。江南澤地叢生。苗莖圓細長直多採蒸熟。向日曝乾。拆取中心白穰。用之燃燈照夜。此謂熟草。不入醫方。務求生剝者爲良。搡碎煎湯。液纔効。通陰竅利小便。除癃閉成淋。消水濕作腫。鉢擂乳香少入。油潤全無。罐藏冰片多加。分兩不耗。根採煎服。功力尤優。○燈花止小兒夜啼。亦能治大人喉痺。金瘡敷上。血禁肌生。

灯心艸 トウシミ イクサ

蛇含草 味苦。氣微寒無毒。一云有毒。石土上並生。遠近處咸有。一莖五葉七葉。兩種略殊。當用細葉黃花。此品纔妙。昔田父見蛇含。着別傷蛇即活。嘗採此治癰腫。去內惡毒立痊。由此得名。外科多用。主驚癇寒熱邪氣。心腹邪氣。除濕痺疽痔惡瘡。鼠瘻惡瘡。諸丹石燥毒殊功。但蛇蠍蜂傷悉効。人家多種。亦令無蛇。又用搗爛成膏。堪續已斷手指。○其根收取。乃名女青。搗細末帶之。則疫癘不犯。主蠱毒而逐邪惡。殺鬼魅以辟不祥。

蛇含艸 ウツマメクサ キニンサウ 十六

水蔘

水莊草 即天蔘 味鹹氣微寒無毒一云味辛有毒雖生各處多在水傍苗莖高尺餘葉大色赤白五月採實用者最稀去痺氣除惡瘡下水氣解消渴去熱明目奇効咸臻○馬蔘葉大同前卑濕之地亦產夏收採曝乾入劑主腸中蟲蛭輕身○水蔘生淺水中大葉有黑點根莖並採可用煎湯捋脚止霍亂轉筋消脚氣腫滿吞服止蛇毒攻內去痃癖脹疼水蠱黃腫腹膨用蒸汗出立愈二月勿食傷腎弱陽若合魚鮓食之令陰冷痛欲絕○毛蔘冬根不死葉上有毛亦主瘰癧癰疽引膿長肉○白蔘紅蔘造酒並佳

水莊草

山茨菇

山茨菇根 味辛苦有小毒俗呼金燈籠多生沙濕地初春萌孽葉如韭葉長青二月開花狀若燈籠色白瓣有黑點子結三稜生夏纔交其苗即稿依時掘地可得遲久腐爛難尋與老鴉蒜略同在包裹上分別蒜却無毛光禿茨菇包裹有毛得之去皮生焙任用生搗爲拔毒敷藥頻換則靈焙研合玉樞神丹必資作主消癰疽無名疔腫散癮疹有毒惡瘡蛇虺嚙傷並服神効

山茨菇

山豆根 味苦氣寒無毒各處山谷俱有廣西出者獨佳俗呼金鎖匙苗長一尺許葉兩傍而有曲鈕子成簇而色鮮紅粒似豆圓名

因此得。凡資療病。惟取其根口嚼汁吞。止咽喉腫痛要藥。水調末服除人馬急黃捷方。敷蛇蟲咬傷。去血氣腹痛。

山豆根

十八

萱草根（俗名鹿葱）味甘氣涼屬木無毒。園圃多種。五月開花。療酒疸遍身通黃。絞生根汁嚥下。治沙淋小便澁痛。煮熟嫩苗食之。咀和酒煎爲破腦傷風要藥。搗攙薑汁。係大熱衄血仙方。安五臟輕身。利胸膈明目。久久服餌。歡樂無憂。嵇康云。合歡觸怒。萱草忘憂是也○宜男（係花之字。孕婦佩則生男。丹溪曰。性下行走陰。分名宜男者。寧無幾意存焉）

草

根　味甘氣寒無毒。洲渚多生。秋冬纔取。掘土擇甘美者有効。露出及浮水者損人。解酒毒退熱除煩。止嘔噦開胃下食。食魚蟹中毒即刼。懷胎孕發熱即歐。○花白名曰蓬茸。主卒霍亂危急。煮汁頓飲。霎時可安。

蘆根

菰根　味甘氣大寒無毒多生江湖陂澤葉如蒲葦尖長抹馬甚肥作薦誠軟江南呼爲茭草即此是焉四時取根搗爛絞汁止小便利解渴主腸胃熱除煩久浮水面者燒灰研朱火灼瘡敷愈用雞清調

菰菜　即春生茭笋煮食治心腹卒疼樸鯽魚爲羹解酒毒開胃丹石熱發頓食即差須防滑中不宜多食

菰首　當作菰手係歲久中生白臺與小兒臂同故取爲名喚食少追風去熱止上膈渴消食多發氣弱陽令下焦冷滑食同白蜜痼疾復生臺中有黑者

茭鬱　名用之治小兒赤痢効葉利五臟亦驗食巴豆人忌之子細若青麻黃名彫胡米俗每合黍粟煮過凶荒年大抵菰之種類皆極冷利不可過食惟服金石人相宜爾

菰根

菰首

茭鬱

苧根　味甘氣寒無毒卿落地多種養宿根春自發生葉取飼池魚面青背白皮剝績暑布一年三收根輕虛白黃採無時入藥搗敷小兒赤遊丹毒及諸癰疽發背乳房煎療女人胎動不安併產前後發熱煩悶塞胎漏下血署箭毒蛇傷時疫大渴狂呼非此莫卻金石服多燥熱飲下立除苧皮藏留產婦堪用作枕眠止血暈安臍上去腹疼漬苧汁嘗大解消渴蠶咬中毒一飲即歐故近蠶室種之則蠶竟不產也

苧根

羊蹄根 味甘。氣寒。屬水無毒。葉如萵苣。多產道傍。根取醋摩。善走血分。主小兒頭禿疥癩。除熱。治女子陰蝕浸淫。殺蟲去痔疽。除風癬。或採多熬膏加蜜。用防風研末和丸。秫樓甘草酒吞。治前諸證益妙。日服二次每次服三十丸 葉作菜茹。小兒疳蟲立追。食多滑腸作瀉 實苦澁平。赤白雜痢能止

羊蹄根

芫花 味辛苦。氣溫。有小毒。川谷甚多。遠近俱有。莖紫花白。一二尺長。密開花。盈舊枝莖。如紫稍作穗。木出葉。採嫩苞蕋。向晴日曝乾花落葉生。不堪用也。得之煮醋數沸。漉出漬水一宵。復曝乾收。纔免毒害。反甘草。使決明。散皮膚水腫。發浮消胸膈痰沫。善唾。欬逆上氣能止。咽腫短氣可安。敺疝瘕癰疽。除蠱毒鬼瘧。令人虛損。久服不宜。汁漬線絲。繫痔易落。○根採尤毒。乃名蜀桑。搗爛堪毒魚。研末能敷疥。

綿州芫花

謨按芫花瀉濕利水爲要夫水者脾胃腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上而頭目中而四肢下而腰膝外而皮毛中而肌肉內而筋骨脉有寸関尺之殊診有浮中沉之異必當審其病在何經何臟乃可用之倘若悞投爲害非淺

芫花　味苦辛氣寒有毒生咸陽川谷及河南中牟苗似胡荽刺無花類芫花色白狀極細四五月採力甚猛熬令赤收入藥劑中急欲行水有是證者斟酌投煎破積聚大堅瘕癥療痰癖欬逆上氣咽喉內腫疰氣可散臍腹下痃癖氣塊能消

芫花

貫衆　味苦氣微寒有毒在處山谷有背日陰濕生莖有三稜皮係赤色葉青綠如小鷄翅根紫黑似老鴟頭故本經欵中亦載曰此謂草鴟頭也（一說根形如大瓜下有黑鬚毛）二八月採根陰乾赤小豆藿菌爲使敺諸毒理金瘡惡毒殺三蟲去寸白蚘蟲仍除頭風更破癥瘕

淄州貫衆　十二

鳧茨　味甘氣平微寒無毒苗似龍鬚葉如芋狀根黑指大皮厚有毛（又一種皮薄無毛者亦同）今人謂之勃臍本經載曰烏芋鳧烏喜食又得此名水田蒔之在處有者三月三日採根曝乾主產後血悶攻心理產難子胞不下壓丹石除胸膈痞氣下石淋退面目疸黃風腫能

消痺熱堪卻開胃進食益氣溫中性善毀銅着之即碎故爲消堅削積要劑也多食則生他症卒食則嘔水來孕婦食動胎小兒食臍痛葉採搗爛蛇咬可敷

鳧茨

水萍　味辛酸氣寒無毒係柳絮隨風飛起入池沼得水生成小者藻背面俱青大者萍面青背紫下無根蒂水面漂浮入藥拯痾惟萍可用七月半採依法曝之竹篩攤開水盆架住曝向烈日纔得燥乾（盆無水則不燥）研末細羅蜜丸彈大豆淋酒化空心頓吞發汗驟來敺風速退仍治時行熱病堪浴遍身瘡瘡（生採煎湯）消水腫利小便去暴燥止消渴夏夜蚊多燒煙可除

（謨）按普濟大風丹云東京開河掘得石碑梵書天篆無有曉者林靈素逐字釋解乃是治中風方歌曰天生靈草無根榦不在山間不在岸始因飛絮逐東風泛梗青青飄水上神仙一味去沉疴採時須是七月半怕甚攤風與中風酒下三丸都汗散

大戟　味辛甘氣大寒陰中微陽有小毒種甚猥賤處處有生春發紅芽日漸叢長凡資入藥惟採正根傍附誤煎冷瀉難禁惡薯蕷使赤豆反甘草海藻芫花畏菖蒲蘆根鼠屎每與甘遂同利小便消水腫腹滿急疼除中風皮膚燥痛毆蠱毒破癥堅通月信墮胎散頸癧逐瘀○苗名澤漆味苦兼辛退邪熱皮膚卻浮腫面目大腹水氣立遣陰氣不足堪扶

澤漆 ノウルシ

河中府大戟 バマヒトクサ

蚤休 一名紫河車 味苦氣微寒有毒川谷俱有江淮獨多不生傍枝一莖挺立莖中生葉葉心抽莖年久發三四層上有金線垂下故又名金線重樓俗呼七葉一枝花也圖經云葉如鬼臼根若肥薑凡入藥中惟採根用主驚癇搖頭弄舌除濕熱發腫作瘡下三蟲解百毒或摩酒飲或摩醋敷

滁州蚤休 シヨウシウ

蘭茹 味辛酸氣寒有小毒近產河陽原出高麗苗逢春煖方起葉類大戟常青花色黃結子絕無根皮赤似蘿蔔根斷則流汁黑凝如漆故云漆頭五月採根陰乾惟取頭黑者勝使甘草節惡麥門冬載素問中云去惡血古姚僧坦用治癰疽作散頻敷肉滿便止破癥瘕殺疥蟲逐敗瘡死肌除大風熱氣善忘不樂亦著本經○又草蘭茹其根色白因醫取黑頭入劑採多燒熱鐵烙之作假代真主治不具敷潰瘍作散載古方亦多

淄州蘭茹 ニヒマクサ

衛矛（一名鬼箭羽）味苦。氣寒無毒。深山谷多產。平陸地絕無莖類栢皮褐黃葉似山茶青綠。幹有三羽。狀似箭翎。削取皮羽陰乾拭淨赤毛酥炙。（一說只使箭頭每兩用酥一分緩炒酥盡爲度）任煎湯液。專治女科。能墮妊娠。善療血氣。遣邪祟。殺蠱毒。破癥結。通月經。腹滿汗出。立瘳。崩中下漏。即止。消皮膚風腫。去腹臟白蟲。產後血絞肚痛。殊功。惡疰卒暴心痛捷効

衛矛（クソ　ユミ　ニシキ　在關東）

狼毒　味辛。氣平。不大毒。出陝西郡州。似商陸苗葉。採根八月。肉白皮黃。重實者良。（入水即死）浮虛者劣。使黑大豆惡麥。句薑破積聚痰癖瘕癥。去惡瘡鼠瘻疽癰。逐欬逆上氣。殺蠱毒鬼精。走獸飛禽。亦嘔殺害。

十七

右州狼毒（ヤマクサ　コハヤナキ）

淫羊藿（即仙靈脾）味辛。氣寒無毒。莖細而堅。葉圓而薄。所在俱有。凌冬不凋。俗呼爲三枝九葉草也。但生處不聞水聲者爲美。凡採製須先酒浸過。曝乾剉碎。對拌羊脂。（每一斤用羊脂四兩）火炒脂盡爲度。羊食貪合。故此著名。治男子絕陽不興。治女人絕陰不產。卻老景昏耄。除中年健忘。益骨堅筋。增力強志。久服有損。明載本經。

永康軍淫羊藿

沂州淫羊藿

羊躑躅　味辛。氣溫。有大毒。向陽山谷逢春則生起苗一尺餘高。結蕋二月半後葉如桃葉深綠花似瓜花正黃羊悞食之躑躅而死故本經竟名羊躑躅今南人反呼黃杜鵑依時採花陰乾入藥主風溫藏肌肉裏濈濈痺麻治賊風在皮膚中淫淫掣痛鬼疰蠱毒並治瘟瘧惡毒齊敺。

羊躑躅

味辛苦。氣寒。有毒。近道俱有。深谷多生。反芍藥細辛及五參人參沙參玄參丹參苦參勿用。惡大黃。使黃連。三月採根陰乾。去蘆微炒入藥專能發吐。不用煎湯。惟作散用主頭禿疥瘍。療腸癖瀉痢殺諸蟲除蠱毒。去死肌。愈惡癰。治喉痺不通。理風痰上壅。亦能醫馬塗癬併敷馬刀爛瘡。

解州藜蘆

解州藜蘆

莨音浪菪音蕩子即天仙子　未苦甘。氣寒有毒。山谷各處生。苗高四天許。葉濶三指。夏開白花。實同罌粟作房。子如黍米成粒。五月收採。向日曝

乾。主風癇癲狂。療濕痺拘急。助足健行見鬼。理齒蛀蝕出蟲。久服輕身。走及奔馬。炒熟方益。生則瀉人。別說云。煑一二日。尚入土萌芽。用者尤宜審也

秦州莨菪

ヲオミグサ 十七

タハコ

【續隨子】一名千金子 味辛。氣溫。有毒。苗如大戟。葉中抽莖。開花黃小。多層結實。青而有殼。人家亭囿。每種觀瞻。又因秋種冬生。春秀夏實。故又名曰拒冬實也。用須取仁紙裹壓以重石去油。復研成霜方可入藥。宜一切宿滯積聚。敷諸般疥癬惡瘡。逐水利大小二腸。散氣除心腹脹痛。毆蠱毒鬼疰。消痃癖瘕癥。通月經下痰飲。不可過服。防毒損人。其莖中白汁。旋收。敷白癜面皯即去

廣州續隨子

コハト

【蓖麻子】 味甘辛。氣平。有小毒。園圃中俱種胡地者益良。子如牛蜱色斑。葉類火麻。厚大。得名由此。其性善收。剝殼取仁。修製忌鐵鹽湯入砂鍋煑透（半日爲度）撈起以石臼搗糜。用敷無名毒疽。吸出有形滯物。剩骨立起。膿血盡追。塗足心。下胎孕子胞如神。塗巔頂。收生腸脫肛甚捷。塗口眼喎僻。即牽正復元（左患塗右右患塗左）見効急除。久則反損。因性峻急故也。亦堪服餌。方法須依。毆卒仆風癇（取仁一兩黃連切成豆粒一兩水一碗又砂鍋中文火旋煑水盡復添務週三日兩夜爲度取去黃連只用仁風乾不得見日每日一粒竹刀切四開每

服五粒作二十段荊芥湯送下食遠日三服不拘年久日近並効載衛生寶鑑消中滿水脹年壯人水研十粒服之去惡沫旋加至二十粒三日一服差載經文兼逐尸疰惡氣又主寒熱風虛服過者一生忌食豆入喉悞犯之頃刻作腹脹傾命攝生之士不可不知油榨取敷疥癩瘡痍調銀硃可爲印色葉搗蒸敷脚氣風腫熨顖上即止衄紅油塗炙蒸熨之尤驗

明州蓖麻

儋州蓖麻

謨按病分血氣藥別陰陽丹溪云蓖麻子屬陰主吸出有形質之滯物故取脂產胞衣剩骨膿血者用之荔枝肉屬陽主散無形質之滯氣故消瘤癢赤腫者用之苟不明此理而錯用治則不應也

華撥 味辛氣大溫無毒出番國中產竹林內苗作叢高二尺許葉圓綠濶二寸餘五月開花白色在表七月結子小指般長秋末收子陰乾辛烈過於蒟醬嶺南海舶貿易常多老黑者不堪紫褐者爲上消宿食下氣除胃冷溫中痃癖陰疝痛並驅霍亂冷氣疼立卻禁水洩虛痢止嘔逆醋心得訶子人參桂心乾薑爲丸治臟腑虛冷腸鳴洩痢神効仍殺腥穢食味堪調久服走泄眞陽令人腸虛下重根名華撥沒黑硬近似柴胡能治諸勞傷陰汗寒疝核腫

華撥

鬼臼　味辛氣微溫有毒齊杭襄峽最多深山陰地纔有獨莖起土內一葉竪莖端狀如傘蓋一云葉六出或五出如鴈掌旦東向暮西傾隨日出沒枯一莖爲一白逐歲增添每年長一莖莖枯爲一白二十年則二十白也要求真採之勿貿假誤也垣衣所畏制伏可資辟瘟疫惡氣不祥殺蠱毒鬼疰精物去目赤膚瞖療喉結風邪不入湯煎惟作散用

舒州鬼臼

齊州鬼臼

乾苔　味鹹氣寒一云溫無毒即地面青苔是也滲濕有背陰生療心腹悶煩研調水飲治霍亂嘔吐採煎汁嘗發諸般瘡疥殺蟲下一切丹石去毒但服不可過劑令人少血痿黃○生老屋上者名

利膀胱吊氣及浮熱在皮膚間○生古墻側者名垣衣主治疸心煩致暴熱攻腸胃內○陟釐生水石面止洩痢強胃氣消溫中○土馬騣生土墻頭涼骨蒸止鼻衄敗毒毆熱○井苔從井底覓療水腫漆瘡熱瘡○船苔向船底求治五淋鼻洪吐血○若邪生山石去小兒時熱驚癇○瓦松生瓦溝通女人經絡閉澁

謨按至賤之物如許之名蓋因所附不同以致主療各異瓦松雖則別種亦由滲濕而生故併錄之以便查考

鬼督郵　味辛苦氣平無毒所在山谷有必叢生苗惟一莖類小箭簳葉出莖端如繖根橫而不發鬚花開葉心其色黃白二月八月用惟採根甘草水煮一伏時漉曝乾任丸煎服主鬼疰卒忤中惡及百精毒去濕瘧時行疫癘併心腹邪強脚胻益膂力腰腿諸疾並可毆除今醫不審其真每每以徐長卿充代乖戾殊甚夫長節

赤箭下

赤箭鬼箭雖皆有鬼督郵別名而治大相異也務辯的實切勿混淆。

鬼督郵

蜀葵花 味甘。氣寒陰中之陽無毒。即家園紅白葵花惟川蜀產者最勝。色因有二。治亦不同。紅葵花治赤帶赤痢如神。血燥兼治白葵花毆白帶白痢速効。氣燥亦毆。子能催生墮胎。更療淋澁水腫一切瘡疥癰毒。研末俱可敷之。葉搗爛貼金瘡火瘡又煮食除熱痢丹痢。莖理惡瘡散血。根主客熱通便。根莖共煮汁吞。即解丹石熱結。○黃蜀葵花各種葉俠多缺而尖。催生產尤靈。敷金瘡更驗。子炒研調酒亦催產捷方。

蜀葵花

アラアヲヒ
アヲヒ
十六

紅葵花

黃蜀葵

大青　味苦。氣大寒無毒。多生郡蜀濠淄。亦產江東州郡。葉綠似石竹莖紫。花紅如馬蓼根黃。入藥用葉兼莖。春末夏初收採。仲景書內每每擅名。傷寒熱毒發斑。有大青四物湯飲効。傷寒身强春痛。有大青蔦根湯服靈。又單味大青煎湯。治傷寒黃汗黃疸天行時疫。尤多用之。仍署腫癰。且解煩渴。○小青異種惟產福州屬福建土人用治癰瘡。取葉生搗敷上。

大青

ハトクサ　十五

土瓜　味苦。氣寒無毒。一云有小毒。生平澤田野。及籬塹垣墻。一名土瓜。處處俱有。月令四月王瓜生。即此是也。作藤蔓。發葉多刺。微圓。逢夏至開花深黃單瓣實結一二寸。計多刺七八月間外殼紅黃如秬樓狀。中子紫赤似螳蜋頭。採入醫方。根子兩用。治小便疼遺不禁。潤心肺。解蠱毒。卻黃病黃疸。用子宜生。療下痢赤白雜來毆腸風除肺痿。止血溢血泄。用子須炒。根搗汁。去小兒閃癖痞滿及天行熱疾發狂。痰瘧暴生。並可服也。但少爲奇多服則吐下根煎湯。破婦人血瘕堅癥。併撲損瘀血作痛。乳汁不下。俱當飲之。過多不妙。仍逐骨節中伏水。更消損頸上瘻瘡。去濕痺痠疼。散癰疽焮腫通經墮孕。益氣愈聾。

均州王瓜

ヒサコウリ　カラスウリ　十八