圖像本草蒙筌卷之四

新安陳嘉謨廷采纂輯　門生　歙邑葉棐　鮑倚　校刊

潭陽後學劉孔敦　婿胡一貫　姪晨　若樸　增補

木部

【桂】味辛甘。氣大熱。浮也。陽中之陽也。有小毒。採皮宜冬至。同餌忌生葱。收必陰乾。勿見火日用旋咀片。餘剩須臍紙重裹。杞風免辛氣泄揚。種類多般。地產各處。【箘桂】正圓無骨。形類竹生交趾桂林。【牡桂】匾廣薄皮。產南海山谷。【官桂】品極高。而堪充進貢。却出觀賓。州名屬廣東一世人以觀字筆畫多懶書之故只作官如寫黃蘗作栢薑作姜同意亦通【木桂】皮極厚。而肉埋麄虛乃發從嶺。【筒桂】因皮嫩如筒。卷束。【板桂】謂皮老。若板坦平。【柳桂】係至軟枝梢。【肉桂】指至厚脂肉。【桂枝】枝梗小條。非身幹麄厚之處。【桂

〔心〕近木黃肉。但去外甲錯麄皮。品分既明。欺罔難入。又各主治。亦須詳知。箘桂筒桂相同。一說箘筒字近似人誤書之習以成俗也養精神和顏色耐老。牡桂板桂一類。堅骨節。通血脈墮胎。四者性並辛溫。難作風寒正治。柳桂桂枝味淡。能治上焦頭目。兼橫行手臂。調榮血和肌表。止煩出汗。疎邪散風。經云。氣薄則發泄是也。肉桂木桂性熱。堪療下焦寒冷。桁秋冬腹疼。泄賁豚利水道。溫筋煖臟。破血通經。經云。氣厚則發熱是也。桂心。美之之義。性略守。治多在中。官桂貴之之辭。味甚辛。治易解表。如此之異。蓋緣本乎天者親上。本乎地者親下。理之自然。性分所不可移也。然柳桂桂枝。入足太陽之腑。桂心入心。在手少陰之經。本經註云。桂有小毒。亦從類化。與黃芩黃連爲使。小毒何施。與烏頭附子爲使。全得熱性。與人參麥門冬甘草同用。能調中益氣。實衛護榮。與柴胡紫石英乾地黃同用。却主吐逆。與巴豆硇砂乾漆穿山甲水蛭虻蟲。如此有毒之類同用。則小毒化爲大毒矣。春夏禁服。秋冬宜煎。

謨按諸桂所治不同。無非各因其材而致用也。然本經謂桂止煩出汗。仲景治傷寒。乃云無汗不得服桂枝。又云。汗過多者。桂枝甘草湯。是又用其閉汗。何特反其經義耶。抑一藥而二用耶。噫此正所謂殊途而合轍也。蓋桂善通血脈。本經言桂止煩出汗者。非桂能開腠理而發出汗也。以之調其榮血。則衛氣自和。邪無容地。遂自汗出而解矣。仲景言汗多用桂枝者。亦非桂枝能閉腠理而止住汗也。以之調和榮衛。則邪從汗出。邪去而汗自止矣。昧者不解出汗止汗之意。凡病傷寒。便用桂枝湯。幸遇太陽傷風自汗者。固獲奇効。儻係太陽傷寒無汗者而亦用之。爲害豈淺淺乎。猶有謂仲景之治表虛。而一槩用斂虛汗者。此

又大失經旨矣。

官桂

牡桂

箘桂

栢實

味甘辛。氣平無毒。近道俱有。乾州屬四川獨佳。屋邊者爲宜。塚上者切忌。霜後採實。去殼取仁。先以醇酒浸曝乾。次取黃精汁和煮熱。筋連攪盡汁纔休研細成霜入劑方効。畏羊菊麴麵諸石。羊蹄[illegible]花神麴白麴一切石使牡蠣瓜子桂皮聰耳目。卻風寒濕痺。止疼。益氣血去恍惚。虐損歛汗。治腎冷腰冷。併膀胱冷膿宿水。潤腎燥體燥及面顏燥澁不光。興陽道殺百邪。止驚悸。安五臟頭風眩痛。亦可煎調。久服不饑。增壽耐老。○側栢葉苦澁。翠匾者採收。務向月令建方。春採東夏採南秋冬倣此纔得節候生氣。即止吐衄崩痢。重生髮鬚鬢眉。爲燥濕僊丹。係補陰要藥。若合黃連煎服。小兒蟲痢立痊。白皮燒灰敷火灼爛瘡。長毛髮亦驗。枝節釀酒主歷節風痺。療瘑疥尤靈。凡患疥瘡癩瘡及牛馬畜產有疥並燒敷二三次無不愈。

乾州栢實

密州側栢

黃蘗皮　味苦微辛氣寒陰中之陽降也無毒樹尚蜀產皮宜夏收擇內黃緊厚爲優去外褐麄糙纔製先漬蜜水日際曝乾次塗蜜糖火邊炙燥惡乾漆治三焦二製則治上焦單製則治中焦不製則治下焦也乃足少陰本藥又足太陽引經加黃耆湯中使足膝氣力湧出痿蹷即差和蒼朮散內（即二妙散）俾下焦濕熱散行腫脹易退佐澤瀉利小便赤澁配細辛擦舌賴紅瘡（一方同青黛研細入水片少許擦之亦効）安虛噦蚘蟲瀉隱伏龍火解消渴除骨蒸補腎強陰洗肝明目腸風連下血者立効熱痢先見血者殊功去膝腹內濕瘡逐膀胱中結熱女人帶漏亦可治之○〔根〕名檀桓如苓結塊療心腹百病主長生神僊不渴不饑安魂安魄

〔謨〕按內經云腎苦燥故腎停濕也活人解毒湯用黃蘗黃連黃芩梔子蓋梔子黃芩入肺黃連入心黃蘗入腎燥濕所歸各隨其類而然也上下內外並可治之積熱門中誠爲要藥至今醫家氣虛用四君子血虛用四物有痰用二陳有熱用解毒故常宗述而不易焉

黃蘗（キハダ）

三十五

商州黃蘗

楮實　味甘氣寒無毒迄道雖有滎陽（屬河南）獨多每產廢田又名穀實葉類蒲萄作瓣實如彈子結蓬初生綠青漸熟紅赤待深秋採摘浸水以去皮瓤取中子曝乾投酒再浸晝夜務蒸從巳至亥任用煎嘗爲丸陰痿能強水腫可退克肌膚助腰膝益氣力補虛勞

悅顏色輕身。壯筋骨明目。葉主小兒身熱。食下使生肌。皮煎逐水。利便。浸爛又可作紙。莖煮澡洗瘮癢立敺。皮開白汁。薦收塗癬。更敷蛇咬。○紙燒存性調酒。汁亦止血暈血崩。剪有印紙燒吞。衝門中有印信之紙。斷婦人產如神効。

楮實 三十六

謨按楮有二種。名亦不同。葉有瓣曰楮。葉無瓣曰構。音穀一說皮斑者楮。皮白者構。多生久廢穀田。結實味甘。又因名曰穀實也。詩云。爰有樹檀。其下維穀。是爾。即今幽州。猶云穀桑。荊揚交廣。

咸謂之構。每逢秋月。剝取其皮。或織為履穿。或搗作紙賣。色甚光澤。媒利無涯。折入醫方。惟貴其實。赤者頻服。不老不饑。筋力倍增。行及奔馬。並載經註。決無欺人。奈何滋補藥中。用之稀少。惜哉惜哉。

淡竹葉 味甘淡。氣平寒。陰中微陽。無毒。竹類頗多。難指何是。惟嘗笋味。淡者為然。筀竹雷竹水竹。味淡兼甜。治病第一。筀竹籀竹。味皆純淡。採用亦宜苦竹紫竹。苦辣而羶。不堪入藥。東坡蘇公云。淡竹者。對苦竹為文。除苦竹之外。皆淡竹也。迹此觀之。足可徵矣。逐上氣欬喘。退虛熱煩燥不眠。專凉心經。尤卻風痙。一種草類如鐵線莖似嫩櫻葉長[illegible]亦名淡竹葉。俗多採利小水治喉痺等證。並神効。根止消渴。散毒補虛。實通神明。輕身益氣。皮茹削去青色。惟取向裏黃皮。主胃熱。飽逆殊功。療噎膈嘔噦神効。○敗船茹原亦竹皮刮下。大艑艑。用程漏處極多。取乾

煑之亦止諸血○燒取竹瀝與荊瀝同。橫鋸截尺餘。直劈作數塊兩磚架起。緊火中烘。瀝從兩頭流出。少加薑汁調服。每瀝一盃加生薑自然汁二匙。卻陰虛發熱。理中風噤牙。小兒天吊驚癇。入口便定。婦人胎產悶暈。下咽即甦。衍義云。胎前不損子。產後不得虛。止驚悸。卻痰涎痰在手足四肢。非此不達。痰在皮裏膜外。有此可敺。但世俗反以大寒。置疑不用。殊不知係火煆出。又佐薑汁。有何寒乎。○竹肉狀如肉臠。每生苦竹枝上。鷄彈般大。生啖毒多。戟人喉顙來紅。且令爪甲變黑。須灰汁煑鍊三度。然後依常菜食之。殺三蟲。破老血。別有功効。人未盡知。○竹蓐惟盛夏間。狀類鹿角色白。係慈竹逢雨滋潤。每滴汁着地發生。同薑醬煑嘗。痢赤白治驗。○節內黃粉。即天竺黃。俗云天竺國生非也。旋飛塵沙結成老竹。間或可得。形類黃土。一名竹膏。治小兒急慢驚曲。療肥人卒暴風中。鎮心明目。解熱敺邪○

[illegible]氣。托痘瘡。更止消渴。利小水。○桃竹笋苦有毒。[illegible]竹者[illegible]須笋是也。用搗成膏。六畜皮肉生蛆。納入盡出。灰汁煑纔可食。不[illegible]戟人喉○更有僊人杖。味鹹是笋成竹時立死。色黑如漆。收宜夏初。惟苦筀竹多生。專主噦氣嘔逆。大人翻胃反食。以水煑嘗。小兒驚癇夜啼。安身伴睡。痔漏去血。燒末湯吞○舊笓齒亦載醫方。治活蟲入腹為病。狀如癥瘕。煑服即除。

淡竹葉

松脂　味苦甘氣溫。無毒。普天下植養。州土不拘。大水中流來。瀝清

松脂別名便是。採取媒利。鑿多竅可遂貪心。鍊餌延年。待自流。易奏捷効。擇通明成顆。分向背陰陽。向南日月照者爲陽脂。向北日月背者爲陰脂。陽脂補陽。陰脂補陰。僊經亦云不見日月者。皆可取服以人多陰虛。欲其專補陰。爾製鍊有方。依式勿錯。水盛釜內。甑安水傍。白茅藉甑底兩層。黃沙蓋茅上寸許。松脂任布。桑柴緊炊。湯減少旋添。脂流盡方出。新笊篱。掠投冷水。沉釜底者勿用候凝結。復炊如前。週畢三迴。色白如玉。研和群藥加白茯苓栢子仁甘菊花共劑亦可單服爲丸酒吞。逐諸風。安五臟。除伏熱胃脘。解消渴咽喉。輕身通神。延年耐老。熬膏貼瘡毒長肉。作散治齒痛殺蟲。實主少氣虛羸。兼毆風痺。花雖輕身益氣發熱上焦。菩花底菩收曬乾。研末羅細雞清雞彈清丸成豆粒。暑痢止澁如神。根白皮主辟穀不饑。補虛損勞乏。節性溫。燥血中之濕。卻脚痺軟疼。葉味苦溫。能生毛髮。搗爛敷風濕瘡効。懸掛

松脂

蘿瘟疫氣靈。歷節諸風。漬酒可服。松蘿一名女蘿詩云蔦蘿施于松上陶云蔦是寄生當用桑上者女蘿當用松上者苦甘無毒。煎濃可作吐湯。湧客痰。截溫瘧。利水道。毆頭風。掃頂上瘡痍。去項間瘤癭。虛汗堪止。嗔怒能消。

茯苓　味甘淡。氣平。屬金。降也。陽中陰也。無毒。近道俱有。雲貴雲南貴州獨佳。產深山谷中。在枯松根底。由木被斧斤砍伐。或老遭風雹折摧。枝葉不復上升。津氣旋向下泄。凝結成塊。乃名茯苓。因其本體相離。故取附之之義。小如鵝卵。大若匏瓜。猶類龜鼈人形。並尚沉

重結實。四五斤堀者愈佳久藏留。自無朽蛀。初收採須仗陰乾。咀片水煎。黑皮淨削。研末丸服。赤筋盡淘茯苓中有赤筋最損目爲丸散久服者研細末入細布袋中以冷水揉擺如作葛粉狀澄取粉而筋滓在袋中者棄去不用若煎湯則不須爾方益心脾。不損眼目。忌酸物。惡白斂。仍畏牡蒙。地榆。雄黃。秦艽。龜甲。種赤白。主治略異。經上下行走自殊。赤茯苓入心脾小腸。屬巳丙丁。瀉利專主。白茯苓入膀胱腎肺。屬辛壬癸。補益兼能。甘以助陽。淡而利竅。通便不走精氣。功並車前。利血僅在腰臍。効同白朮。爲除濕行水聖藥。乃養神益智僊丹。生津液緩脾。敺痰火益肺。和魂鍊魄。開胃厚腸。卻驚癇。安胎孕。久服耐老。延年不饑。儻汗多陰虛者誤煎。傷元夭壽。若小便素利者過服。助燥損明。暴病有餘相宜。久病不足切禁。凡須細察不可妄投。○茯神附結本根。因津泄少。謂既不離其本。故此爲名。體比苓略鬆。皮與木須去。所忌畏惡。悉倣於前。專理心經。善補心氣。止恍惚驚悸。除恚怒健忘。心木名黃松節。載經偏風。致口喎僻治驗

謨按經註有曰。松木既樵。根尚能生物者。何也。蓋因精英未淪。沾其土氣。不能不爲物爾。正猶馬勃菌簟五芝木耳。石耳之類。多生枯木潤石糞土之上。則可知焉。其上菟絲下有茯苓之說。甚爲輕信者矣。又曰。茯苓爲在天之陽。陽當上行。何謂利水而瀉下也。經云。氣薄者。陽中之陰。所以茯苓利水瀉下。亦不離乎陽之本體。故入手足太陽經焉。丹溪又曰。茯苓猪苓澤瀉。各有行水之能。久服損人。八味丸用之。亦不過接引諸藥。歸就腎經去胞中。久積陳垢。以爲搬運之功也。

第一卷白朮款後謨按宜參看。

茯苓

琥珀　味甘。氣平。屬金陽也。無毒。出自松脂所化。入土千歲纔成。初如桃膠。久漸堅硬。西戎多產。色淡澈光。南郡亦生。色深重濁。（欲首飾澈光爲奇。入藥剤重濁不計）手摩熱。可拾草芥。湯煑軟。儼若餳糖。遇物即粘。如是方妙。今市家多煑鷄彈及青魚枕造成。不可不細詳焉。入藥研末用湯調吞利水道。通五淋。定魂魄。安五臟。破癥結瘀血。殺鬼魅精邪。止血生肌。明目摩瞖。治產後血暈。及兒枕疼。療延爛金瘡。併胃脘痛。○又種「墜」者。名異產同。狀似玄玉而輕。質亦松脂化出。歷二千載方得成形。安神補心益佳。生肌破血尤善。不堪造器。見風即開。小兒帶之。謂能辟惡。

謨按丹溪云。古方用琥珀利小便。以燥脾土有功。蓋脾能運化肺得下降。故小便可通也。若血少而小便不利者。用之反致燥急之患。不可不謹。別說又云。茯苓琥珀。皆自松出。而所禀各異。茯苓生成。俱陰。琥珀生於陽而成於陰。故皆治榮而安心利水。其効同也。

墨　味辛。無毒。擇係松煙造成。摩入藥劑主治。煙細纔効。煙麄不靈。其桐油煙石油煙。併粟草灰僞爲者。俱不可以治病也。止血果捷。因黑勝紅。故天行熱毒。鼻衄下血數升。水摩滴入。若產後血暈。崩中卒暴來紅。摩醋服之。遊絲纏眼中。摩鷄血速點。客忤中腹內。摩地漿頓吞。下死胎。而逐胎。合金瘡。以生膚肉。

槐實　味苦辛鹹氣寒無毒。折枝插地即活。人家多植門庭。實生莢中。十月收採。粒大如豆。色紫。[illegible]堅。一莢兩粒三粒者。爲良。若係單粒五粒者勿用。小銅鎚擊碎。爲牛乳浸宵。蒸過纔煎。景天爲使。主五內邪熱。去五痔腫疼。七月二十日取搗絞汁貯銅器內置高處曝以上煎稠硬圓如鼠糞大納穀道內三易之乃愈止涎唾。補絕傷。凉大腸。消乳瘕。除男子陰瘡濕癢不歇。卻女人產戶痛癢難當。仍理火瘡。且墮胎孕。酒吞七粒。催產尤良。嫩房莢收煎代茶。去頭風明目補腦。老莢疎導風熱。亦可取搗煎嘗。白皮煮酒治風。皮膚不仁服効。[illegible]陰疝卵腫。卻壯熱驚癇。莖葉功同。總治瘡毒。熬膏貼癰疽潰爛。煮汁漱口齒風疳。根作神燭可燒。仍主喉痺寒熱。枝洗瘡住癢。煅揩齒殺蟲。花味甚苦炒黃。亦凉大腸去熱理腸風瀉血。及皮膚風。止痔瘻來紅。併赤白痢。去胃脘卒痛。殺腹臟蛔蚘。膠主諸風化涎任[illegible]湯散丸服。卻風痺肢難舉動。散風毒身如蟲行噤口急風殊効。破腦傷風立効。槐耳係菌亦樹所生。堅如桑耳者良。用作細末[illegible]服。去婦人陰中瘡痛。治痔瘻穀道血流。

槐實　三十五

枳實　味苦酸氣寒。味薄氣厚。陰也。陰中微陽。無毒。商州屬河南所生。似橘極小。擇如鵝眼。色黑。陳者良。近道亦生一種俗呼臭橘其皮微綠不堪藥用今市家每採指爲綠衣者欺世媒利無益有損故凡入藥劑必求黑色爲異也剜淨內瓤。剉片麩炒用。本與枳殼一物。因收遠近異名。枳實秋收枳殼冬採。今醫者不以此泥。惟視

皮厚小者爲實。完大者爲殼也。殼大則性詳而緩。治高高者主氣。治在胸膈[illegible]性酷而速。治下下者主血。治在心腹故胸中痞。肺氣[illegible]也。有桔梗枳殼湯之煎。心下痞。脾血積也。有白朮枳實湯之用。白朮補脾枳實去脾經積血脾無積血則不痞也此高下緩急之分。易者詳定以爲準的也。除脹滿消宿食削堅積。化稠痰破氣。佐牽牛大黃芒硝。益氣佐人參乾薑白朮。仲景加承氣湯內。取疏通破結之功。丹溪入瀉痰藥中。有倒壁衝墻之捷。樹皮治風中身直。久不能屈伸。根皮主痔瘻來紅。及腸風臟毒。樹莖併皮收採。水脹風痛齊毆。○其大枳殼亦貴陳年。取翻肚如盆口。辱製剜瓤剉片麩炒。瀉肺臟寬大腸。結氣胸中。兩脇虛脹者急服。發瘮肌表遍身苦癢者宜加。逐水飲停留關節並利。破痰癖積聚。宿食亦推。同甘草瘦肉殼枳散和黃連滅痔即連殼先能損至高之氣不宜接迹服多。虛怯勞傷尤當全禁。

第七卷青橘皮款後 謹按宜參看

枳實

女貞實即冬青樹子味苦甘。氣平無毒。鄉落幽居。多植遮護。能欺霜雪。又名冬青。黑實遇冬至採收。衣皮將布袋挼淨。酒浸一宿。日曝待乾研末爲丸。用旱蓮草熬膏合妙。搗碎漬酒同生地黃投罐煮良。黑髮黑鬚強筋強力安五臟補中氣。除百病養精神。多服補血去風。久服健身不者。樹皮凉而無毒。若清酒每日飲。亦益肌膚。枝葉煎可染緋。又燒灰面膏塗能治癉瘃。木白紋細。函板堪爲。○蟲白蠟

附樹枝結成係小蟲食樹汁化者。蟲類蟻蟲有白有黑每食冬青樹汁久而化爲白脂熔則成蠟人謂蟲屎着樹而然非也亦有不變蠟者則結苞枝上初如黍米漸圓大青紫宛若樹之結實土人呼爲蠟種來年春深則苞拆而蟲出延樹矣欲廣蓄者候苞將拆時連枝採繫他樹其蟲亦應候而出逢秋刮取以水煑溶濾置器之中。或濾冷水內亦可但去渣滓淨爲美自然凝聚成塊文理瑩澈不忝石膏本經原脫漏未書。丹溪始珍重纔用嘗與戴原禮簡云。白蠟者。[illegible]收斂堅凝。誠爲外科要藥生肌止血定痛。接骨續筋補虛與合[illegible]皮同煎。入長肉膏神効。但未試可服否。其合歡皮服之驗矣。蠟二蜜白蠟人可服餌本經石蜜款內曾已載詳其蟲白蠟本經未後因丹溪此簡有未試可服否一句廼知言此蟲蠟也故採之補脫漏

百蠟塵取能治瘵蟲。

三十六

女貞實

子ヅミモチ

子ヅモ十ノ

楝實 餘錄子 味苦氣寒有小毒蛟龍極畏堤岸多栽在處有之[illegible]獨勝。木高丈餘略大葉密如槐稍長花紅紫甚香。實青黃類彈。待冬收採。向日曝乾。取肉堪煎。去皮去核。一說將核搗碎。漿水煑一伏時。漉曬收藏。亦堪入藥。大抵用核莫用肉。用肉莫用核。此常理也。主中濕傷寒。大熱煩狂。理膀胱小腸疝氣吊痛。利小便水道。殺三蟲疥瘍。根性微寒。雌雄兩種。雄根赤無子。大毒忌煎。雌根白子多微毒。宜採擇向東者。纔入藥。靈略刮外青。只留裏白。單味煎酒。大能追蟲。宜月前忌月後。月半前蟲頭向上月半後蟲頭向下先啖雞彈餅。引蟲口開。頓飲濃藥湯。過晝即利。多則成團追下。少則逐條推來。積聚行。疼痛止。亦堪研細末。敷作癢蟲瘡。○又石茱萸即花落子。外科亦用。醫者當知

三十五

楝實（アフチ　センダン）

蕤核　味甘。氣溫微寒。無毒。生函谷及巴西河東。類烏豆。但略圓而匾。外有紋理。六月採收。碎核殼取仁。去皮尖研爛。輔佐良藥。專治眼科。消上下皰風腫爛弦除左右眥熱障努。肉退火止淚。益水生光。蕤子啖之。亦止鼻衄。

三十六

蕤核

厚朴　味苦辛。氣大溫屬土有火。陰中之陽。可升可降。無毒。樹甚高大。榛乃別名。陝西川蜀多生。梓州（屬四川）出者獨勝。凡資治病。秋盡採皮擇厚脂。顏色紫瑩佳。去麄皮薑汁炒褐用。惡寒水硝澤（寒水石硝石澤瀉）使炮熟乾薑。諸豆忌之。食則動氣。土中風寒熱。治霍亂轉筋。止嘔逆吐酸。禁瀉痢淋露。消痰下氣。與枳實大黃同用。實滿能泄。溫中益氣。與陳皮蒼朮同用。濕滿能除。與解利藥同用。則治傷寒頭疼。與洩痢藥同用。則厚腸胃大抵味苦氣溫故用苦則泄。用溫則補。衍義云。平胃散中。用之最當。既溫脾胃。又走冷氣。再隨證加減。不可勝言。潔古亦曰。治腹痛脹滿。散結之神藥也。儻患者虛斟酌少加。對證不真。誤服太過。則反脫人元氣。豈不慎哉。若氣實人服多參耆。致成喘悶者。正此泄除不在禁也。孕婦忌用。女科當知。○子入醫方。又名逐折。散結療鼠瘻。益氣明眼睛。

厚朴

ホヽノガル 三十五
ホカシワ

謨按丹溪云。厚朴氣藥。溫而能散。故泄胃中實也。平胃散用佐蒼朮。正乃泄去上焦之濕。不使胃土太過。得復其平。致於和而已。非謂溫補脾胃焉。習以成俗。皆謂之補。哀哉。然治腹脹者。因味辛能提其氣故爾。

桑根白皮 味甘而辛。甘厚辛薄。氣寒。可升可降。陽中陰也無毒。山谷出少。家園植多。山桑質堅。本堪作檐。家桑氣厚。葉可飼蠶。凡入劑中。須覓家者。近冬收採。如式製精根出土外者。殺人。根向東行者得氣。得生氣也皮取近木洗淨。留白去青片用銅刀咀成惡鉛忌。稀蜜拌透。文火炒乾。爲使續斷桂心。入手太陰肺臟。甘助元氣。補勞怯虛羸。辛瀉火邪。羅謙甫曰桑白皮瀉肺是瀉肺中火邪非瀉肺氣也火去則氣得安矣止喘嗽嗜血利水。消腫解渴。毆痰。刀刃傷作線縫熱鷄血塗即合。皮中白汁取依四時。春夏取向上者從升。枝幹皮汁也秋冬取向下者因降。根皮汁也敷金瘡血止。剝白皮裹之令汁得入瘡中良敷蛇咬毒消。點唇裂易差。染褐色不落。釜中煎如糖赤。老痰宿血並推。葉採經霜者煮湯。洗眼去風淚殊勝。鹽搗敷蛇蟲蜈蚣咬毒。蒸搗署撲損瘀血滯凝。煎代茶。消水腫脚浮。下氣令關節利研作散。湯調止霍亂吐瀉。出汗除風痺疼。炙和桑衣煎濃。治痢諸傷止血。枝煎常飲。耳目聰明。去手足拘攣。脚氣兼散。潤皮毛枯槁。風癢且毆。陰管通便。眼眶退暈。利喘嗽逆氣。消焮腫毒癰。椹收曝乾。蜜和丸服。開關利竅。安魂鎮神。久服

不饑聰耳明目。〔黑椹〕絞汁。係桑精英。入鍋熬稀膏。加蜜攪稠濁。退火毒。貯磁瓶夜臥將臨。沸湯調下。每服一二錢止。解金石燥熱止渴。染鬚髮皓白成烏。一方黑椹一升和科斗子一斤瓶盛封閉懸屋東向百日化爲泥染白鬚如漆又方取黑椹二七和胡桃脂研如泥拔去白鬚點孔中生黑鬚〔柴灰〕辛寒淋汁。小毒。合冬灰爲爛藥。醫外科著奇功。蠲惡肉死肌。滅瘢疵黑痣。能結鉛汞。會益丹家。○〔桑耳〕有毒味甘。古方入劑屢用。一名桑菌。又名桑黃。老樹上多雨即生。軟濕者。作葅堪啖。採收剉碎。醇酒煎嘗。散血如神。止血甚捷。黑者主女人癥瘕崩漏帶下。及乳腫暴來。黃者治男子癖飲積聚腹疼。併金瘡初得。若色黃熟陳白。止洩補益元陽。○〔桑花〕非指桑椹花爲云。乃樹上白蘚。其狀因與地錢花相類。故假此立名。刀削取之。火炒入藥。性緩無毒。健脾澁腸。寒崩中。禁帶濕。鼻紅吐血愈。腸風下血安。〔桑上蠹蟲〕主卒心痛。金瘡潰爛。亦可生肌。○〔桑上寄生〕節間生出葉厚軟如橘葉。莖肥脆類槐枝。別樹雖有不靈。獨桑氣厚甚妙。儻求主治。須認精詳。或云碎其實。有汁稠粘者眞。又曰折其莖。以色深黃者是。固當宗此辯別。仍貴纏附桑枝。外科散瘡瘍。追風濕。卻背强腰痛。篤疾女科安胎孕。下乳汁。止崩中漏血沉疴。健筋骨。充肌膚。愈金瘡。益血脉。長鬚長髮。堅齒堅牙。〔實〕服通神。輕身明目。

桑根白皮

桑上寄生

謨按木部之中。惟桑寄生。最難得其眞者。必須近海桑樹。生意郁濃。地煖不蠶。葉無採捋。節間自然生出。纏附桑枝。採得陰乾

乃可入藥。其諸桃梅榆柳櫸櫸松楓等上。間或亦有寄生。不似桑木氣厚。假桑之氣以爲佳爾。故凡風濕作痛之證。古方每用獨滑寄生湯煎調。百發百中。今人服之杳無奏其功者。豈非藥不得眞之故歟。况古明醫用藥立方。必以主病者爲君。所用川獨滑桑寄生。能去風勝濕以爲主藥。誠爲合宜。奈今賣藥之家。因難得眞。往往收採雜木寄生。指爲桑寄生媒利。種雖同類氣味大殊。且川獨滑。亦未辯認分明。每用土當歸假代。兩俱燥性。耗衛敗榮。無益有虧。寧不增劇。近幸茭山吳氏。辯認獨滑。原本羌滑一種。以節密輕虛者爲羌。節疎重實者爲獨。川續斷。與桑寄生。氣味略異。主治頗同。不得寄生。即加續斷。便立名曰。羌活續斷湯。使醫者不泥於專名。病家勿誤其假藥。仁恩溥濟。何其淵哉

椿樗（イヌダラ）

〔樗根白皮〕味苦澁氣寒。有小毒。南北俱各有生。其木最爲無用。本多壅腫。難定墨繩。枝乃曲拳。不中規矩。與椿木相類。須辯認分明。無花不實。木身大。其幹端直者爲椿。有花而莢。木身小。幹多适矮者爲樗。又曰椿木實而葉香。樗木疎而氣臭。今人不識樗名。故多呼爲臭椿樹也。入劑挖東引細根。刮外取白皮蜜炙。止女人月信過度。久痢帶漏崩中。禁男子夜夢遺精。滑洩腸風痔瘻。宿小水敺蛔蟲。其〔莢〕收採曝乾。大便去血尤効。○〔椿白皮〕主疳蠱。亦惟白者爲良。止血功同。女科任用。

椿樹

讀按汪石山曰。椿樗二木各有兩種。一種皮赤。一種皮白。白者先花後葉。其樹身皮麄糙如粟粒。赤者先葉後花。其樹身皮細膩而不麄。葉皆相同。香臭無別。醫之所取。皆在白皮。故入藥無問椿樗。但擇皮白者採收。不必以香臭爲泥也。

〔榆皮〕味甘。氣平。性滑利。降也。無毒。多生山谷。處處有之。取向裏白皮。旋曬乾入藥。勿令中濕。濕則傷人。通水道除五淋。壓丹石。利關節。搗和釅醋。凡赤腫薄敷。煎成膏飴。但寒齁連服。老人服久多睡。孕婦服即滑胎。新剝搗爛如糊。用粘瓦石甚固。〔皮涎〕敷癬。殺蟲立差。〔葉〕壓石丹尤靈。生服一兩頓効。爲羹日飲。水腫即消。〔花〕主小兒驚癇。亦利尿管閉澁。〔實〕生有莢。作醬甚香。因味微辛。肺氣能助。殺諸蟲。消心腹惡氣。併卒心疼。療小兒塗痂疕頭瘡。及諸癬疥。〔莢〕作羹少和牛肉。婦人食即止帶崩。

榆皮

秦皮　味苦氣寒沉也。陰也。無毒。產陝西郡州。及廬江川谷。木類檀木。根同槐根。葉如匙頭少光。皮多白點不糙（不麄糙也）俗因呼爲白樗木。又呼石檀樹。苦樹。咸取像焉。秋末採皮。陰乾待用。漬水水色侵碧。書紙紙面略青。此驗纔真。凡求勿悞。使大戟惡吳茱瓠葵（苦瓠防葵）專眼科。去肝中久熱。煎汁澄淨。點洗無時。白膜遮明視物不見者旋効。赤腫作痛。流淚無休者殊功。益男子精衰。止婦人帶下。小兒發熱癇搐亦可作湯浴身。風寒濕痺兼毆熱痢後重。且卻經云。以苦堅之。故用白頭翁黃蘗秦皮之苦劑也。久服髮黑。亦使身輕○

〔樗木皮〕多出產江南。作湯末。可洗敷蛇咬

秦皮

ト子リコノキ　タムキ

海桐皮　味苦。氣平。無毒。出雷州（屬廣東）及近海州郡。似桐皮而堅韌白黃。收採無時。任煎湯液主霍亂赤白久痢。除疳䘌疥癬牙蟲漬酒治風蹷殊功。漬水洗赤眼神效。堪作繩索。入水常存。（浸不爛也）

海桐皮

三十五

山梔子　味苦氣寒味厚氣薄氣浮味降。陰中陽也。無毒。一名越桃霜後收採。家園栽者肥大且長（此號伏擬梔子）只供染色之需。五稜六稜弗計。山谷產者。圓小又薄堪爲入藥之用。七稜九稜方良折梗及鬚。研碎纔炒。（止血用須炒黑色去熱用但燥而已）留皮除熱於肌表去皮卻熱於心胸。（一說去皮瀉心火留皮瀉肺火）其所入之經。手太陰一臟。因輕浮象肺。色赤象火。故治至高之分而瀉肺中之火也。本不能作吐。仲景用爲吐藥者。爲邪氣在上。拒而不納。食令上吐。邪因得出。經曰在高者。因而越之。此之謂也。易不能利小便。易老用利小便者。實非利小便。乃清肺也。肺氣清而化則小便從此氣化而出。經曰膀胱爲津液之府。氣化則能出者。此之謂也。本經又謂治大小腸熱。及胃中熱者。此因辛與庚合。又與丙合。又能泄戊。其先于中州故焉。加生薑橘皮。治嘔噦不止。加厚朴枳實。除腹滿而煩。加茵陳。治濕熱發黃。加

甘草。治少氣虛滿。儻除煩燥於心內。須加香豉而建功。蓋煩者。氣也。燥者（懊憹不眠之謂）血也。氣主肺。血主腎。故用梔子治肺煩。用香豉治腎燥也。若加生薑絞汁。尤治心腹久疼。上焦客熱善毆。五種黃病竟解。去赤目作障。止霍亂轉筋。赤白癩瘡酒皰皶鼻。五內邪氣。悉能除之。丹溪又曰。解熱鬱。行結氣。其性屈曲下行。大能降火。從小便泄去。人所不知也。

三十六

山梔子

枸杞子　味甘苦。氣微寒。無毒。近道田側俱有。甘肅州（並屬陝西）者獨佳。春生嫩苗作茹。爽口。秋結赤實。入藥益人。依時採收。曝乾選用。紫熟味甜。粗小膏潤者有力。赤黯味淡。顆大枯燥者無能。今市家多以蜜拌欺人。不可不細認爾。去淨梗蒂。任作散丸。明耳目安神。耐寒暑延壽。添精固髓。健骨強筋。滋陰不致陽衰。與陽常使陽舉。諺云。離家千里。勿服枸杞。亦以其能助陽也。更止消渴。尤補勞傷。葉搗汁注目中。能除風癢去膜。若作茶。啜喉內亦解消渴強陰。諸毒煩悶善毆。麵毒發熱立卻。葉上蟲窠子。收曝。可同乾地黃作丸。不厭酒吞。甚益陽事。莖名僊人杖。須識皮膚骨節風能追。熱毒兼消。瘡腫可散。○地骨皮者。性甚寒涼。即此根名。惟取皮用。經入少陰腎臟。併手少陽三焦。解傳尸有汗。肌熱骨蒸。療在表無寒風濕周痺。去五內邪熱。利大小二便。強陰強筋。涼血涼骨。

謨按本草款中。竹笋立死者。既名僊人杖。此枸杞苗莖又名僊

人杖藏器拾遺篇內。一種菜類。亦名僊人杖。何併此三物。而同立一名。古今方書。奏療或有用之。但僉其名。而未細註其物者。當考究精詳。必得證治相合。庶不失於孟浪也。

枸杞子

三十九

辛荑　味辛。氣溫無毒。原產漢中川谷。今則處處有之。人家園庭亦每種植木高數丈。花開兩蕃。臘結苞。似着毛小桃。春開花於未葉禿樹。北人呼爲木筆。南人喚作迎春。花謝纔生葉綴枝。葉盛復開花作朵。有紅紫二種。多香氣熏人。凡收採入藥同煎。宜未開花蕊苞蕋刷去毛。免射人肺。摘去心。不致人煩。畏惟菖蒲蒲黃黃連石膏四藥。惡石脂。使芎藭。止頭腦風疼。面腫引齒痛。眩冒除身體寒熱鼻塞有香臭不聞。生鬚髮殺蟲。禁清涕。通竅。久服。明目下氣輕身。

辛荑

コフハシカミ　コフシ　三十四

酸棗　味酸。氣平無毒。生河東川澤。秋採實陰乾。因肉味酸。故名酸棗。凡使入藥。碎核取仁。粒區色丹。亦不易得。市家往往以棘實充賣。不可不細認焉。能治多眠不眠。必分生用炒用。多眠膽實有熱。生研末。取茶葉薑汁調吞。不眠膽虛有寒。炒作散。採竹葉煎湯送

下。儻和諸藥共劑。却惡防已須知。寧心志。益肝補中。斂虛汗。敺煩止渴。去心腹寒熱五臟能安。療手足痠疼。筋骨堪健。久服長壽。核殼燒末水調。刺入肉中。敷効

酸棗

サンヅラト　三十六

杜仲　味辛甘。氣平溫。氣味俱薄。降也陽也。無毒。漢中屬四川產者第一。脂厚潤者爲良。刮淨麄皮。咀成薄片。薑汁潤透。連炒去絲。凡爲丸散煎湯。最惡玄參蛇蛻。補中强志。益腎添精。腰痛不能屈者神功。足疼不能踐者立効。除陰囊濕癢。止小水夢遺。

杜仲

ハヒマユミ　三十五

山茱萸　味酸澁。氣平微溫。無毒。多出漢中。遍生山谷。因名蜀棗。生青熟紅。近霜降摘取陰乾。惡桔梗防風防已。宜蓼實爲使。入肝腎二經。合散爲丸。惟取皮肉溫肝補腎。興陽道以長陰莖。益髓固精。煖腰膝而助水臟。女人可勻經候。老者能節小便。除一切風邪。卻諸般氣證。通九竅。去三蟲。强力延年。輕身明目。其核勿用。滑精難收

謨　按經云。滑則氣脫。山茱萸之澁。以收其滑。入味丸用之。無非

取其益腎而固精也。本經謂其九竅堪通。是又盡信書。則不如無書矣。

山茱萸

三十六



合歡（即交枝樹）味甘。氣平。無毒。生產雍洛。（並屬河南）每植庭除。葉如槐葉。甚密繁木似梧桐但枝軟。其枝互相交合。風來轍自解開。故因名曰合歡。俗又呼爲交枝樹也。採皮及葉。不拘月時。利心志補陰。安五臟明目。令人事事遂欲。時常安樂無憂。（皮）採煎稠膏。散腫癰續斷筋骨。（葉）搗絞濃汁。浣衣服去黑垢黴。

合歡

三十五

接骨木（味甘苦。氣平。有小毒。本經云無毒誤也）木高一二丈許。輕虛無心。砍枝插土即生。遞京多植。花葉並類陸英水芹。故又名木蒴藋也。專續筋接骨。易起死回生。折傷頻漬酒吞。風癢堪作湯浴。任煑三次。功力一般。產後諸疾亦毆。女科方藥中屢用。（葉）主瘧。生搗汁飲（大人七葉小兒三葉）惟得吐。寒熱竟除。（根皮）採收亦堪煎服。痰瘧痰飲吐去。水腫水脹利消。見効即停切勿終劑○又種（折傷木）多產資州山屬係藤繞大樹引長。其葉如茴草圓厚。八九月內。採莖日乾。主

折傷筋骨殊功。散產傷血痢立効。酒水煮飲。並與前同。

接骨木 ミヤトコギ カンホク

木槿 味苦氣平無毒。株幹不高。在處俱有。花淺紅。朝開暮歛。葉淡綠。秋瘁春生。沿栽則籬障可爲。入藥須花枝各用。枝主痢後熱渴。令人得眠。絞汁度絲。軟滑易絡。花主瀉痢腸風。澁腸止血。作湯代茗。風癢漸敺。二者用之。並宜炒過

木槿 ムクケ

伏牛花 味苦甘。氣平無毒。一名隔虎刺花。惟生蜀益近郡川澤中纔有。莖深赤刺多。葉青細。似蘗葉而不光。花淺黃。如杏花而作穗。三月半後收採。陰[illegible]主大風遍身碎疼。療濕痺四肢攣急。五痔下血堪止。風眩頭痛[illegible]敺

伏牛花 三十六

南藤 即丁公藤 味辛。氣溫無毒。出泉州榮州。並屬福建 生南山山谷。常依楠木故名南藤。葉如杏葉略尖。苗似馬鞭無節。皮色紫褐。收採無時。專治風疼。用漬酒服。排風邪。强腰膝除痺。主風血。補衰者起陽。性烈

亦可摩吞。令人皓髮變黑。○石南藤生于石上。株高大。凌冬不凋如枇杷葉。但背無毛似椿樹花。細碎成簇。秋結紅實。收採隨時。湖浙甚多。一名鬼目。惡大小薊。使五加皮。治腎衰脚弱最宜。療風淫濕痺並効。女人不可久服。犯則切切思男。實殺蟲毒尤靈。亦逐風痺積聚

泉州南藤（クチグサ）

蔓荊實　味苦。辛甘。氣溫微寒。陽中之陰。無毒。不拘州土。惟盛水濱。實係蔓生。名因直述。大如梧子。色黑輕虛。依時收採陰乾。炒研去衣纔用。乃太陽經藥。惡烏頭石膏。主筋骨寒熱。濕痺拘攣。理本經頭痛頭沉昏悶利關節長髮髭。通九竅去蟲散風淫明目腦鳴。乃止齒動尤堅。久服耐老輕身。令人光澤脂緻（音雉）胃虛者禁服。恐作禍生痰。

蔓荊實（ハマハフ）

牡荊實　味苦。氣溫無毒。高岸田野。俱各叢生。種有青黃兩般。惟取青者爲上。因莖堅勁。故以牡稱。鄉人只呼黃荊。法司常作箠杖。入月採實。向日曝乾。凡入藥中。必須炒研。防風爲使。單惡石膏。下肺氣上欬逆咽喉。通胃氣除寒熱骨節。通神見鬼。又載僊方。得栢實青葙療頭風甚驗。葉主脚氣腫滿濕䘌濕瘡。仍治霍亂轉筋。血淋

血痢〔根〕解肌發汗。煎服爲宜頭肢體諸風毆逐悉効。○又有〔荊瀝〕多截莖條。磚架火上。炙熏瀝取兩頭流滴。加薑汁傳送（每瀝一盃加薑汁二茶匙）消痰沫如神。治老人中風失音昏危。療小兒發熱驚癇抽搐。氣實能食者宜服。氣虛少食者忌之。故丹溪云。虛痰用竹瀝實痰用荊瀝。二味俱開經絡。行血氣要藥也。

牡荊實（ニトヨスフ）　三十六

〔猪苓〕味甘苦淡。氣平降也。陽也。無毒。多產衡山八月收採作塊類猪糞。故此名猪苓。用須去淨黑皮。經入膀胱與腎。通淋消腫滿除濕利小便。蓋苦泄滯甘助陽。淡利竅。故爾。衍義又云。行水之功居多。大能燥亾津液。儻無濕證。勿輕用之。若久煎嘗損腎昏目

猪苓　三十七

〔紫葳〕（即凌霄花）味酸氣微寒。無毒。多生山谷。處處有之。初作蔓藤依木。旋長歲久延引。直至杪梢。夏開黃赤色花。因以凌霄爲譽。稱時採曝惟畏鹵鹹。取其有守能獨行。故用女科調月信。治血痛要藥。補陰衰捷方。崩中帶下立安。癥瘕血閉即逐。去產乳餘疾。散酒皶熱風

〔莖葉〕味苦同煎。亦主痿蹙益氣

紫歲（ノウゼンカヅラ）

南燭枝葉　味苦。氣平無毒。江左吳越最多。江東州郡亦有。初生甚矮。越四五載。僅與菘菜相侔。久養漸長。歷三十年方成木株。而大葉類茶。若圓厚。實若茱萸。綴多。謂本木株而似草類。故名南燭草木。又名草木之王。取汁漬米甚烏。炊飯食最甘美。南人又曰烏飯樹葉是也。治大人一切風疾。多採煎湯。療小兒悞吞銅錢。單用燒末。悅顏色。耐老。堅筋骨。健行。久服身輕不饑。多服髮白變黑。上元實經曰。子服草木之王。氣與神通。又食青燭之津。命不復殞。此之謂也。

南燭枝葉

烏藥（一名旁其）　味辛。氣溫。氣厚於味。陽也。無毒。此藥甚賤。各處俱生。雖稱天台者。香白固優。不及海南者。功力尤大。根採旁附（直根不堪用。有二種。天台者白而虛軟。海南者黑褐堅硬）。狀取連珠（如燭珠連者佳）。入足少陰腎經。及足陽明胃腑。因多走泄。不甚剛強。諸冷能除。凡氣堪順。止翻胃消食。積作脹縮。小便逐氣衝致疼。辟疫瘴時行。解蠱毒卒中。攻女人滯凝血氣去。小兒積聚蛔蚘。猫犬病生。磨水灌効。葉採入劑。下氣亦靈。但力緩遲。須醋浸炙。

台州烏藥

茶茗　味甘苦。氣微寒無毒。江淮閩浙俱有。蒙山中頂獨佳。茶譜云稚州蒙山有五頂頂上各有茶園其四頂茶園採摘不廢惟中頂草木繁密雲霧遮蔽鷲獸時出人跡罕到春分前後多構人力焚雷發聲併步採摘三日而止若獲一兩以本處水煎飲即驅宿疾二兩輕身三兩換骨四兩成地僊予聞此言初未全信近見土人皆有真者欲售其價極貴其狀與石蘚頗類似非原摘嫩芽疑必製造殊異故罕少取煎飲氣味果奇始知前語不誣無怪顯名而傳遠也

早採細者曰茶　芽如雀舌麥顆雖甚細嫩猶未稱善又種新芽一發便長寸餘微粗如針是為上品其根幹水土力皆有餘故也

晚採麄者曰茗　茶之粗者多雜木葉不可不擇故經云粗者損人細者益人一說春分已前採者曰茶茗已後採者曰茶

入二經絡。手足厥陰。專清頭目利小便善逐痰涎解煩渴。下氣消宿食。除熱治瘻瘡。薑連生薑同煎。止赤白下痢。香油

茶敷湯火炮煨眼目疼。嚼點兩眥暑天瀉少加醋吞熱服宜冷服。冷則聚痰

忌多服少嚼久服消脂令人瘦　唐玄景云釋滯消壅一日之利暫佳痞氣侵精終身之累斯大損多益少。觀此足徵。

謹按茶茗所治。本經以清頭目為上後醫堅執素問苦以泄之之說。乃云其體下行。如何頭目得清也。殊不知頭目不清。多由熱氣上熏。用苦泄之則熱降而上清矣。且茶體輕浮。採摘之時芽孽初萌正得春生之氣是以味雖苦而氣則薄乃陰中之陽可升可降者也。故云清利頭目有何悖乎。

蜀椒　味辛氣溫大熱屬火有金與水浮也。陽中之陽。有毒。產自蜀。川。八月收採顆紅者為貴日閉者殺人。製須炒出汗來去目去黃殼。凡用先擇去目及閉口者微炒汗出則有功力炒畢竟投石臼內以杵舂之播去附紅黃殼只取外紅皮簸舂簸播以盡為度

宜杏仁爲使。畏款冬雄黃。御心腹冷疼及寒濕痺疼。並劫殺鬼疰蠱毒併蟲魚蛇毒尤靈。除骨節皮膚死肌。療傷寒溫瘧不汗。上退兩目瞖膜下瞰六腑沉寒。通氣脉開鬼門。仍調關節。堅齒髮。煖腰膝。尤縮小便。理風邪禁款逆之邪。治噫氣。養中和之氣。消水腫黃疸。止腸澼痢紅。多食乏氣失明。久服黑髮。耐老十月勿食。傷心健忘。〔椒目〕味苦兼辛。行水而治水蠱。定痰喘。劫藥。斂盜汗。捷方。並宜炒之。研末調服。〔葉〕和艾葱搗爛。少加醋。拌勻。署內外腎吊痛。殊功。敷瘡。疽伏梁氣。極驗。亦堪煮飲。氣甚辛香。○又種〔秦椒〕乃出秦嶺氣味俱苦。生溫熟寒。製法與蜀椒相同。顆粒較蜀椒略大。所惡又有三藥。防葵。雌黃。稻蔞。主遍身惡風。散四肢痠痺。滅瘢生髮。悅色通神。治口齒浮腫。動搖併喉痺吐逆。調產後腹痛。餘疾及經閉不通。世相傳此椒可制水銀。凡誤餌成毒者。服即愈也。○〔蓽椒〕通雲中五藏風。鬱急者宜服。

蜀椒

ナルハヤカミ
アサクラサンショウ

〔吳茱萸〕味辛苦。氣溫大熱。氣味俱厚。可升可降。陽中陰也。有小毒。所產吳地獨妙。故加吳字爲名。重陽採收。依法精製。湯泡苦汁七次。烘乾。杵碎。纔煎。畏紫白石英。惡丹參。硝石。用蓼實爲使。入肺脾腎經。主咽嗌寒氣。噎塞不通。散胸膈冷氣。窒塞不利。驅脾胃停寒。臍腹成陣絞痛。逐膀胱受濕陰囊作痛。剜疼。開腰理。解風邪。止嘔逆。除霍亂。仍順折肝木之性。治吞吐酸水。如神厥陰頭疼。引經必

用氣猛不宜多食令人目瞪口開若久服之亦損元氣腸虛洩者尤忌沾唇爲速下氣故爾〔根〕殺寸白三蟲煎服即出〔枝〕療二便關格啣口立通並宜向在東南取之方獲効驗

三十二

吳茱萸

カラハヽナカミ

〔乾漆〕味辛鹹氣溫屬金有水與火降也陰中陽也無毒漢蜀多生歙州屬南直隸亦產待季夏方取得陰濕纔乾在燥熱晴日反難乾得陰濕雨天却易乾亦物之性也凡欲買求須驗好歹濕者以物蘸起細而不斷斷而急收全諸乾竹蔭地速乾者纔佳乾者着目視之如鑿音醫瑩黑若鐵堅剛狀類蜂房孔孔相隔者方美濕堪飾器皿乾漆入醫方搗作碎砂炒以文火畏鷄彈忌油脂又畏蟹黃見則化水漆瘡塗即愈資半夏爲使合湯散隨宜追積殺三蟲補中安五臟療男子風寒濕痺時作癢疼治女人疝癥瘕堅不通經脉續筋骨及填髓腦消瘀血專主絕陽痞結腰痛可驅血氣心痛能止丹溪云性急而能飛補近用爲去積滯之藥若用之中節積去後補性內行人不知也〇〔生漆〕向樹吸之小竹筒插樹皮內口含吸之溫酒下立下長蟲住痛〔葉〕合清黏作散華佗曾載方中利五臟殺蟲黑髭髮益氣擠汁塗癬瘡暈漸收葉擠斷汁自滴出也

峽州乾漆

鈎藤　味甘苦。氣微寒。無毒。湖南北俱有。山上下盡。生葉細枝長。節間有刺。因類鈎鈎。故名鈎藤。三月採收。取皮日曝。專醫稚幼。不理別科。寒熱驚癇。手足瘈瘲者。急覓胎風客忤。口眼抽搐者。宜求。因莖長中虛。可鑽隙盜酒。小人每取。魁置甕中。口含略吸引之。酒出涓涓不斷。

鈎藤

檳榔　味辛苦。氣溫。味厚。氣薄。降也。陰中陽也。無毒。嶺南州郡。俱各有生。形類鷄心尖長。性如鐵石。沉重。存坐正穩。中實不虛。破有錦紋。此品方妙。逐水穀。除痰澼。止心痛。殺三蟲。治後重如神。墜諸氣極下。專破滯氣下行。若服過多。又瀉胸中至高氣也。

檳榔

謨按檳榔服之。苦以破滯氣。辛以散邪氣。久服則損真氣。多服則瀉至高之氣。較諸枳殼青皮。此尤甚也。夫何嶺南煙瘴之地。平居無病之人。朝夕如常。猛噬。云可辟除山嵐瘴氣之疾。習以成俗。至今爲然。吾儒有仕於彼者。亦隨其俗而噬之。使一身冲和。胃氣竟常被其耗折矣。正所謂非徒無益而反害之。因習之弊。死而無悔者焉。羅謙甫曰。無病服藥。如壁裏安鼠。誠哉是言也。嘗聞用藥如用兵。朝廷不得已而行之。以禦寇爾。若無寇可

平。而無故發兵。不惟空費糧餉。抑且害及無辜。戒之戒之。

大腹　味苦辛。氣微溫。降也。無毒。樹與檳榔小殊。同生南海諸國。傳曰。向陰生者曰大腹。向陽生者曰檳榔。檳榔尖長。大腹圓矮。一說檳榔難得真者。今市所貨。並此代之。以薑鹽同煎。入疎氣藥妙。主冷熱諸氣。通大小二腸。止霍亂痰隔醋心。攻心腹大腸擁毒○裹外粗殼名大腹皮。此樹鴆鳥多棲。糞毒最能爲害。先浸醇酒後洗豆湯。下隔氣亦佳。消浮腫尤捷。

大腹　三十一

[illegible]　味甘。氣平。微寒。無毒。産自川蜀。木高丈餘。葉青冬不凋。[illegible]花紫辦多細碎。十房一朵。故名蜜蒙。採花酒浸一宵。候乾蜜拌蒸過。再向日曝。專治眼科。去青膚醫止眵淚赤澁。消赤脉貫睛內掩除痔毒侵眥外遮。

蜜蒙花　三十六

椶櫚子　味苦澁。氣平無毒。木高一丈二丈。多植嶺南江南。葉圓大。如車輪。萃于木杪。皮一匝爲一節。重疊裹包。子黑作房。九月收採陰乾入劑。血證宜求。澁腸禁溲。痢腸風。養血治崩中帶下。其皮二

旬一剝。轉復上生。堪作睡薦雨衣。以充家用。藥求陳者。燒研湯調。止鼻洪吐衄。殊功塞腸風崩帶立効。

三十五

椶櫚

五棓子 一名文蛤 味苦酸。氣平。屬金與水。無毒。在處生。季秋採。形類拳大色兼青黃。內多小蟲。俗又名百蟲倉也。療齒宣疳䘌。及小兒面鼻疳瘡。治風癬癢瘙。併大人五痔下血。煎湯洗眼目。消赤腫止疼。研末染髭鬚。變皓白成黑。專爲收斂之劑。又禁瀉痢腸虛。解消渴生津。卻頑痰去熱。○百藥煎者。亦此造成。新鮮五棓子十斤。舂搗爛細。蒸紅鹽。[illegible]

[illegible]加棓榎甘草末各二兩。又會一七[illegible]七次。[illegible]成餅。鍑曬乾。任用。如無新鮮用乾棓子水漬爲之。[illegible]

嚼欬不休。噙化數餅即止。

三十九

五倍子

巴豆 味辛。氣溫。生溫熟寒。性烈浮也。陽中之陽。氣薄味厚。體重而降。有大毒。生自巴郡。一名巴椒。反牽牛。惡蘘草。忌蘆笋。醬豉冷水。畏大黃藜蘆黃連。得火爲良。芫花爲使。八月收採。連殼陰乾。有蕩滌攻擊之能。誠斬關奪門之將。凡資治病。緩急宜分。急攻爲通利水穀之方。去淨皮心膜油生用。緩治爲消摩堅積之劑。炒令煙盡黃黑熟加。一說炒令黃黑似爲太過。不如去心膜煮五度換水。各煮一沸爲佳。雖可通腸。亦堪止瀉。

世所不能知也。丹溪云。能去胃中寒積。無寒積者忌之。本經又云。人吞一枝。便欲致死。鼠食三載重三十斤。物性相耐。有如此夫。

戎州巴豆（アシモノマメ）

蘇方木　味甘鹹。氣平可升可降。陽中之陰。無毒。多生海外。堪用染紅。入藥惟取中心。煎酒專行積血。女科資通月水。產後敗血立除。外科使散腫癰。跌撲死血。即逐。同防風。散表裏風氣。調乳香治口噤風邪。

蘇方木（スホ）

三十五



訶梨勒　味苦酸。氣溫。苦重酸。輕性急。喜降陰也。無毒。嶺南俱生。廣州獨勝。六稜黑色。爲美火煨去核。纔煎消宿食。去腹膨。且通津液。破結氣。止久痢。兼逐腸風。開胃澁腸。毆痰住嗽。又因其味酸苦。有收斂降火之功。故能治肺金傷極。鬱遏脹滿喘急。欬嗽無休也。

廣州訶梨勒（カラカン）

三十五

皂莢　味辛鹹。氣溫。有小毒。所在各處有生。懷孟州（並屬河南）者獨勝。惡麥門一味。畏空青二參（人參苦參）。入足厥陰。引經宜以栢實爲使。種因有二。用亦各分。理氣疎風。長板莢。須覓治齒取積。猪牙莢。當求去

弦去子煨熟俱宜蜜炙酥炙燒灰略異製度憑證活法在人堪作散熬膏勿爲丸煎液搐鼻噴嚏立至敷腫疼痛即除和生礬吐風痰（即稀涎散）拌煉蜜爲導箭（即蜜導箭）殺癆蟲精物主風痺死肌利竅通關破癥墮胎○皂角刺乃載外科聖藥治潰瘍直達潰處成功

猪牙皂莢（カワラフヂ）（サイカシ　サイカチ）

楓香脂（一名白膠香）味辛苦氣平無毒性甚疎通木多蟲穴山谷俱產江南獨多此烈日灼流白脂爲外科敷貼要藥主風瘙癮疹最捷退虛浮水氣尤靈搽齒齦止齒痛近世不知誤爲松脂明瑩者甚大本經意矣樹皮性澁久痢堪毆○大楓子取仁殺蟲瘡疥癬○楓菌誤食令笑不休惟飲地漿其毒即解

楓香脂（カツラノキノヤニ）

謨按楓木連抱大者甚多並結毬而不結子本經以大楓子內附但載主治餘無一言誠可怪也今詢市家所得咸云海舶貿來疑必外番楓木別有一種生者不然何獨指此爲名而不言他木耶姑述之以俟識者再教

麒麟竭（一名血竭）味辛鹹氣平有小毒出自南番諸國麒麟樹脂結成其

樹高長婆娑可愛脂從中滴狀如膠飴久久凝塊成形紅赤與血同色故今番賈牧採貨賣特名曰血竭又名曰麒麟竭也敲斷而有鏡臉光彩似能射人取摩指甲弦間紅透甲者方妙但與紫鉚音礦相類勿誤認假成真書載叮嚀用須仔細治跌撲傷損療惡毒瘡癰專破積血引膿竟毆邪氣止痛憑作膏貼任調酒吞

三十四

廣州騏驎竭（アカヤニ）

沉香 味辛氣微溫陽也無毒出南海諸國及交廣崖州木類椿櫟節多擇老者砍仆漬以雨水歲久（木得火方結）使皮木朽殘心節獨存堅黑沉水燔極清烈故名沉香但種猶有精麄凡買須當選擇黃沉結鷓鴣斑者方是角沉似牛角黑者爲然二種雖精尚未盡善儻資主治亦可取功若咀韌（音軟）柔或側自卷此又名黃蠟沉也品極精美得者罕稀應病如神入藥甚捷堪爲丸作散忌日曝火烘補相火抑陰助陽養諸氣通天徹地轉筋吐瀉能止噤口痢痛可毆○又浮而不沉水者名棧香此品最麄半浮半沉與水面平者名煎香此品略次煎香中形如鷄骨者名鷄骨香（凡入藥劑惟沉而不空心者爲上若雖沉水而有空心則是鷄骨謂中空而有朽路若鷄骨中血眼而軟嫩也）形如馬蹄者名馬蹄香形如牛頭者名牛頭香並與沉香種同亦皆品之麄者難咀入劑惟爇熏衣。

謨按衍義云沉香保和衛氣爲上品藥今人多與烏藥摩服走散滯氣獨行則勢弱與他藥相佐當緩取効有益無損餘藥不

可方也。

沉香（カヂリキ）

三十四

檀香　味辛氣溫陽中微陰無毒產南海崑崙及江淮河朔專入肺上臟通行陽明經醋摩敷惡毒止疼水煎升胃氣進食腹痛霍亂可卻中惡鬼氣能毆○又紫眞檀香主惡毒風毒○降眞香爇煙直上天召鶴成羣盤旋于上主天行時疫狂熱毆宅舍怪異響聲小兒佩之辟惡邪氣

謨按東垣云檀能調氣而清香引芳香之物上行至於極高之處若並橙橘之屬佐以薑棗併葛根豆蔻縮砂益智通行陽明之經在胸隔之上處喘嗌之中同爲理氣之劑也

檀香（カラセンダン）

三十四

降眞香（ヰトメノヤ）

安息香　味辛苦氣平無毒惟生海外亦係木脂因香辟邪土人呼爲辟邪樹也七月七日裂其樹皮膠脂如飴隨即湧出堅凝成塊其色黃黑燒煙鬼懼神歡研服邪毆惡逐鬼胎能下蟲毒可消

安息香

蘇合香　味甘氣溫無毒來從西域賣自廣東氣極芬香色乃紫赤或云係諸香汁煎合成就一說是獅子屎故飾其名諸論紛紜難指孰是今市賣者多如膏油辟諸惡殺鬼物精邪去三蟲除蟲毒癇痺仍禁夢魘尤通神明

龍腦香（即冰片）　味辛苦氣溫微寒無毒來從海舶出自波斯木直長類杉皮有甲錯枝傍生發葉背白正圓香即木脂結成狀若梅花細瓣片片潔淨氣甚熏人市家多用番硝混攙不可不細擇也（番硝質重色蒼如砂細碎龍腦輕浮潔白片片相侔細認自別）磁罐藏貯燈草務加（不致耗蠹）目熱赤疼調膏點上即止喉痺腫塞擂末吹入立消疳毒生管中連敷漸殺（和眼藥敷）舌脹出口外多摻自收（病重者用五錢方愈）仍治小兒痘瘡心煩狂燥妄語取擂細末猪心血丸濃煎紫草茸湯送下炭實大粒竟能發透更定心神○龍腦油出佛誓國中鑽樹取摩一切風氣○根下清液又名膏香堪逐風涎可通關竅

（謨）按丹溪云龍腦屬火世知其寒而通利然未達其熱而輕浮飛越局方但喜香而貴細動輒與麝同爲桂附之助然人身之陽易動陰易虧幸思之節齋又云龍腦大辛善走故能散熱通利結氣醫方目痛喉痺下疳多用之者取辛散也人欲死者吞之氣散盡也世人誤以爲寒不知辛散性甚似乎凉耳諸香皆屬陽豈有香之至者而反寒乎

廣州龍腦

南雲スギ

乳香　味辛苦。氣溫。陽也。無毒。亦出波斯國土。赤松木脂所成。垂滴成珠。綴木未落者。名珠香。滴下如乳。鎔榻地面者。名榻香。珠香圓小光明。榻香大塊枯黯。珠香効速。榻香効遲。凡欲用之。不可不擇。箬盛烘燥。燈草同擂。若合散丸。羅細和入。倘煎湯液臨熟加調。療諸般惡瘡及風水腫毒。定諸經卒痛。併心腹急疼。亦入敷膏止痛。長肉更催生產。且理風邪。

乳香　南雲ニウヤニ



丁香　味辛。氣溫。屬火。有金純陽無毒。生交趾廣州牧春前秋後形有大小。名列雌雄。雄丁香如釘子長。雌丁香似棗核大。凡資主治。母者用多。專入腎胃二經。又走太陰肺臟。諸香能發。凡氣善毆。口舌氣猶純。氣殊功。且止噫。忒氣逆。翻胃嘔。霍亂嘔。立効。兼除心腹冷疼。煖腰膝。壯陽。殺疳蟲。堅齒。治妳頭綻裂。消蟲毒脹膨。細末研成。猶有兩治。婦人陰戶常冷。紗囊盛納陰內。旋使轉溫。老人援去白鬚。薑汁和塗孔中。重生即黑。丁皮止齒痛。驗根搗敷風腫良。

雄丁香　ニウシ　三十四

雌丁香

胡桐淚　一名木津　味鹹苦。氣大寒。無毒。出甘肅州以西。作鹼音減鹵地之上。樹甚高大。皮似白楊。津液淪入地中。乃與土石相着。冬月收採。狀如黃礬。重實而堅。多夾爛木。又若硝石。得水便消。磁罐貯封。勿令

熔化。口齒門聖藥。瘰癧毒仙丹。毒熱腹滿心煩。水和服之取吐。牛馬急黃黑汗。水研灌之即差。火毒麯毒並毆。金銲銀銲可用。切勿多服。令吐無休。

三十四

胡桐淚

ガラノキリノキノシル

阿魏 味辛。氣平熱。無毒。出波斯國中。生阿虞木內。其木長八九尺。皮色青黃。四季花實俱無。葉如鼠耳。斷其枝梗。汁滴如飴。久乃堅凝。遂名阿魏。唐本註云。體性極臭而能止臭。亦爲奇物也。色黑者力微。黃散者爲上。但今市家多煎蒜白假充。不可不細辨爾。凡使研作粉霜熱酒器上裹過。置地待冷。入藥隨宜。去臭氣殺諸小蟲下惡氣破瘕癥積碎瘟禁瘧。卻鬼毆邪蠱毒能消傳尸可滅。

三十四

席州阿魏

ツラシ

蘆薈 味苦。氣寒。無毒。波斯國土所出。木滴脂淚結成。狀類黑餳。俗呼象膽。味苦故云。誤服巴豆毒能解除。殺蟲去疳。鎮心明目。治小兒癲癇驚搐。療大人瘡瘻痔疽癬發頸間。同甘草研勻敷効。蜃生齒縫以鹽湯漱淨點差。

三十四

廣州蘆薈

ロクワイ

沒藥　味苦辛。氣平無毒。黃黑類安息香。出產自波斯國。亦木脂液逐日結凝成塊大小不侔。斷碎光瑩可愛。擂細入藥。製同乳香。主墜墮跌打損傷。療癰疽瘡瘻潰膿。破血立効。止痛如神

沒藥



木鼈子　味甘。氣溫無毒。朗州屬所生。藤莖甚大。黃花綠葉。子若秬婁。生青熟紅。肉上有刺。其核類鼈。故此得名。消腫突惡瘡。除黥黯粉刺兩膀蚌毒立効。雙乳癰赤殊功。止腰疼。主折損匪專追毒。亦可生肌

按烏頭毗穗。亦名木鼈子。兩物一名。不可不識。但此專入外科而有追毒之効。彼則徒載其名。全無治病之能。非比古人枝三物同名。而各有用也

木鼈子

蕪荑　味辛。氣平無毒。產河東河西。有種大種小。大蕪荑。比榆莢大甚。氣臭如訊（音信）難聞。小蕪荑。較榆莢小差（一說此即榆莢也）味辛醞。醬堪用。凡資治療。取大宜陳。但市收藏。多以鹽漬。殊失氣味。入藥無功。故求買。必擇氣腥者為良。儻修合。務經火煆過纔用。主五內邪氣殺寸白三蟲。化食除腸風。逐冷止心痛。散皮膚骨節風濕。療痔瘻疥癬瘡痍

蕪荑



雷丸 味苦鹹氣寒有小毒係竹之苓苗蔓鮮有建平（屬南直隸）出累累相連狀如丸因而名此入藥炮用（甘草煎湯浸一宿尤殺毒）赤者殺人（白者善）惡扁蓄葛根使厚朴芫荔（芫花荔實）胃熱可解蟲毒能毆殺三蟲仍殺白蟲利丈夫不利女子（非利益之利乃疎利也）主癲癇狂走療汗出惡風又作摩積之膏專卻小兒百病久服陰痿尤宜慎之

雷丸

皮黑內白

杉材 味辛氣微溫屬金有火陽也無毒江南深山多有栽植株類松大而勁直葉附枝生若刺針凌冬不凋隨時收採煎服主心腹脹痛及卒暴心痛殊功淋洗療風瘮癢瘡併延片漆瘡立効節煮浸捋脚氣腫痛菌煎吞治心肺卒疼（生老杉木上者）

杉材

宜州杉菌

沒食子（即無食子）味苦氣溫無毒出自西戎樹極高大葉似桃長綠花瓣白心紅實結圓類彈丸初青熟漸黃白蟲蝕成孔眼者入藥紋細無秋米者尤佳漿水浸砂盆硬者石上研盡切忌犯銅鐵濕須火

上焙乾益血生精安神和氣燒黑灰浴陰毒合他藥染髭鬚治瘡潰肌肉不生主腹冷滑痢不禁。

沒食子 ドニクリ 三十五

柳花 味苦。氣寒。無毒。岸側道傍在處俱植木高丈許。秋痒春榮。初生黃蕋是花。漸乾爲絮。能治濕痺攣急及貼灸瘡。多積捍作氊眼柔軟清涼尤妙。葉煎水洗騾馬疥痂瘡立愈及療心腹內血止疼枝煮湯浴嬰兒寒熱疾即差。更治風毒癮疹去瘡。根理齒痛而漱出疳涎。實主潰癰而逐去膿血。柳膠結砂子。子汁除渴消。木中蟲眉煎濃。風濕疥瘍浴効。

柳華 シタリヤチキ

使君子 味甘。氣溫。無毒。交趾多生。嶺南亦有。新採香潤。陳久乾枯用須慢火微煨去殼。便可嚼食。或和諸藥。憑作散丸。去白濁。除五疳。殺蛔蟲。止瀉痢。因郭使君原用以治小兒。後人竟名之。白使君子也。

使君子 カラクキナシ 十八