傷寒活人書括指掌圖論 十卷

616

ORIENTALIA
CHINESE
V
G133.76
H85

V
G13.716
H85

類編傷寒活人書括指掌圖論序

雙鍾處士曰嘗觀論傷寒自仲景而下凡幾百家集其書則卷帙繁拏味其言則旨意微深最至當者惟活人書而已余留心此書積有年矣猶恐世醫未得其要領於是撮其機要錯綜成文使人人見之了然明白故目之曰活人書括即一證作一謌或言之未盡則至於再至于三雖言辭鄙野不能登仲景之門升百家之堂然理趣淵源幾於簡而當者矣同志之士苟熟而復之藏於胷中以之濟世亦仁人之用心也乾道丙戌端午日隴西李知先元象於是乎書

蒙齋序曰疾患莫測者惟諸風與傷寒也蓋風
百病之長以其善行而數變傷寒則表裏隱顯
陰陽交互疑似之間千萬之隔其可畏者有甚
於雜病也仲景以聖哲之資精緻之貴為傷寒
論始可宗而習之後世方論疊出散漫深嚴無
階可進今以仲景南陽諸書裒其精粹劃為列
圖號曰活人指掌縱橫治證下附其說及以變
異諸證賦為八韻表之於前蓋取其易簡也及
有富春逐翁陸氏日加勸勉因成此書逐翁常
施藥鄉閭活人甚衆得此尤便觀覽亦幸同志
者共之錢塘蒙齋吳恕謹書

醫之道難矣雖雜病之有方而傷寒為尤
難漢長沙公以不凡之聖撰素難之精微
作傷寒論垂萬世不易之法然其意旨幽
深初學猶未得其要者故雙鐘處士謌括
錢塘蒙齋指掌圖作焉誠治傷寒之捷
徑也愚以二書彙合成一改次前八韻賦與
後節目相貫以李子建十勸列諸篇端開
卷則提綱撮要曉其勸戒其表裏二十證
論各條增入謌括便其記誦行是道者苟
能熟味其謌詳玩其圖則治病之際瞭然
在目豁然於心雖未能升仲景之堂奧而

仲景活人三百九十七法不外是矣所闕者婦人胎產傷寒與小兒傷寒證治也々採諸家經驗良方續作未卷以便觀覽云

衛生君子幸垂　藻鑒

正統元年丙辰三月朔旦鼇峯熊宗立敬識



[illegible]

類編傷寒活人書括指掌圖論目錄

○活人指掌提綱
活人指掌賦　司天在泉圖　五運圖
六氣圖　傷寒脉法　傷寒十勸
○一卷
傷寒賦凡八韻　傷寒詩　診脉訣
三陰三陽經　三陰三陽證　脉絡受病大畧
陰陽所屬　陰陽傳變　陰陽受病
寒邪只在一經　用藥活法　傷寒正名十六件
類傷寒證
○二卷
三陰三陽脉謌　三陰三陽謌　表裏謌
一十六證傷寒謌

傷寒　二傷風　三傷寒見風　四傷風見寒
五風濕　六中濕　七濕溫并圖　八風溫
九溫毒并圖　十中暍圖　十一熱病圖　十二溫病圖
十三晚發　十四痓圖　十五溫瘧　十六疫癘圖
兩感謌圖　類傷寒四證痰證 食積 虛煩 脚氣　痰證謌
食積謌　虛煩謌　脚氣謌四證圖　三陽合病謌
合病圖二局　併病謌圖　狐惑謌圖　蚘厥謌圖

○三卷　二十證

傷寒問答四十六證謌內四十二證各有圖惡風可水不可水熱多寒少无汗此四證无圖

咳嗽　咳逆　惡風　惡寒
身體痛　咽喉　筋惕肉瞤　無汗
自汗　口燥咽乾　寒熱往來　似瘧
發狂　喘　渴　霍亂吐瀉

讝語　下利　黃　班

○四卷　二十六證

痞滿　結胷　煩躁　嘔噦
頭汗　可水不可　漱水不嚥　背惡寒
吐血　衄血　多眠　不眠
潮熱　發熱　不可表　汗後惡寒
不可下　下後有熱　熱多寒少　乾嘔
不得汗　頭痛　百合　腹脹
小便難　藏結

○五卷

傷寒表裏證二十論各證下新增謌括

表裏證　表裏俱見　表熱裏寒并表寒裏熱
陽盛陰虛并陰盛陽虛　陰證似陽新增　陰盛隔陽新增

陽証似陰 新增 陰陽毒 圖　厥證 圖　腹痛 圖
動悸 圖　奔豚 圖　脇痛 新增　動氣 新增
舌上胎 圖

○六卷

傷寒遺事 各條新增謂括
戰汗四證 圖　急下急溫 圖　誤下成痞　三陰可汗
差後昏沉 圖　飲酒復劇　循衣摸床　傷寒禁忌
傷寒別名　陰陽易 圖　壞病 圖　下膿血 圖
雜證所屬　死證　釋音

○七卷

藥評 各評新增謂括
諸承氣湯大柴胡湯評　小柴胡湯評　青龍湯評
白虎湯評　桂枝麻黃湯評　桂枝石膏湯評　十棗湯評

聖散子評　炮炙煎煮酌準料例　增補藥品
升合分兩　煉蜜法 新增

○八卷

傷寒藥方
一 桂枝湯　二 桂枝甘草湯　三 桂枝茯苓根湯
四 桂枝石膏湯　五 桂枝新加湯　六 桂枝附子湯
七 桂枝大黃湯　八 桂枝人參湯　九 桂枝枯婁乾葛湯
十 桂枝芍藥湯　桂枝加芍藥生姜人參湯
十一 桂枝越脾一湯　十二 桂枝麻黃一湯　十三 桂枝麻黃各半湯
十四 桂枝加桂湯　十五 桂枝去芍藥加附子湯
桂枝去芍藥加附子湯
十六 桂枝加知母石膏并麻湯　十七 桂枝甘草龍骨牡蠣湯
十八 桂枝加芎朴杏子湯
十九 桂枝去桂加茯苓白术湯　二十 麻黃湯

廿一 麻黄葛根湯
廿二 麻黄升麻湯
廿三 麻黄杏子甘草石膏湯
廿四 麻黄知母石膏湯
廿五 麻黄連翹赤小豆湯
廿六 麻黄附子細辛湯
麻黄甘草附子湯
廿七 麻黄杏仁薏苡甘草湯
廿八 越婢湯
廿九 茯苓白朮湯
三十 葛根湯
葛根龍膽湯
卅一 葛根解肌湯
卅二 葛根葱白湯
卅三 葛根橘皮湯
卅四 葛根黄連黄芩湯
卅五 葛根半夏湯
卅六 大青龍湯
卅七 大青龍加黄芩湯
卅八 小青龍湯
小青龍去半夏加栝蔞湯
小青龍湯加芫花
卅九 小青龍去麻黄加杏子湯
四十 小青龍去麻黄加茯苓
四一 小青龍去麻黄加附子湯
四二 大柴胡湯
四三 小柴胡湯
四四 小柴胡加茯苓湯
四五 小柴胡去黄芩加芍藥湯
四六 小柴胡去黄芩加茯苓湯
四七 小柴去棗加牡蠣湯
四八 小柴胡參棗生姜加五味子乾姜湯
四九 小柴去半夏加人參栝蔞湯
五十 小柴胡加桂湯
五一 小柴胡加五味子湯
五二 小柴胡加桂枝乾姜牡蠣湯
五三 柴胡桂枝湯
五四 柴胡桂薑湯
五五 柴胡龍骨牡蠣湯
五六 敗毒散
五七 黄耆建中湯
五八 小建中湯
五九 小續命湯
六十 續命加姜汁湯
續命去附或桂加芍一倍湯
六一 續命去附減桂湯
六二 升麻葛根湯
六三 升麻六物湯
六四 陽毒升麻湯
六五 玄參升麻湯
六六 大承氣湯
六七 小承氣湯
六八 調胃承氣湯
六九 桃仁承氣湯
七十 白虎湯
七一 白虎人參湯
七二 白虎蒼朮湯
七三 黄芩湯
七四 黄芩芍藥湯
七五 黄芩半夏生姜湯
七六 黄連湯
七七 黄連阿膠湯
七八 黄連雞子湯
七九 黄連橘皮湯
八十 黄連龍骨湯
八一 黄連犀角湯
八二 黄連解毒湯
八三 酒煮黄連丸
黄連一物湯
八四 蜜漬黄蘗汁
八五 竹葉湯
八六 竹葉石膏湯
八七 梔子仁湯
八八 梔子豉湯
八九 梔子蘗皮湯

九十 梔子厚朴湯
九十一 梔子升麻湯
九十二 梔子乾姜湯
九十三 梔子烏梅湯
九十四 枳殼梔子湯
九十五 枳殼梔子大黃湯
九十六 茵陳湯
九十七 茵陳五苓散
九十八 茵陳梔連三物湯
九十九 知母麻黃湯
一百 知母葛根湯
百一 大陷胸湯
百二 小陷胸湯
百三 大陷胸丸
百四 抵當湯
百五 抵當丸
百六 陽旦湯
百七 陰旦湯
百八 四逆湯
百九 四逆散加五味子乾姜湯
百十 茯苓四逆湯
百十一 當歸四逆加吳茱萸生姜湯
百十二 四逆散
百十三 四逆加茯苓散
百十四 甘草乾姜湯
百十五 甘草附子湯
百十六 炙甘草湯
芍藥甘草湯
百十七 芍藥附子甘草湯
百十八 陰毒甘草湯
百十九 茯苓甘草湯
百二十 小半夏茯苓湯
百二十一 茯苓桂甘大棗湯
百二十二 茯苓桂甘白朮湯
調中湯

○九巻

百二十三 赤茯苓湯
百二十四 猪苓湯
百二十五 大半夏湯
百二十六 半夏生姜湯
百二十七 半夏桂甘湯
百二十八 姜汁半夏湯
百二十九 厚朴半夏甘草人參湯
百三十 甘草瀉心湯
百三十一 附子瀉心湯
百三十二 生姜瀉心湯
百三十三 三黃瀉心湯
百三十四 [illegible]散
百三十五 桔梗半夏湯
百三十六 附子湯
百三十七 朮附湯
百三十八 羌活附子湯
百三十九 真武湯
百四十 白通湯
百四十一 白通加猪膽汁湯
百四十二 乾姜附子湯
百四十三 乾姜黃芩黃連人參湯
百四十四 正陽散
百四十五 理中湯
百四十六 理中加茵陳湯
百四十七 理中加石膏湯
百四十八 理中丸
百四十九 增損理中丸
百五十 枳實理中丸
百五十一 四順丸
四順湯
百五十二 脾約丸
金匱引風湯
百五十三 柴胡半夏湯
百五十四 治中湯

百五十五 百合知母湯　百五十六 百合地黃湯　百五十七 百合洗方
百五十八 犀角地黃湯　百五十九 犀角大青湯　百六十 大青四物湯
百六十一 青黛一物湯　青木香一物湯　五物木香湯
百六十二 黑奴丸　百六十三 黑膏　李根湯
百六十四 紫雪　芒硝猪膽塗瘡法　百六十五 吳茱萸湯
百六十六 旋覆代赭湯　百六十八 大橘皮湯　百六十九 小橘皮湯
百七十 橘皮湯　百七十一 橘皮乾姜湯　百七十二 桔梗湯
百七十三 桔梗枳殼湯　百七十四 桔梗半夏湯　百七十五 漢防己湯
百七十六 防己黃芪湯　百七十七 吹鼠白朮牡蠣湯　百七十八 五積散
百七十九 五苓散　五苓散吐法　百八十 五味子湯
百八十一 十棗湯　百八十二 三物白散　百八十三 桃花湯
百八十四 杏仁湯　百八十五 木瓜散　百八十六 烏梅丸
百八十七 牛蒡根散　百八十八 酸棗湯　百八十九 地榆散
百九十 葱豉湯　百九十一 連鬚葱白湯　百九十二 茅花湯
百九十三 蘗皮湯　百九十四 麥門冬湯　百九十五 楨榔散
百九十六 萎蕤湯　百九十七 葶歷苦酒湯　百九十八 括蔞根湯
大三脘散　百九十九 延胡索散　二百 射干湯
二百一 金沸草散　二百二 調中湯　二百三 文蛤散
二百四 牡蠣澤瀉散　二百五 猪膽雞子湯　二百六 猪膚湯
二百七 鱉甲散　二百八 地血散　二百九 赤石脂丸
二百十 石脂餘粮湯　二百十一 白頭翁湯　二百十二 烏扇湯
二百十三 消暑丸　二百十四 香薷湯　二百十五 香薷散
二百十六 治慝桃仁湯　二百十七 雄芡銳散　二百十八 万全木通散
二百十九 鼠矢豉湯　二百二十 豭鼠糞湯　二百二十一 燒裩散
二百二十二 竹皮湯　二百二十三 當歸四逆湯　二百二十四 通脉四逆湯
通脉四逆加猪膽汁湯　通脉四逆加芍藥湯

二百五十 瓜蔕散吐法　二百六十 瓜蔕搐鼻法　二百六十一 蜜導煎法
二百六十二 猪膽汁法　二百六十三 陰毒羹法　二百六十四 葱慰法
二百六十五 陰毒著艾法　二百六十六 水漬法　二百六十七 硫芡鼻法
二百六十八 灸少陰　二百六十九 温粉　二百七十 蒸法
二百七十一 灸関元　二百七十二 灸期門　二百七十三 刺大椎肺俞
二百七十四 結胃灸法　発汗法

○十卷

傷寒補遺經驗良方 續編

香蘇散　芎蘇散　十神湯　消風百解散
參蘇飲　藿香正氣散　不換金正氣散　二香散
神朮散　冲和散　白朮散　万安散
乾葛湯　縮脾飲　桂苓甘露飲　六和湯
枇杷葉散　木瓜湯　益元散　養胃湯
清[illegible]湯　柴胡石膏湯　僧伽應[illegible]人參散
太湯用　保真湯　對金飲子　枳砂五苓散
杏二煎　應手方　加減柴胡湯　湯証結胃
入[illegible]家不傳　江南溪毒

江南溪毒說

沙証　塩湯吐法

姙娠婦人傷寒方論

四物湯加減法　葱白湯　芎蘇散　參蘇飲
白朮散　前胡湯　阿膠散　蘇朮湯
黄龍湯　柴胡石膏湯　麥門冬湯　梔子大青湯
柴胡湯　秦艽散　敗毒散　蘆根湯
塗臍法　葛根湯　養胃湯　清脾湯

婦人産後傷寒方

五積散　陽旦湯　荊芥散　增減柴胡湯
小柴胡湯　蜀漆湯　竹葉防風湯　黃芩湯
旋覆花湯
小兒傷寒方
惺惺散　麻黃黃芩湯　升麻黃芩湯　甘露飲
連翹散　人參飲　麥門冬散　脫甲散
大連翹飲　梨漿飲　辰砂五苓散

活人指掌目錄

正德丁卯仲冬
存德書堂新刊

類編傷寒活人書指掌提綱

江浙省醫蒙齋　吳恕　撰

活人指掌賦

傷寒為病反復變遷賴先師究詳之遺旨成後學診治之良詮太陽則頭疼身熱脊強（足太陽之脉從頭項連風府行於腰背故頭項痛腰脊強）陽明則自痛鼻乾不眠（足陽明之脉從目絡於鼻故目痛鼻乾不得卧）少陽耳聾脇痛寒熱嘔而口為之苦（足少陽之脉循脇終於耳故病脇痛耳聾）太陰腹滿自利尺寸沉而津不到咽（足太陰之脉布於脾胃絡於蓋翼故腹滿自利而咽乾）少陰舌乾口燥（足少陰之脉絡於肺繫舌本故舌口乾燥）厥陰煩滿囊拳（厥陰之脉循陰器絡於肝故煩滿而囊縮）一二日可發表而散（一二日邪在表可以汗解）三四日宜和解而痊（半表半裏可用小柴胡湯和解）五六日便實方可議下（熱專下焦五六日如太便實方可下）七八日不解又復再傳（病至六日為專經徧七日當少間不愈者為邪再專經也）日傳二經病名兩感經傳六日應無一全（常病日專一經至六日傳足當愈兩感日專二經一日太陽少陰二日陽明太陰三日專少陽厥陰三日傳徧六日再傳不可救矣）太陽無汗麻黃為最（發散）太陽有汗桂枝可先（太陽中風服桂枝湯解脾）小柴胡為少陽之

要領（少陽証宜服小柴胡湯）大柴胡行陽明之秘堅（陽明内実便秘當服大柴胡湯）至三陰則難
拘定法或可温而或可下（太陰自利不渴藏寒也四逆湯理中湯太陰
草干姜湯少陰口燥咽乾六味承氣湯厥陰下之利不止四逆湯厥陰
尺寸俱短藏必絶毒氣入藏也承氣湯厥陰下之厥不可振於定法也）宜
數変以曲全生意或可方而或可圓
且如陽証下之早者乃為結胸（病發於陽下之早者則心下堅痛按之石硬而痛則為結胸也）陰証下
之早者因成痞氣（病發於陰下之早者則胸滿而不痛為痞氣也）發狂為血畜于内又大便之
極實（發狂有二陽毒熱壅大便秘而狂者有血畜下焦瘀極而狂者）發黄乃熱積于中兼小便之不利
（黄乃宿穀与温氣相專而生熱又水道不通故發黄）微帶緣表之未解（微帶而脉浮者此太陽証未罷再用麻黄桂枝之類）
解之端滿而不悪寒者當下而痊（端滿不悪寒此表証已罷當用大小承氣下之）微煩為陽之相
勝（脉浮身熱微煩屬太陽此陽勝於陰也）煩極而反發厥者乃陰所致（陰勝於陽則發厥脉沉而
陽勝於陰大青龍陽証也）煩躁不已（煩躁不已者死証也）狐惑蓋緣失汗蟲食臟及食肛（其人毒有蟲始因失汗毒氣
熏蒸發蟲食其臟亦肛門蝕
以雄黄烏梅丸之二也）蚘厥知緣多飢蟲攻因又攻胃（蚘厥亦胃中元有長蟲因
蟲食飢中逆上而出治以烏梅丸）
烏梅丸
渴乃煩多斑為熱識（陽毒熱極故發斑）陽明内實則為寒熱往來（乃陰陽相搏也）

若内実者悉帰陽明當下之　太陽中風因作剛柔二痓（太陽中風又感寒温無汗為剛痓有汗為柔痓發則強直）
口噤如瘈瘲命湯血雖為欲解者（太陽病自與力用小續命湯血雖為欲解也）重陰血為厥竭之憂（陰少陰
血竭血從口鼻耳目出為下厥上竭乃死証也）厥利雖若尋常反能食有蟲中之忌（經曰厥而
食反能食者為除中不可治也）厥有二端治非一類陰厥脉沉而細初緣利過（未厥前下利不
渴後發厥陽也）陽厥脉滑而沉始因便秘（未厥前大便秘煩渴
者陰厥也）陽厥者陽厥也　治陽則芒消
大黄（大承氣湯）　治陰則附子姜桂（四逆湯建中湯也）　死生係反掌之間脉藥可折
法而治（專云三折脉師為良醫）
因知風温汗不休當用漢防已（發汗后身猶灼熱名風温身重汗出者漢防已湯）　肾痞利不止
宜服禹餘糧（痞而利不止當治下焦禹餘粮湯）　併病歸于一經邪不傳兮表解疾愈
（併病者始於二陽合病后併於一經若併於天陽仍用桂枝湯併於陽明仍用小柴胡湯戰汗分為四証
微汗併於陽明仍用微下若併於少陽仍用小柴胡湯）
陽勝陰兮熱退身凉（戰汗四証以寒熱作而戰汗解矣此陽勝於陰戰勝而愈）　咳逆者羌活附子（咳逆
編多逆者胃有寒飲附子湯）　腰痛者桂枝大黄（腰痛者桂枝大黄湯）　微虚相搏則為短
（寒濕腰痛附子湯）
氣（氣不接續也風温不發汗者甘草附子湯）　衣者甘草附子湯（衣者甘草附子湯水停心下五苓散）
陽水停心下五苓散　勞食寒復乃成内傷（病新

[illegible]勞力傷食[illegible]復熱者[illegible]陽明背惡寒而唇口燥懸知白虎為最[illegible]
[illegible]子湯發門冬湯　陽明[illegible]
[illegible]白虎加人參湯少陰身躰痛而筋肉惕乃聞真武至強[illegible]身体痛者真武湯
欲發黃先出頭汗發黃証也[illegible]始因火迫終至亡陽用火迫發周身取汗次發
[illegible]黃証[illegible]陽
欲漱水已入不下者犀角湯[illegible]湯陽明身熱頭疼[illegible]水不欲飲[illegible]
[illegible]血必發狂血用犀角地黃湯
欲飲水已入即吐者五苓散渴欲飲水已入即吐名水逆五苓散燥
況乃大青龍兼理風寒[illegible]見風傷風[illegible]大青龍湯小承氣正蠲潮熱[illegible]
[illegible]而清
[illegible]者小承氣湯不得眠而煩躁甚雞子入於黃連少陰病二三日心煩不得眠黃連雞子湯但有熱
而嘔歲頻姜汁加於竹葉[illegible]熱而嘔者竹葉一七爪帝散吐傷寒中脘
痰涎三物桃花湯理少陰下利膿血溫毒下利膿血桃花湯　厚朴半夏治腹脹為
偏宜太陽病發汗後腹脹者厚朴半夏人參甘草湯意白麻甘[illegible]疼為至截[illegible]意白湯意振頭
治湯太陽頭疼麻黃湯調溫毒可用黑膏[illegible]脉洪數者黑膏[illegible]致當行紫雪[illegible]
者用紫雪吐血者須煎黃連栢皮[illegible]熱毒深入吐血栢皮湯方用栢皮黃連黃芩咽痛者通用桔梗
甘桔少陰病法當咽痛治用桔梗湯三物白散云頻必散結胸寒實中焦寒實結胸三物

小陷胸湯白散治之十棗湯固非之常治疼痛痛連兩脇表証解心下痞鞕而短氣脇下痛此邪迫
內吝而有伏飲十棗湯
加以大熱錯語呻吟乾嘔者黃連解毒傷寒已得汗解因飲酒復剩頭[illegible]錯語呻吟不得卧黃連解毒
湯脉遲熱多寒少血弱者黃耆建中諸血少也黃芪建中湯汗之過多
動悸而惕汗為心液汗多則心空而動惕宜服桂枝甘草湯以和之下之先時懊憹在胸表未解而下之引入
胸中欲嘔煩不安以拒子氏湯微吐之逐其邪旋覆代赭理心痞而噫不息發汗吐下後心下痞鞕噫氣不除旋覆
代赭湯麻杏各半療身癢而汗不通桂麻各半湯理太陽面有熱色未欲解也以其不能得小汗出身必癢
勞復身熱湯名獨鳳膏勞復身熱及男子陰易獨鳳膏湯腸垢脉熱藥用白頭翁白頭翁湯
脉下必熱疫癘者春夏秋冬各有法用須十全九証疫病者四時不正之氣也各有治法
白頭翁湯疫癘者春夏秋冬各有法用須十全九証疫病者四時不正之氣也各有治法
曰上工者十全九百合者行住坐臥皆不定號為百脉一宗悉致其病
欲食不能食欲行坐臥不能行坐藥入口即吐[illegible]
有果[illegible]百合知母湯百合地黃湯滑石代赭湯
常謂多眠身猶灼熱風溫可用姜蔡[illegible]汗後身猶灼熱自汗喘息[illegible]吐下後晝夜不
心蘊虛煩欲汗必須酸棗[illegible]欲眠四肢不收養棗湯不眠
[illegible]眠者酸棗湯手足攣搐當未午旁根汗出

[illegible]

宜行金沸草散寒散收生不可汗本有金沸草蔵不可下自非一端動氣數種動氣與風溫脉虛氣在右上下皆不可下溫証不可汗傷中溫風溫溫皆不可汗霍乱與陽浮在表表証未罷嘔吐脉虛氣在右上下皆不可下溫病發於冷多緣熱悩霍乱与中暑相類多因天暑地濕陰陽糾霍亂其情狀不同若不可溫者方可溫之溫病發於春初及夏春夏要須柴膏以解肌溫病有風溫溫毒溫疫用升麻葛根湯小柴胡湯奔豚協逐寒邪多用桂苓為可保奔豚從少腹上衝心者桂枝加桂湯

蓋聞午寒微熱名曰瘧不嘔清便必自愈或二三發不嘔清便必自愈傷寒發熱往來如瘧日一發或二三發不嘔清便必自愈

腎水故急下之肉瞤筋惕發動氣汗以致羸陽明與少陽合病脉弦者名曰貧陽明少陽合病脉長者為順脉弦者為貧陽明之上也傷寒與熱病將痊食多者號曰遺病已愈多食曰遺遺者不宜食則不附可用風溫濕溫皆不宜汗多亡陽宜不附湯身痛有表証裏証若陰毒則四逆尤

[illegible]

而小便數治用大黃枳殼丸若只壳大黃白芍藥麻子仁等藥也溫熱者小便澁而大便利用須黃連當歸湯用赤石脂乾薑當歸湯用赤石脂乾薑當歸湯

石脂乾薑當歸藥也

嘔吐有寒有熱寒則當溫熱當以解寒多而嘔者附子湯小藥加生姜汁湯猪苓湯

讖語有虛有實虛則可下虛不可為實則可下虛不可為胃實語大小承氣湯下之經曰直視喘

[illegible]

語者死此正氣脫絕言語妄與故不可為陽毒則狂斑煩乱以大青升麻可迴因為陽毒用青黛一物湯陽毒升麻湯陰毒則唇青厥逆以正陽甘草或拯顛危陰毒用正陽散陰毒甘草湯

厥時胸煩尤甚此藏氣厥而精神散胸安名曰藏厥不治大汗後身熱尤甚此陰陽交而竅閉雜汗後陰陽交不治

嗟夫生死之關陰陽是主陽氣見於陰經其生也可知陽脉者生陰脉見於陽經其死也可許陽病見陰脉則死

少陽之明合病脉當長而弦少陽明胃土也陽明病不土獨見弦急之脉此木克土也為鬼賊之脉名曰負也不治水為腎水為心病將痊食心火下降則升火降則為和會見歡欣之幸手足溫而內元熱腎水上升則津液生

而精神回此生意効也緣傷寒傳變之不常非雜病徑直而可取是用潛篤心神洞窺臟腑推惻隱之端以濟乎今拯疲癃之疾以遵乎古庶幾可登仲景之堂不負乎諄諄之語

司天在泉圖

少陰	司天	君火	陽明	司天	燥金
子	在泉	午	卯	在泉	酉
陽明		燥金	少陰		君火
少陽	司天	相火	厥陰	司天	風木
寅	在泉	申	巳	在泉	亥
厥陰		風木	少陽		相火
太陰	司天	濕土	太陽	司天	寒水
丑	在泉	未	辰	在泉	戌
太陽		寒水	太陰		濕土

經云先立其年以明其氣是知司天在泉上見下臨為其始也如子午卯酉陰陽互換六氣在其中矣勝復之理補瀉之法可從而推之 訣曰 子午少陰君火天陽明燥金應在泉丑未太陰濕土上太陽寒水兩連綿寅申少陽相火旺厥陰風木也中壯卯酉却与子午同辰戌巳亥亦皆然

五運之圖

商不及從革之紀 少天符 審

乙庚 金運 平氣之 太歲會 紀

商太過堅成之紀

應天為天符

宮太過訓阜之紀 太天符 備

甲己 土運 平化氣之 少歲會 紀

宮不及卑監之紀

徵太過赫曦之紀 太天符 昇

戊癸 火運 平明氣之 少歲會 紀

徵不及伏明之紀

承歲為歲會

羽太過流衍之紀 太天符 靜

丙辛 水運 平順氣之 少歲會 紀

羽不及涸流之紀

三合為治

角不及委和之紀 少天符 敷

丁壬 木運 平和氣之 太歲會 紀

角太過發生之紀

○歲會者甲己化土而遇辰戌丑未之歲乙庚化金而遇申酉歲之類也太乙天符如乙酉歲乙庚化金而遇酉又上見燥金司天也天符者如丙戌歲丙辛化水上見寒水司天是也司天符者如庚子庚午歲下臨燥金在泉同歲會者如辛丑辛未歲下臨寒水在泉是也歲遇天府歲會則為平氣陽干陽辰則為太過陰干陰辰則為不及也

六氣之圖

天以六氣動而不息上應乎客

地以五行靜而守位下進乎主

六氣圖說曰太陽寒水治宜熱陽明燥金治宜苦溫少陽相火治宜減寒大陰濕土治宜苦熱少陰君火治宜鹹寒厥陰風木治宜辛涼六氣之行各居六十日有奇以真時而化其氣過猶不及病乃生焉故察其盛衰以味折之以正其氣經云必折其爵氣而取化源益其滿無使邪勝使暴過不生苛疾不起是理歲之大要也

傷寒脉法指掌圖

陽脉陰病見陽脉則生

大 滿指散蔓虛而洪盛

大為血虛　大為病進　大為氣盛

浮大晝加　中緩而大為胃上正脉

浮 重按不足輕按有餘

浮為在表　浮而緩為太陽中風

浮而緊為太陽傷寒

浮而數浮為風數為虛則洒淅惡寒也

數 去來促急一息頻至

數為熱　為實　浮而數可發汗

浮數而大邪氣傳也

浮數而微邪氣不傳

動 當關如豆厥厥動搖

陰陽相傳名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒此三焦傷也　數脉見于關上下无頭尾如豆大厥厥動搖名曰動動為陽虛　為痛

滑 狀如轉珠圓盛而實

翕奄沉為滑翕合也言張而復合也故曰翕為正陽沉言忽降而下故曰沉為純陰方翕合而降下也奄謂奄忽之間此陰陽和合也為實為吐

四時脉

春 脉弦屬肺

夏 脉洪屬心

秋 脉浮屬肺

冬 脉沉屬腎

脾淋中緩分主於辰戌丑未之月各一十八日共七十二日也

六經本脉

太陽	少陽	少陰
尺寸	尺寸	尺寸
俱浮	俱弦	俱沉

陽明	太陰	厥陰
尺寸	尺寸	尺寸
俱長	俱沉細	俱微緩

陰脉陽病見陰脉則死

沉 輕按不足重按有餘 沉為在裏 為寒 為實 為水 沉細夜加 沉則榮氣微也

濇 按之戰慄如刀刮竹 榮氣不足也 為少血 為亡汗 為逆冷 陰脉遲濇故知血亡

弱 輕按無力按之微細 衛氣弱名曰榮榮氣弱名曰卑卑卑相搏名曰損 陰脉弱則血虛血虛則筋急也

弦 狀如弓弦緊動不接 脉浮緊名曰弦 為痛 為寒 為水氣 純弦動急死脉也

微 極細而軟似有若无 衛氣衰也 為衄 為亡汗 為亡陽 為泄

結 往來遲緩結者陰陽氣不相續時止復來 脉結之如車轂者陽結也陽氣結於外脉緊之如循長竿者陰結也陰氣結於內

促 往來急數時止復來 脉來數時止復來名曰促 陽盛則促 蓋陰陽之氣緩數不相續也故為病脉非結代之脉動而中止 為飲 為痰

濡 和柔按之虛弱 上下陽脉寸尺中也上下同等為和 又為虛 為虛 為自汗 陽脉寸尺浮大而濡陰脉浮大而濡

緩 去來微遲 陰陽脉浮大而濡上下同等名曰緩 偏勝為病后陰陽相復而和緩也小快於遲若尋常遲緩則為虛 為風

緊 去來過常動如轉索 陽脉緊緊露之氣中上焦陰府緊寒邪中下焦上為大陽主頭痛項強下焦為少陰主內慄足膝逆冷 諸緊為寒 為痛

此六者名曰殘賊能為諸脉作病也

殘賊

風則脉浮 寒則脉緊 中暑脉濇中濕脉濇 傷於陰則脉沉 傷於陽則脉浮

同等脉

弦為痛純弦為死脉 寸口關上尺中三處大小浮沉遲數同等雖有寒熱不解此脉陰陽為和平雖劇必愈

諸浮為在表 為陽 諸沉為在裏 為陰 諸遲為在藏 為寒 諸數為在府 為熱

脉衰微 脉微如羹上肥者陽藏也脉衰如蛛絲者陽氣衰也脉綿綿如循薄之絮者氣血也

脉絕 脉浮濇 脉浮大而濇身汗如油帶而不沐休其氣命絕 立夏得洪大脉是其本位旺大病身体舌緩重者須臾其汗若明日身不熱不重者不須發汗若汗氣自出者明日便解一何以言之立夏得洪大脉是其時脉故便然也四時故起

時脉

遲 去來極緩一息三至

遲為在藏　遲為寒

陰脉遲濇故知血亡

芤 中空傍實浮之又浮

榮氣不足也

為虛　為失血

散 按之解散陰陽內也

傷寒咳逆上氣其脉散者

死謂其形損故也

革 氣血改革不循常度

脉弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相傳此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

代 動而中止不能自還

真氣衰極脉不能自動因

呼吸相引而動為死脉也

傷寒十勸

或曰雜病以弦為陽傷寒以弦為陰雜病以緩為陰弱傷寒以緩為和緩何也曰雜病以弦為陽者脉近乎浮實也傷寒以弦為陰者弦乃陽為陰所鬱如春時寒氣尚凜陽不得發越故春脉弦經云厥陰之至其脉弦是也若緩者傷寒以大為病進緩為邪退邪退病除則氣脉和緩故為欲愈之脉雜病以緊為七表傷寒以緊為少陰蓋緊者仲景多言咽痛下利虛損多汗等證然在陽經則浮而緊在陰經則沉而緊也若時疫流行經所謂天地之氣勝復之作不形於證診當於運氣內詳之

傷寒與他證不同投藥一差生死立判李子建傷寒十勸不可不知人家有病招醫未至或先醫者若知此十勸則不致有誤所益非輕今詳具于後

一傷寒頭痛及身熱便是陽證不可服熱藥傷寒傳三陰三陽共六經內太陰病頭不疼身不熱少陰病有反發熱而无頭疼厥陰病有頭疼而无發熱故知頭疼身熱即是陽證若妄投熱藥決致死亡

二傷寒必須直攻毒氣不可補益邪氣在經絡中若隨證早攻之只三日四日痊安若妄謂先須正氣却行補益使毒氣流熾多致殺人

三傷寒不思飲食不可服溫脾胃藥傷寒不思飲食自是常事終无餓死之理如理中丸之類不可輕服若陽病服之致熱氣增重或至不救丁香巴豆之藥尤不可服

四傷寒腹疼亦有熱證不可輕服溫煖藥難經云疼為實故仲景論腹滿時痛之證有曰疼甚者加大夫疼甚而加大黃意可見也惟

身冷厥逆而腹痛者方是陰証須消息之每見腹痛便投熱藥多致殺人

五傷寒自利當看陰陽証不可例服補藥暖藥止瀉藥自利惟身不熱手足温者屬太陰身冷四逆者屬少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽當隨証依仲景法治之每見下利便投暖藥及止瀉藥者多致死亡

六傷寒脅脇痛及腹脹滿不可妄用艾灸常見村落間有此証无藥便用艾灸致毒氣隨火而盛脹滿喘以死不知脅痛自屬少陽腹脹雖屬太陰仲景以為當下之病此外惟陰証可灸

七傷寒手足厥冷當看陰陽不可例作陰証有陰厥有陽厥醫者少能分辨陽厥而投熱藥殺人速於用刃蓋陽病不至於極熱不能發厥仲景所謂熱深厥亦深熱深更与熱藥寧復得活但看初病而身熱至三四日後熱氣已深大便秘小便赤或譫言昏憒及別有熱証而發厥必是陽厥宜急用承氣湯以下之若初得病身不熱大便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不見熱証而厥逆即是陰厥方可用四逆湯之類二厥所以使人疑者緣為其脉皆沉然陽厥脉沉而滑陰厥脉沉而弱又陽厥時復指爪却温或有時發熱陰厥則常冷此為可別

八傷寒病已在裏即不可用藥發汗傷寒証須看表裏如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反惡熱即是裏証若一例發汗則所出之汗不是邪氣是真氣邪氣未除而真氣先涸死者必矣又別有半在表半在裏之証及无表裏之証不惟皆不可下亦皆不可汗但隨証治之

九傷寒飲水為欲愈不可令病人恣飲過度

病人大渴當与之水以消熱故仲景以飲水為欲愈人見此說遂令病者縱飲因而与嘔為喘為咳逆為下利為腫為悸為不結