水二升煮取一升去滓分三服

調中湯 痰厥 夏感寒邪 下血

大黃三分 葛根 芍藥 黃芩 桔梗

茯苓 藁本 白朮 甘草已上各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一中盞移時再服之得快利壯熱便歇小思減與服安常云久年腸風下血亦差

[illegible]

[illegible]治人書括指掌方卷之九

[illegible] 赤茯苓湯 陰陰當渴氣上壅 壯下後身頂揭筋肉惕

赤茯苓 陳皮 人參各二錢 白朮 芎藭

半夏各一錢 水二盞煎至八分去滓服

[illegible] 猪苓湯 嘔渴心煩下得服 熱在下焦小便不利

猪苓 茯苓 [illegible] 滑石 阿膠各三錢一字

水一升三合先煮四味取七合去滓內阿膠分三服

[illegible] 大半夏湯 傷寒痰証

半夏 白茯苓 生姜各一分

水二盞煎至一盞去滓臨卧時服只作一服若有熱痰加甘草脾胃不和去甘草加陳皮

[illegible] 半夏生姜湯 即小半夏湯 咳逆 殺不下而嘔吐

半夏一兩分 生姜二兩 水三盞煎至一盞去滓分二服

百七 半夏桂甘湯 脾病夏感寒利名腎傷寒 非時暴寒伏於少陰脉微弱次必下咽痛

半夏 桂枝 甘草各二分

水二盞生姜五片煎至八分去滓旋旋呷之

百八 生姜汁半夏湯 胸中似喘不喘似嘔不嘔微心憒憒 無柰者

半夏半兩 水一盞半生姜自然汁半盞同煎至七分去滓溫服

百九 厚朴半夏甘草人參湯

厚朴四錢 半夏錢半 甘草錢 人參半錢

水二盞生姜五片煎至八分去滓服

百十 甘草瀉心湯 即半夏瀉心湯此內盛甘草三錢下之心下痞

甘草一兩 半夏八錢一字 黃芩 乾姜 人參各一兩

黃連三錢一字半 大棗十二枚

水三升三合煮取二升去滓再煮取一升分三服

百十一 附子瀉心湯 心下痞惡寒汗出

大黃半兩 黃連 黃參各二錢半 附子半枚

先以水一盞煮附子取半盞次以百沸湯二盞漬上三味一時久乃去滓入附子汁和勻溫分二服

百十二 生姜瀉心湯 下利心下痞腹中雷鳴

於甘草瀉心湯內減甘草作三錢一字半加生姜一兩三錢

百十三 三黃瀉心湯 心下痞按之濡其脉關上浮者可服惡寒不可服

於附子瀉心湯內去附子

百十四 霹靂散 陰盛禍陽身冷膝沉煩躁不飲水

附子一枚炮 取出用冷灰培之取半兩入真臘茶一大錢同研勻更分二服每用水一盞煎至六分臨熟入蜜半匙候溫冷服須煩躁止得睡汗出差

百十五 桔梗半夏湯 腹服 見後百十四

百十六 附子湯 陰証脉沉身痛 少陰背惡寒口中和

附子一枚生 茯苓 芍藥 人參各一兩 白朮一兩三錢一字

水二升六合煮取一升去滓分三服

百四十 朮附湯 風溫小便自利 溫溫

白朮六錢二字半 甘草二錢一字 附子 生姜各半兩

水二升棗二枚煮取一升去滓分二服

百四十一 羌活附子湯 亥逆

羌活 附子 茴香各一錢半 木香一錢 乾姜一棗許

為細末每二錢水一盞鹽一捻煎十數沸熱服

百四十二 眞武湯 陰証脉沉身痛發汗過多筋惕肉瞤 去頭痛小便不利

茯苓 芍藥 生姜各一兩 附子一枚炮 白朮六錢二字半

水二升六合煮取一升三合去滓分三服劾者加五味子細辛乾姜

小便利者去茯苓下[illegible]者去芍藥加乾姜嘔者去附子加生姜

百四十三 白通湯 少陰下利

葱白四莖 乾姜三錢一字半 附子一枚生

水一升二合煮取六合去滓分二服

百四十四 白通加猪膽汁湯 下利脉逆脉不至

附子一枚 乾姜三錢一字半 葱白四莖 人尿一合半

猪膽汁半合

水一升煮取半升去滓內人尿膽汁相和分二服無膽汁亦可

百四十五 乾姜附子湯 下后復發汗昏不得眠无表証脉微者

乾姜三錢一字半 附子一枚生 水一升煮取三合半去滓頓服

百四十六 乾姜黃芩黃連人參湯 傷寒損吐下寒氣內格食入即吐

乾姜 黃連 黃芩 人參各三錢

水一盞半煎至八分去滓服

百四十七 正陽散 陰毒傷寒十四青心一服四肢冷

甘草 乾姜各一分 附子一兩 麝香 炙 皂莢 去皮子酒炙

為細末每二錢水一中盞煎至五分熱服

百四十 理中湯 太陰自利不渴 寒多而聖 腹痛 鵝鴨 雀卵

人參 甘草 乾姜 白朮 各二分

水二盞煎至八分去滓服賢氣動者去木加桂三錢吐多者去木加生姜三錢下多者還用木倖氣小便不利者加茯苓二錢渴者加朮一錢半腹痛者加人參一錢半寒者加乾姜一錢半腹痛下利 加附子

百四十一 理中加茵蔯湯 萬令半宗脉弱氣虛變為陰

本方內加茵蔯高一錢

百四十二 理中加石膏湯 虛軟轉筋 本方內加石膏半兩

百四十三 理中丸 疾兩胃寒一霍亂寒多不渴 未成勞胃者 一云食即吐泄

與理中湯同但為細末煉蜜丸如彈大沸湯半盞化一丸

百四十四 增損理中丸 太陰下之音痛便 諸結胸宜 恒

人參 白朮 各一兩 甘草 乾姜 半兩 黃芩 半兩

枳殼 十二片

為細末煉蜜丸如彈大沸湯化一丸渴者加栝蔞根汗出者加牡蠣

百四十五 枳實理中丸 寒實結實

茯苓 人參 白朮 乾姜 甘草 各二兩

枳實 十六片

為細末煉蜜丸如雞子黃大每一丸熱湯化下連進二三服

百四十六 四順丸 少陰下余日下利不止手足微冷

理中丸內加甘草一倍

四順湯 身无熱脉沉苦煩熱三不欲見光時腹痛下利手足逆冷

理中湯中加甘草一倍是也依本方煎服

百四十七 脾約丸 老人津少大便堅 脾氣大便燥

大黃 一兩 枳殼 厚朴 白芍藥 各半兩 麻子仁 一兩

杏仁 三分

為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫水下未知再加

金匱風引 大黃 乾薑 龍骨酪四 桂枝三兩

甘草 牡蠣各二兩 石 滑石 赤石脂

白石之 石膏 紫石英各六兩

右十二味杵為麄末以草 益之取三指撮井花水三升煮三沸去

滓渾服一升

百五十二 柴胡半夏湯去熱頭疼手足刃熱

柴胡二兩 半夏 白朮各半兩 甘草 人參

黃芩 麥門冬各三分

每服七錢水二盞半生姜五片棗子一枚煎至八分去滓服

百五十三 治中湯食精心腹痛痛 即理中湯加青陳皮各二錢

百五十四 百合知母湯百合病 百合一枚 知母一兩

先以水洗百合漬一宿洗去白沫別以水一盞煮取一盞去滓又以

水二盞煮知母至一盞去滓相和煎取一盞半分二服

百五十五 百合地黃湯百合病 百合七枚 生地黃汁一盞

先洗漬百合如前法以水三盞煮取一盞去滓內地黃汁煮取盞半

分二服大便當如漆中病勿服

百五十六 百合洗方百合病 百合一升

水一升漬一宿溫煖洗身洗已食煮餅勿用塩豉即淡熟麵條也

百五十七 犀角地黃湯血鼻大便黑 衄後脉微 發狂 發黃 喉中不欲 當汗不汗內有瘀血

芍藥二兩 生地黃一兩半 犀角屑二兩半如無以升麻代之

牡丹皮二兩半 分三服每服水一盞半煎至七分去滓服

百五十八 犀角大青湯班瘡出煩疼

大青三分 梔子十枚 犀角屑二兩半 豉一撮

分二服每服水一盞半煎至八分去滓服

百五十九 大青四物湯發赤斑 一名阿膠大青湯

大青一兩　阿膠　甘草各二錢半　豉二合

分三服每服水一盞半煎至一盞去滓入膠候烊溫服

百六 青黛一物湯 發赤斑　青黛如棗大水研服

青木香一物湯 右以青木香一物濃煮汁服

五物木香湯 青木香一兩　丁香　薰陸香　白礬各二兩

麝香一分　右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去滓

溫服熱盛者加犀角屑一兩輕者去白礬大効

百六 黑奴丸 陽毒 發斑煩躁大渴倍常

黃芩　釜底煤　芒銷　竈突墨　梁上塵

小麥奴　麻黃各一兩　大黃一兩

為細末煉蜜丸如彈大新汲水化服飲水盡足當發寒已汗出乃差

若一時頃不汗再服一丸頃見微利若不大渴不可與

百六 黑膏 溫毒 發斑嘔逆　生地黃二兩六錢二字半　好豉一兩錢二

以猪膏十兩合露之煎令三分減一絞去滓雄黃麝香如豆大內中

攪和分三服毒從皮中出則愈忌無美

李根湯 甘李根白皮二合　當歸一分　生姜半兩　茯苓一分

桂枝一兩　芍藥一分　黃芩　甘草各一分　半夏半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

百四 紫雪 發斑 神氣暑中三陽所患必熱煩躁者

升麻六錢　黃金一十兩　寒水石　石膏各四兩八錢　犀角

羚羊角各一兩　玄參一兩六錢　沉香　木香　丁香各半兩

甘草八錢　右以水五升煮黃金至三升去金入諸藥再煎至一

升濾去滓投朴硝三兩二錢微火煎以柳木篦子攪勿停手候欲凝

入盆中更下研朱砂麝香各三錢急攪令勺候冷凝成雪也每服一

錢匕細細嚥之

二硝猪膽塗瘡法

右以芒硝猪膽相和塗之即痂落无瘢仍卧黄土末上良此病小便澁有血者中壞也瘡皆黑靨不出膿者死不療

百六十五 吳茱萸湯 吐利手足厥冷煩躁欲死 嘔而膏滿

吳茱萸 生姜各半兩 人參一分

水二盞棗一枚煎至八分去滓服

百六十六 旋覆代赭湯 汗吐下後心下痞

旋覆花一兩 人參六錢二字半 代赭石三錢一字 甘草一兩 生姜一兩六錢一字

半夏八錢一字 大棗十二枚

水三升三合煮取二升去滓再煎至一升半分三服

百六十七 大橘皮湯 嘔噦胃滿虛煩不安

陳皮 甘草各半兩 人參一兩

分二服每服水二盞生姜十五片煎至八分去滓服

百六十八 小橘皮湯 又名生姜橘皮湯 嘔噦手足逆冷

陳皮一兩 生姜一兩

水三盞煎至一盞半去滓分二服

百六十九 橘皮湯 傷寒痰逆惡寒 即橘皮竹茹湯

甘草一錢 人參二錢 陳皮半兩

用青李竹刮上青茹一團姜四片棗一枚水一盞半煎至八分去滓熱服

百七十 橘皮乾姜湯 即橘皮半夏生姜湯 咳逆 噦惡

陳皮 通草 乾姜 人參

分二服每服水二盞煎至八分去滓服

[illegible] 方有桂枝甘草各等分 指掌方云即橘皮半夏生姜湯本方內無半夏生姜未審是否

[illegible] 桔梗湯 少陰咽痛

桔梗半兩 甘草一兩

分二服每服水一盞煎至八分去滓服

[illegible] 桔梗枳殼湯 痞証 胷滿不痛 枳梗 枳殼

水二盞煎至八分去滓服

[illegible] 桔梗半[illegible]湯 腹脹 桔梗 半夏 陳皮各三錢

水二盞姜五片煎至八分去滓服

[illegible] 漢防已湯 風濕脉浮身重汗出

甘草 黃芪各三錢一字半 漢防已六錢半 白朮半兩

水三盞生姜十片棗二枚煎至八分去滓服訖坐被中汗出如虫行或被卧取汗

[illegible] 防已黃芪湯 與防已湯同但分兩異尔[illegible]治証亦同

防已 黃芪各三錢 白朮二錢 甘草一錢

水二盞姜五片棗一枚煎至八分去滓服齊不和加芍藥氣上冲加桂枝有陳塞加細辛

[illegible] 防風白朮牡蠣湯 白朮 牡蠣粉 防風各等分

右為細末每服一錢酒調下米飲亦得日二三服汗止服小建中湯

[illegible] 五積散 感寒 脚氣 食積心腹滿痛

川芎二兩 蒼朮二十四兩 桔梗十二兩 陳橘皮八兩 枳殼五兩

吳白芷四兩 官桂二兩 人參二兩 厚朴 芍藥

白茯苓 當歸 乾姜 麻黃 半夏已上各三兩

甘草二兩半

右件除枳殼肉桂橘皮其餘並一處生搏為麄末分作六分於大鑊內用文武火炒令黃熟不得焦用紙攤於板床上候冷入前件枳殼官桂橘皮末一處和勻入羌合盛每服二錢水一盞生姜三片同煎至七分去滓溫服傷寒入葱白豆豉七粒陰經傷寒加附子同煎臨時加減

[illegible] 五苓散 小便不利而渴 中暍煩躁 霍亂

澤瀉一兩一分 白朮三分 茯苓三分 猪苓三分 桂枝半兩

右為細末每服三錢白湯調下

百零散吐法 無熱煩躁狂言 方以五苓散二大錢白湯調下當與新汲水飲一升許即以指刺喉中即吐

百十 五味子湯 常促脉伏而厥

五味子一兩 人參 麥門冬 杏仁 陳皮各半兩

水三盞生姜十片棗子二枚煎至一盞半分二服

百一 丁棗湯 心下痞硬脇痛乾嘔短氣汗出不惡寒

芫花 甘遂 大戟各等分

水一盞半先煮大肥棗十枚取八分內藥末強人一錢弱人半錢平旦溫服若下少病不除明日更服加半錢後快和後藥粥白養

百二 三物白散 寒實結胸 具母 桔梗各三分 巴豆一錢

二味為散內巴豆研和以白飲和服強人半錢弱人減之病在膈上必吐在膈下必利不利進熱粥一盃利過進冷粥一盃汗出已後中

有[illegible]藥一兩如上法

百三 桃花湯 少陰下利膿血 溫毒下利

赤石脂五兩三錢一半全用一半為末 糯米三合 乾姜三錢

水二升三合煮米令熟去滓溫服二合半內赤石脂末方寸匕日三愈勿服

百四 杏仁湯 風濕身痛惡風微腫

桂半兩 天門冬 麻黃 芍藥各二錢 杏仁七枚

水三盞生姜十片煎至一盞半去滓分二服

百五 木瓜散 腳腫 大腹皮 紫蘇 乾木瓜 甘草

木香 羌活各一分

右為麄散分三服每服水一盞半煎至八分去滓服

百六 烏梅丸 蚘厥 烏梅七十五个 細辛 附子 人參

黃蘗 桂枝各一兩半 乾姜二兩半 黃連四兩 蜀椒

當歸各一兩　石十味異擣篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之五升末下飯熟杵成泥和藥令相得內白中與蜜柳三千下丸如梧桐子大先食飲服十丸日三加至二十丸禁生冷滑物

頁七 牛旁根散 汗不流是汗出時蓋覆不周故戒背手足搐

牛旁十條　麻黃　牛膝　天南星各六分

右細剉於破盆內研細用好酒一升同研以新布挨取汁後用炭火半秤燒一地坑子內通赤去火掃淨投藥汁坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服半錢酒調下又方有地龍一兩

頁八 酸棗湯 吐下後晝夜不得眠　酸棗仁一升　甘草二分半

知母半兩　麥門冬二合　茯苓　芎　乾姜各三分

為麄散每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

頁九 地榆散 傷寒熱毒不解晚即生熱腹痛便囊血　地榆

犀角屑　黃連　茜根　黃芩各半兩　梔子仁二分半

為麄末每服五錢水一盞入薤白五寸煎至六分去滓服

頁十 葱豉湯 傷寒二日頭項痛惡寒脉緊无汗

葱白十五莖　豉二十七　乾葛八分　麻黃四分

水二升先煮麻黃六七沸去白沫內乾葛煎十餘沸下豉煎取八合去滓分二服如人行五六里再服訖良久煮葱豉粥熱喫以衣覆出汗

頁十一 連須葱白湯 已汗未汗頭痛如破　連須葱白切半升

生姜二兩　水三盞煎至一盞半去滓分二服

頁十二 茅花湯 鼻血不止　茅花二大把無花用根

水三盞煎濃汁一盞分二服

頁十三 蘗皮湯 熱毒深入吐血　蘗皮三分　黃芩　黃連各二分

水二盞煎至一盞去滓入阿膠一錢半煎烊溫服

頁十四 麥門冬湯 勞復發熱　麥門冬　甘草各二分半

粳米湯一盞半棗二枚竹葉十五片煎至八分去滓服

百七 檳榔散 脚腫 橘葉一大握 沙木一握 小便 酒各半盞

煎数沸去滓調檳榔末二錢服

百八 萎蕤湯 冬温 風温 春月中風傷寒

萎蕤一分 石膏三分半 麻黄 白薇 羌活

杏仁 甘草 芎 青木香各二分半 葛根半兩

分三服每服水二盞煎至八分去滓服

百九 葶藶苦酒湯 發狂煩躁面赤咽痛 大下傷血發熱脉濇

苦酒一升半 葶藶一合 生艾汁 無生艾以熟艾汁半升

煎取七合作三服

百八 括婁根湯 風温 大渴 石膏一兩 括婁根三分 人參

防風 甘草各半兩 乾葛二分

每服七錢水一盞半煎至八分去滓服

六三 脘散 脚氣 今用五分水一盞半煎七分

獨活 木瓜 大腹皮 紫蘇各一兩 白朮

甘草各三分 陳橘皮 沉香 木香 川芎

檳榔已上各三分麪裹煨 右為麄末每剤秤一兩水一盞煎至

一盞去滓分二服帶温服取便利為効

百九 延胡索散 泉血 延胡索一兩 朴消三分

為細末每服四錢水一盞半煎至八分温服

二百 射干湯 夏月暴寒熱伏於内咳嗽喉咽

射干 當歸 麻黄 肉桂 枳實

紫花 獨活 橘皮 甘草各一兩 生姜二兩

半夏二兩半 杏仁一兩半

每服七錢水一盞半煎至八分去滓服

二百一 金沸草散 頭痛壯熱胷膈有痰

前胡 旋覆花各一兩 半夏五分 細辛 甘草各二分

荊芥穗一兩半　赤茯苓六分半

為麄末每服四錢水一盞半生姜五片棗一枚煎至七分服

【一百二】調中湯表病　夏感寒　方在前【百二十二】內寒更益堅欲飲水而不渴

【一百三】文蛤散病在陽反冀以求熱

文蛤一兩　為末沸湯和服方寸匕

【一百四】牡蠣澤瀉散病差後從腰已下有水氣

牡蠣　澤瀉　蜀漆　商陸　葶藶

海藻　栝蔞根各等分

為細末米飲調方寸匕小便得利為佳

【一百五】猪膽鷄子湯傷寒五六日狂水

猪膽二合　鷄子一枚　苦酒三合

和勻煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服汗出差

【一百六】猪膚湯少陰下利咽痛胸滿而煩

猪膚五兩　水三升三合半煮取一升七合加白蜜二合半

二合熬香和令相得分三服

【一百七】鱉甲散傷寒八九日不差諸藥不効名壞傷寒

鱉甲　升麻　前胡　烏梅　枳實

犀角　黃芩各半兩　甘草一分　生地黃二兩

每服五錢水一盞半煎至八分去滓服

【一百八】地血散熱毒深入吐血

茜根四兩　大豆二兩　黃藥子　甘草各一兩

為細末每服三錢新汲水調下

【一百九】赤石脂丸協熱而利

赤石脂　乾姜各一兩　黃連　當歸各二兩

為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸米飲下

【一百十】赤石脂禹餘粮湯痞而利　止當治下焦

赤石脂　禹餘粮各一兩

分三服每服水一盞半煎至八分去滓服

二百五十 白頭翁湯 腸拓燥熱而利　渴而下利

白頭翁　黃蘗　秦皮　黃連 各半

水一盞半煎至八分去滓服

二百五十一 烏扇湯 因中開塞　生烏扇 射干苗和 无用射干　猪脂各四兩

二味合煎藥成去滓取半雞子大薄綿裹內喉中稍稍嚥

二百五十二 消暑元 傷暑發熱頭熱煩疼　半夏 醋五升煮乾　甘草 生

茯苓各半斤　為末姜汁糊丸如梧桐子大每服五十丸熟水下

二百五十三 香薷湯 感風冷寒邪胃滿霍亂吐利　中暍

白扁豆　茯神　厚朴 姜汁炒各一兩　香薷二兩　甘草炙半兩

為細末每服二錢沸湯點服入些塩點服亦得

二百五十四 香薷散 中暍　霍亂　厚朴 姜製　香薷一兩半

黃連二兩已上二味以生姜四兩同拌炒令紫色用

右為麄末每服三錢水一盞酒半盞同盞至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頻服之藥冷則効速也仍煎[illegible]不得犯鉄器慢火煎之

二百五十五 治蠶桃仁湯 傷寒不發汗變狐惑唇生瘡声啞

桃仁　槐子　艾各半兩　棗五枚

水二大盞半煎至一盞半分二服

二百五十六 雄黃銳散 狐惑唇瘡声啞

雄黃　青箱子　苦參　黃連各二分　桃仁一分

為末以生艾搗汁和如小指尖大綿裹內下部中無艾亦可

二百五十七 萬全木通散 小便難而黃

木通　赤茯苓　車前葉　滑石各一兩　蓬麥半兩

為末每服四錢水一盞煎至六分去滓服

二百五十八 鼠失鼓湯 勞復發熱

梔子十四枚　雄鼠失二七枚　枳殼三枚 木殼

為麄末每服四錢水一盞半葱白二寸香豉三十枚煎一盞去滓分二服

二百廿 猳鼠矢湯 男子陰易 及勞復

韭根一大把 猳鼠糞十四枚 西頭尖者是

二味水二盞煎取七分去滓再煎三沸溫服得粘汗効未汗再作

二百廿一 燒裩散 陰陽易

裩襠近隱處男子病用婦人裩當婦人病用男子者燒

水和服方寸匕以小便利陰頭腫即愈

二百廿二 竹皮湯 病後交接勞復外腎腫腹中痠痛

刮青竹皮一大盞 水二盞煎至八分去滓服

二百廿三 當歸四逆湯 下之厥逆 當歸 芍藥 桂枝

細辛各一兩 甘草 通草各六分三字半

水二升七合大棗二十五箇或用十五个者取一升分三服

二百廿四 通脉四逆湯 厥逆下和脉不至

甘草六分二字半 附子大者一枚 乾姜

面赤者加葱九莖嘔加生姜咽痛加桔梗利止脉不出加人參水三大盞煎取一盞半去滓分二服

同上 通脉四逆加猪膽汁湯 止但止汗出而厥西支拘急脉

本方內加猪膽汁半合攪勻分二服其脉即來

同上 通脉四逆加芍藥湯 少陰復痛或泄利下重

本方內加芍藥六錢二字半

二百廿五 瓜蔕散吐法 脉六胃滿多痰 [illegible] 病頭疼

瓜蔕神 赤小豆各等分

二味別搗篩為散中半合和令以水二盞煮香豉一合作稀粥去滓取三分之一和散一錢匕頓服之不吐少少又加得快吐乃止諸亡血虛家不可服

二百四十　瓜蔕搐鼻法　溫家鼻塞頭疼

瓜蔕不以多少為末口噙水搐一字入鼻中出黃水愈

二百四十七　蜜道煎法　自汗大便秘

蜜二合於銅器中微火煎之稍凝如飴伏攪一勿令焦欲可丸併手捻作撻令頭銳大如指長寸半許當熱時急作冷即硬內便道中以手急抱欲大便時急去之

二百四十八　猪膽汁法　陽明自汗反小便利屎雖硬不可[illegible]出

大猪膽一枚和醋少許灌穀道中一食頃當大便出

二百四十九　陰毒薰法　陰毒逆冷裏病者

大豆二升炒令極熱先以淨盆桶內置熱醋二升旋扶病人坐桶上薰少時却以熱豆傾桶中薰之有頃裏下却以陰證藥服之

二百五十　葱熨法　陰毒

以索纏葱白如臂大切去根及青留白二寸許先以火煬一面熱以熱處著病人臍下上以熨斗貯火熨之令葱心併熱氣透入肌肉更三四餅壞則易之良久病人當漸醒手足溫有汗即差續當更以逆湯之類溫之若熨而手足不溫不可治也

二百五十一　陰毒著艾法

用乾艾葉搗熟去灰作艾炷灸臍下一寸五分名氣海二寸丹田三寸關元五十壯至二三百壯以手足漸溫人事稍甦為可治

二百五十二　水漬法　陽毒漸深脉洪大內外結熱舌卷焦黑鼻如煙煤

疊布數重新水漬之稍挨去水搭於患人胷上須臾蒸熱又以別浸冷布易之頻換新水熱稍退可進陽毒藥

二百五十三　硫黃齅法　咳逆照藥无効者

以硫黃乳香等分為末以酒煎急令患人齅之

又方　雄黃二錢酒一盞煎七分急令患人齅其熱氣即止

二百五十四　灸少陰　少陰吐利手足不冷反發熱脉不至

少陰即太谿穴也太谿二穴在足內踝後跟骨上動脉陷中灸七壯

二百五 溫粉 汗多不止 白朮 藁本 川芎 白芷 各等分

為細末每藥一兩入米粉一兩半相和用粉撲周身撲之

二百六 蒸法 不得汗

以薪火燒地良久掃去以水洒之取蚕沙栢葉桃葉糠麩皆可鋪燒地上可側手厚然後鋪席令病人當上卧溫覆之移時汗出俟周身至脚心漐漐乃用溫粉撲之最得力者蚕沙栢葉也糠麩乃助其厚

二百七 灸關元 并刺 藏結死證不可攻宜此

臍下三寸是也乃少陰任脉之會

二百八 灸期門 并刺 婦人熱入血室 咳逆

婦人蛋乳頭向下盡處骨間丈夫及乳小者以一指為率陷中有動脉是穴咳逆灸之艾炷如小豆大灸三壯或五七壯婦人熱入血室譫語者刺之下針令病人吸五吸停針良久出針

二百九 刺大推肺俞

枕骨下第一推是也

肺俞即第三推各開一寸半

二百十 結胷灸法

黃連二寸許為末巴豆七粒去殼研細入黃連末徐句作餅子按臍中以艾炷指頭大灸之輕者一炷重者不過二三炷灸透熱氣入腹作声取下惡物愈

發汗法

凡發汗欲令手足俱周濈濈然一時許為佳不欲如水淋漓服湯中病即已不必尽剤然發汗須如常覆腰以上厚衣覆腰以下盖腰以上淋漓而腰以下至足心微潤病終不解凡發汗病證仍在者三日內可二三汗之令腰脚周遍為度