類編傷寒活人書括指掌方卷之九

鼇峰 熊宗立 道軒 續編

○傷寒補遺經驗良方

香蘇散 治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇 香附子各一兩 陳皮一兩 甘草炙半兩

右㕮咀每服五錢水一盞姜葱煎至七分去滓熱服如頭痛甚可加川芎白芷名芎芷香蘇散

芎蘇散 治證同前

桔梗三分 柴胡 川芎七分 紫蘇葉 乾葛各三分

枳殼炒 陳皮各三分 茯苓各半兩 甘草三分 半夏六分

右㕮咀每服四錢姜棗煎

十神湯 治時令不正瘟疫妄行感冒風寒發熱憎寒頭疼無此汗此藥不問陰陽兩感初然發散宜服之

川芎 甘草 麻黃 乾葛 紫蘇

升麻　赤芍藥　白芷　陳皮　香附子

右㕮咀每服五錢姜葱煎如頭痛甚更加葱白三莖中滿氣实加枳殼煎並熱服

消風百解散 治四時傷寒頭疼發熱及冒風寒咳嗽鼻塞声重或喘急

荊芥　白芷　陳皮　麻黃去節　蒼朮各四兩

甘草炙二兩　右㕮咀每服四錢姜葱煎熱服咳嗽加烏梅煎

參蘇散 治感冒風邪發熱頭疼咳嗽声重涕唾稠粘此藥內解肌熱寬中快膈或勞瘵潮熱往来婦人有孕傷寒並治

木香　蘇葉　乾葛　半夏　前胡

人參　茯苓各七分半　枳殼　桔梗　甘草

陳皮各五分

右㕮咀每服四錢姜四片棗一枚煎熱服氣盛者去木香

[illegible]正氣散 治傷寒頭疼憎寒壯熱或感溫氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣

大腹皮　白芷　茯苓　蘇葉

藿香各三兩　厚朴　白朮　陳皮去白　苦梗

半夏各三兩　甘草炙一兩

右㕮咀每服三錢姜三片棗一枚煎熱服

不換金正氣散 治四時傷寒瘟疫時行及山嵐瘴氣寒熱往来霍乱吐瀉下痢赤白及出遠方不伏水土者並皆治之

厚朴　陳皮　藿香　半夏　蒼朮子分

甘草減半　右㕮咀每服三錢姜三片棗一枚煎熱服

二香散 治四時感冒冷溫寒暑嘔惡泄利腹痛瘴气飲冷當風頭疼身熱傷食不化及南方風土暑月傷風傷寒不敢服麻黃桂枝初以此藥解表發散

蘇葉　陳皮　蒼朮各一兩　香薷

厚朴　甘草　扁豆各半兩　香附子各二兩

剉散每服五錢姜葱煎熱服加木瓜二片更佳

神木散 治四時瘟疫頭疼項強發熱憎寒身躰疼痛傷寒鼻塞声重咳嗽頭昏

藁本　羌活　甘草　白芷

細辛　川芎各一兩　蒼朮米泔浸一宿切焙五兩

剉散每服四錢姜三片葱白三寸煎服為末葱白茶清調亦可

神和散 治寒溫不節將理失宜乍煖脫衣飲冷坐卧當風居處暴露風雨早行冒露呼吸冷氣久晴煖忽變陰寒或久雨生寒溫如此之候皆為邪厲侵傷肌膚入于腠理致人身躰沉重肢節酸疼項背拘急鼻塞声重氣壅上盛咽渴不利凡此等証若不便行解利伏留經絡傳變不已

蒼朮六兩　荊芥穗二兩　甘草一兩

剉散每服三錢水煎熱服纔覺傷寒及覺勞倦便須服之不問老幼虛实皆宜服

白水散 治傷寒及雜病一切吐瀉煩渴霍乱虛損氣弱保養衰老及治[illegible]損嘔噦

白朮　茯苓　人參各五錢　甘草一兩

木香二錢半　藿香五錢　葛根一兩

右為末白湯調下[illegible]加滑石二兩吐甚者加姜汁

萬安散 治傷寒輕可發散

蘇葉　陳皮　香附子　桔梗　白芷

半夏　甘草　前胡　藁本各一兩　乾葛二兩

右剉每服五錢姜三片煎熱服無汗煩躁者加麻黃

乾葛湯 治傷寒頭痛不可忍者

石膏二兩　麻黃　乾葛　川芎各一兩

剉每四錢姜八片葱白八莖煎熱服

縮脾飲 治伏暑熱煩渴燥悶乾嘔霍乱及中酒嘔噦

縮砂　烏梅各一兩　乾葛　扁豆　草果

生姜各五錢乾者可切片日乾秤用

剉散每服五錢水煎冷服或欲溫欲煖隨意若傷暑發熱頭目痛用

以吞消暑丸方見前

桂苓甘露飲 治傷寒中暑冒風飲食中外一切所傷傳受溫熱內甚頭痛口乾吐瀉煩渴喜飲冷小便赤澁大便急痛溫熱霍乱吐下腹滿痛及小兒吐瀉驚風

茯苓一兩　甘草　白朮各半兩　澤瀉一兩　桂半兩

石膏　寒水石各二兩　滑石四兩　猪苓半兩

為細末溫湯調下新水亦得生姜湯尤良小兒每服二錢

六和湯 治傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶又治心脾不調氣不升降霍乱吐瀉轉筋寒熱交作及治痰喘咳嗽胷滿目疼頭痛肢体虛浮小便赤澁并痢疾中酒煩渴婦人胎前産後並宜服之

人參　砂仁　甘草　杏仁　半夏

扁豆　赤茯苓　藿香　木瓜各二兩　香薷

厚朴姜汁製各四兩

右剉每服四錢姜棗煎溫服

[illegible]散 治傷寒冒暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩或陰陽和致成霍乱吐利轉筋煩噪

香薷　白茅根　麥門冬　乾木瓜各一兩　枇杷葉去毛炙

陳皮　丁香　厚朴去皮姜汁製各半兩

剉散每服四錢姜三片煎服煩燥甚沉冷服如脾虛感暑嘔吐不食以此藥吞消暑元五六十粒立効体虛嘔吐昏倦手足冷除茅根麥門冬加附子

木瓜湯 治傷寒霍乱吐利不已牽躰轉筋入腹則悶絶

木瓜乾一兩　吳茱萸半兩　茴香二錢半　甘草炙一錢

剉散每服四錢姜四片紫蘇葉拾葉食塩一撮煎服仍研生蒜貼心下脚心上

益元散 治中暑身熱嘔吐熱渴煩熱心燥小便赤或熱瀉大能止渴除熱解百藥酒食等毒治時行疫癘及兩感傷寒及婦人下乳催生兼吹

乳乳癰孕婦勿服

白滑石六兩　甘草一兩炙

為極細末每服三錢蜜少許溫湯下無蜜亦可日三服要除熱結新汲水下要發汗煎葱白豆豉湯并二三服熱甚多服無害

藿香湯 治傷寒成瘧疾寒多熱少或但寒不熱頭痛惡心身体痛慄〻振寒面色青白不進飲食脉弦遲者

厚朴　藿香　半夏　白茯苓各一兩　人參

甘草　橘皮　草果　蒼朮米泔浸各半兩

剉散每服四錢姜五片棗一枚煎寒甚者可加附子

[illegible]湯 治瘧熱多寒少或但熱不寒脉弦數口苦舌乾心煩渴大小便赤秘

青皮　厚朴姜汁製　白朮　草果

柴胡　茯苓　半夏　黃芩　甘草炙各等分

剉散每服四錢姜四片煎溫服

石膏湯 治時行疫癘壯熱惡風頭痛身疼鼻塞咽乾心胸煩悶寒

熱往來咳嗽唾稠粘

赤芍藥　柴胡　前胡　石膏　乾葛各五錢

升麻二錢半　黃芩　桑白皮三錢半　荊芥四錢

剉散每服三錢姜三片淡豉十餘粒煎畧熱服小兒一錢

[illegible]人參散 治証同上

甘草　人參　指梗　青皮　白芷

乾葛　白朮各三錢　乾姜炮半錢

為麄末每服二錢姜二片棗一枚煎溫服如傷寒加淡豉煎効

太陽丹 治傷寒頭疼偏正夾腦一切頭疼如破每服一粒薄荷茶嚼下風壅痰其咽膈不利亦治

腦子二錢　川芎　甘草　白芷各一兩半　石膏三兩

大川烏炮一兩六錢

為末蜜同麵糊為丸每兩作一十八粒朱砂為衣

深真湯 治四時傷寒不問陰陽二証纔煮便服有効

蒼朮　川芎各四分　甘草二分　蒼朮一兩半

剉散每服三錢姜三片煎服

對金飲子 治四時傷寒極効又治諸疾無不愈者常服固元陽益氣健脾進食和胃祛痰自然榮衛調暢寒暑不侵

厚朴姜汁炙　蒼朮米泔浸　甘草炙各二兩　陳皮六兩

剉散姜三片煎每服三錢瘟疫時氣二毒傷寒頭痛壯熱加葱白淡豉煎熱汗出差未効再服

辰砂五苓散 治傷寒表裏未解頭疼發熱心胷鬱悶唇口乾焦神昏狂言妄語如見鬼及治瘴癘煩悶未省諸熱清心

白朮　猪苓　澤瀉　赤茯苓各一兩　肉桂六分　辰砂

為細末每服二錢沸湯點服中暑煩渴小便赤澁新水調

[illegible] 治傷寒声重暴嗽語音不出

桑白皮一　木通　貝母　紫菀　五味子[illegible]

杏仁去皮尖三兩　蜜　兩半

剉散前五件用水三升慢火熬取一升去滓用連皮生姜汁一兩半同杏仁擂爛同蜜一處成膏磁罐盛旋挑噙化

瘟手方 治傷寒舌出寸餘連日不收

以梅花腦子為末摻舌上應手而收病重用五錢方愈

加減柴胡湯 治傷寒往來寒熱衄血

小柴胡湯內加生地黃　方見正方 四十三

治傷寒湯証結胸 欲死無可藥者

以白頸蚯蚓十五條擂爛入蜜半盞冷水半碗灌服無蜜砂糖亦可

入瘟病家不相傳染宜用雄黃末水調塗鼻孔中須與病人同卧亦不相染凡疫家自生惡氣令無相染即以紙撚探入鼻中噎之為佳如無

雄黃以麻油點鼻孔亦可

江南溪毒

江東江西諸溪源間有忠名曰短狐溪毒亦名射公其虫有翅能飛形如甲虫有一長角橫在口前如弩擔臨其角端如主弓以氣為矢無目有耳能听在山源水中聞人声便以氣毒射人故謂之射公此虫畏鵝鵝能食之其証寒熱身不喜冷筋急体強目疼頭痛張口伸吟咳嗽呼吸悶乱始中便不能言朝輕暮重非其土人虫之便謂之傷寒今說其狀以明其証與傷寒別矣俗謂之沙病是也

沙證

沙證江南所在有之古方不載所感如傷寒頭痛嘔惡壯熱手足指末微厥或腹痛悶乱須臾能殺人先煎濃艾湯試之如吐即是可用五月蚕退紙剪碎安椀中以糠盖之以滚沸湯泡半椀許仍以別紙封縫良久乘熱服卧厚被盖出汗息又近時多着頭額及胸前兩边有小紅點[illegible]

[illegible]者以紙撚條或大灯草微蘸香油點燒於紅點焌爆者是又[illegible]水傷寒却用樟木煎湯服或葱豉湯汗出愈如腹痛不止用針於兩[illegible]十指近甲稍針出黑血即愈或兩足墜痛亦名水沙可於兩脚曲腕肉兩筋兩骨間刺出血愈名委中穴

良法 治沙証用苧繩蘸熱水於頸項兩肘臂兩膝腕戛見血紅點起然後厚被盖喫熱葱姜豉湯汗出愈誠不藥之良法

鹽湯吐法 治心腹絞痛令汗出脹悶欲死名攪腸沙又名乾霍乱此由山嵐瘴氣或因飢飽失時急用

鹽半盞以熱湯数椀泡鹽令患人尽服数椀不得住手方可却以雞羽掃咽喉令吐所喫鹽湯尽出其証即愈

婦人姙娠傷寒方論

論曰凡姙婦傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋常婦人一槩治之且夫冬時嚴寒人躰虛為寒所傷即成病為傷寒輕者淅淅惡寒

翕也發熱微咳鼻塞數日乃止重者頭疼躰痛增寒壯熱久而不愈則湯胎

加減四物湯 治妊婦產前腹痛及治月事或多或少或前或後及有妊胎氣不安并產後血塊不散

當歸　川芎　白芍藥　熟地黃各一兩

右剉散每服四錢水煎服○妊婦傷寒身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩○躁大渴加知母石膏各半兩○水停心下微吐逆加猪苓茯苓防己各一分○腹脹加厚加枳殼各一分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○秘澁加大黃半兩桃仁一分炒○嘔加白朮人參各半兩○虛寒狀類傷寒加人參柴胡防風各三分○因熱生風加川芎柴胡各半兩○因虛致熱七與血搏口舌乾渴欲飲水者加栝蔞根一兩麥門冬三分○腹中刺痛惡物不下加當歸赤芍藥各一分

[illegible] 治妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗

葱白十莖　生姜三兩　剉散水煎熱服連進取汗

[illegible]散 治妊婦傷寒頭痛憎寒壯熱身痛項強

蘇葉　川芎　白芍藥　白朮　陳皮

乾葛　甘草　麥門冬

剉散每服四錢姜四片葱白三莖煎熱服

[illegible]散 治妊婦傷寒感冒風邪發熱頭疼咳嗽声重涕唾稠粘解肌熱寬中快膈寒熱往來宜服

方見前

白朮散 治妊婦傷寒安胎　白朮　黃芩

為末每服三分姜三片棗一枚煎溫服但覺頭疼發熱便可服即差若四肢厥冷陰証見者不可服

前胡湯 治妊婦傷寒頭痛壯熱肢節煩疼

石膏一兩　前胡半兩　竹茹　黃芩　知母
梔子　大青各三分
剉散每服五分姜二片葱白三寸煎溫服
阿膠散 治妊婦傷寒先以此藥安胎次治其病
阿膠炒　桑寄生　白朮　人參　白茯苓等分
為細末糯米飲調下二錢七日二服
蘇木湯 治妊婦傷寒或中時行疫癘淅淅作寒振慄而悸
赤芍藥　陳皮　黃芩　黃連　甘草
蘇木各等分
剉散每服五錢水煎溫服汗出差若胎不安兼服阿膠散
黃龍湯 治妊婦寒熱頭痛嘿嘿不欲飲食脇下痛漚逆痰氣及產後傷
風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解
柴胡　黃芩　人參　甘草各等分

剉散每服五錢水煎溫服
柴胡石膏湯 治妊婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛背項拘急口
乾燥　柴胡四兩　石膏八兩　甘草二兩
剉散每服四錢姜五片煎溫服若氣虛体冷加人參五兩
麥門冬湯 治妊婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思食胎氣不安
人參　石膏各二兩　前胡　黃芩七分半　葛根
麥門冬半兩
剉散每服五錢姜四片棗一枚淡竹茹一分煎溫服
梔子大青湯 治妊婦發班麥黑色及尿血
大青　石仁　黃芩　升麻　梔子仁
剉散每服五錢葱白三寸煎溫服
柴胡湯 治妊婦熱病骨節煩疼頭痛壯熱若不治熱則並胎
柴胡　家葛根　知母　梔子仁　甘草半兩

石膏一兩　大青　黃芩　升麻各三分

剉散每服四錢葱白三寸煎熱服與前胡湯同

秦艽散 治妊婦時氣五六日不得汗口乾渴狂言嘔逆

秦艽　柴胡　石膏　前胡　赤茯苓

甘草　犀角　家葛根　升麻　黃芩

剉散每服四錢姜三片淡竹茹一分煎溫服嘔加姜汗

毒散 治妊婦傷寒時行發癘

方在前（五十六）正方內

葛根湯 治妊婦熱病壯熱頭疼嘔吐不止不下食心煩

人參　竹茹　家葛根各一兩　蘆根二兩　麥門冬一兩

知母三分　剉散每服四錢葱白三寸煎溫服

金膏法 治妊婦時氣身大熱塗之令子不落

伏龍干為末

水調金膏下方四寸乾則易差乃上酒調泔清調皆可

葛根湯 治妊婦發熱煩悶

葛根濃煎湯汁每服一小盞如人行五里又進一服如无生者用乾葛亦得妊婦藥用葛根乾葛須用家園葛晒乾用不可使山葛能動胎氣

養胎湯 治妊婦瘧疾寒多熱少或但寒不熱脉弦遲者

方見前補遺內

清脾湯 治瘧熱多寒少但熱不寒脉弦數口渴妊婦者

方見前補遺內

婦人產後傷寒方

五積散 治婦人產後一二日因感冒寒邪憎寒壯熱頭疼身痛无汗

方見前（百七十八）正方內除麻黃

陽旦湯 治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時發熱心下堅

乾嘔汗出

方見前百六正方內

荊芥散 治婦人產後傷寒血虛多汗變成痓証身体強直口噤背反張如中風狀又治血暈

荊芥末每服二錢溫酒調下仍依傷寒痓証同治

增減柴胡湯 治婦人產後虛羸發熱食少腹脹或往來寒熱

柴胡　人參　白芍藥　半夏　甘草

陳皮　川芎

剉散每服四錢姜三片棗一枚煎溫服日三

小柴胡湯 治婦人產後亡血汗多故令鬱冒脉微弱不食大便堅頭汗所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥狐陽上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也

方見四十三正方內

治婦人產後寒熱往來心胷煩悶骨節疼痛頭疼壯熱日晡加甚又如瘧狀

黃耆五兩　生地黃一斤　蜀漆葉　桂心　甘草

黃芩各一兩　知母　芍藥各二兩

剉散每服五錢水煎溫服

竹葉防風湯 治婦人產後傷風發熱面赤喘而頭疼

竹葉半把　防風　人參　桂枝　桔梗

甘草各半兩　葛根一兩水

剉散每服四錢姜三片棗一枚煎溫服使汗出差○嘔者加半夏○頸項強者加附子

黃芩湯 治婦人草蓐中傷風四支苦煩熱頭疼與小柴胡湯頭不疼但頭者

黃芩半兩　苦參一兩　乾生地黃二兩

剉散每服四錢水煎溫服

旋覆花湯 治婦人產後傷風感寒暑溫咳欬氣喘痰涎壅盛發熱坐卧不安

旋覆花　赤芍藥　前胡　半夏　荊芥

甘草　茯苓　五味子　杏仁　麻黃各等分

剉散每服四錢姜棗煎溫服有汗去麻黃

小兒傷寒方論

論小兒傷寒與大人治法一般但量兒歲數壯幼分劑藥減少耳無求子論小兒傷寒言之已詳此則載其大畧

惺惺散 治小兒風熱及傷寒時氣或瘡疹發熱

桔梗　細辛　人參　白朮　甘草

瓜蔞根　白茯苓　川芎各等分

為末每服二錢姜二片薄荷二葉煎服三歲已下作四五服凡小兒

[illegible]傷寒風熱與此往往必愈

[illegible]湯 治小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒

麻黃一兩　黃芩半兩　赤芍藥半兩　甘草　桂枝各二錢半

為末每服一錢或二錢煖湯調下

[illegible]湯 治小兒傷風有汗頭疼發熱惡寒

升麻　葛根　黃芩　白芍藥三錢　甘草一錢半

剉散每服水煎溫服瀉者不可服時行痘疹未見疑似之間可服已見者便不可服

[illegible] 治傷寒壯熱口渴及胃中客熱口臭不食飢煩不欲食齒齦腫痛咽舌生瘡赤眼瘡疹及痱熱瀉渴

天門冬　麥門冬　熟地黃　枇杷葉　枳殼

生地黃　山茵蔯　黃芩　石斛　甘草

剉散每服二錢水煎溫服亦可加車錢子灯心

連翹散 治小兒一切熱

連翹　防風　甘草　梔子各等分

為末每服一錢水煎溫服

人參散 治小兒天行壯熱欬嗽心腹脹

人參　甘草　麥門冬　生地黃

剉散每服二錢茅根半握煎溫服

麥門冬散 治証同上

麥門冬三兩　甘草　人參一分　紫菀　升麻二兩

貝母一分半

剉散每服二錢茅根半握煎去滓再入竹瀝少許重煎服

脫甲散 治小兒傷寒躰熱頭目昏沉夾驚夾食寒熱煩躁口渴無汗自汗次積傷滯膈滿脹急日夜大熱及傷風傷暑驚癇客忤痢氣等熱[illegible]

[illegible]服之

柴胡　當歸　龍膽　知母各三錢　人參

白茯苓二錢半　川芎各一錢　甘草炙四錢　麻黃去節二錢又根一錢

為末每服一大錢連鬚葱白一寸煎溫服

大連翹飲 治小兒傷寒傷風發熱時行發熱痰盛壅風熱丹毒瘡疹項上生核頸赤癰瘤一切發熱並宜服之

連翹　瞿麥　滑石　車前子　牛蒡子

赤芍藥一兩　山梔子　木通　當歸　防風各半兩

黃芩二兩半　柴胡二兩　甘草　荊芥各兩半　蟬退二錢半

剉散每服二錢灯心薄荷麥門冬煎溫服瘡疹加紫草煎

梨蜜飲 治小兒潮熱積熱瘧熱一日一發或兩日三日一發脾積寒熱

青蒿取花頭及葉用童子小便浸一宿日乾　柴胡

人蔘　黃芩　前胡　秦艽　甘草各等分

剉散每服一歲兒半錢兩歲一錢用生梨一片梨條汁可薄荷一葉

生地黄一寸生藕一小片同煎温服

辰砂五苓散 治小兒五心煩热焦躁多哭咬牙上攛欲為驚狀每服半錢金銀薄荷湯調下 方見前

正德戊辰孟冬
德新書堂重刊

類編傷寒活人指掌圖續方卷之十 終