是非紛亂性命之寄危於風燭矣此乃總說詳見三卷各本條中

類傷寒証

活人書云痰証食積虛煩脚氣其疾發作與傷寒相似實非傷寒也所謂朱紫相陵玉石不分醫者處病滅裂更不看驗見其發熱惡寒往上作傷寒治之發汗吐下因茲夭橫者多矣

類編活人書括大全圖論卷之一

傷寒證類活人書括指掌圖論卷之二

雙鍾處士李知先 元衆 詞括

錢塘吳恕 蒙齋 圖說

鼇峰熊宗立 道軒 類編

三陰三陽脉詞一首 人身本有手三陰三陽足三陰三陽共十二經傷寒只傳足六經故詞中止言三陰三陽不專手六經也

陽屬膀胱并胃膽陰居脾腎更連肝浮長弦細沉微緩脉証先將表裏有

足太陽膀胱其脉浮 足陽明屬胃其脉長 足少陽屬膽其脉弦 足太陰屬脾其脉細 足少陰屬腎其脉沉 足厥陰肝其脉微緩

三陰三陽詞三首

發熱惡寒身体痛太陽 目疼身熱鼻中乾陽明 耳聾口苦咽乾燥寒熱往來脇下堅少陽

太陽傷寒无汗加麻黃湯中風有未桂皮湯 傷寒鬼風傷風鬼寒大青龍陽 陽明

無汗惡寒 [illegible] 有汗微惡寒 [illegible] 無汗脉浮其人喘 [illegible] 不更衣者謂不大便也內實大便難外證身熱汗自出不惡寒反惡熱 [illegible]

[illegible] 少陽一証並屬 [illegible]

手足何溫時腹痛利而不渴藏家寒 太陰 脉沉惡燥元關腎引飲咽焦津液難 少陰

太陰自利不渴者藏寒也 [illegible] 腹滿脉浮者 [illegible] 浮脉屬表所以用桂枝也腹痛者 [illegible] 痛甚者 [illegible] 脉大胷滿多痰者吐之 [illegible] 若下之必胷下結滿堅鞕 [illegible] 大抵傷寒手足必冷若自溫者屬太陰也 少陰口燥舌乾者急下之 [illegible] 若不渴不口燥舌乾而脉沉者急溫之 [illegible] 口中和而背惡寒宜 [illegible] 少陰証若小便色白者病形悉具也 [illegible] 尺寸脉俱緊而反汗出為亡陽法當痛 [illegible] 脉沉 [illegible]

[illegible]

厥陰之脉循陰器筋急唇青四躰疼舌卷耳囊裏縮不逢戢者少痊安 厥陰

厥陰脉浮為欲愈不浮為未愈 [illegible] 脉浮緩而知瘧狀者必裏不縮為欲愈也 [illegible] 丁具沉短者必裏縮毒氣入藏也宜 [illegible] 消渴氣上衝心心中疼熱 [illegible] 飢而不欲食 [illegible] 即吐既此名蚘厥胃冷也 [illegible] 或用 [illegible] 下之利不止 [illegible] 及別蚘厥一條詞括 [illegible]

表裏詞一首

發熱惡寒身体痛脉浮屬表要君知若不惡寒反 [illegible] 惡熱汗多屬裏定無疑

一十六証傷寒詞 [illegible]

○一傷寒（脉浮而緊者皆緊爲傷寒濇主无汗濇者皆出少証主手足決冷）脉浮緊澁如何斷緊是傷寒澁無汗忽然有汗是傷風其脉必定浮而緩

傷寒無汗惡寒（脉黃湯）有汗惡風（桂枝湯）熱多寒少清便自可（桂枝麻黃各半湯）

熱多寒少脉弱者無陽也（桂枝二越婢一湯）熱多寒少而尺脉建者血少也（黃芩建中湯）當汗而其人失血及下利者煩與少（桂枝湯）淋家　衄家　瘡家　虛家皆不可汗也（小柴胡湯）

○二傷風（脉浮而緩汗自出外証手足微溫傷風惡風不惡寒微云不相同也）

傷寒惡寒不惡風傷風與此不相同傷風面色光不慘若是傷寒慘在容

傷風有汗惡風（桂枝湯）桂枝湯惟春初可行自春未及夏至以前可加黃芩半兩名（湯曰傷）夏至後加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒者不用加減　或用（肢毒散）項背強者（桂枝加葛根湯）不

[illegible]者謂之裏寒（桂枝去芍藥加附子湯）傷風脉浮緩自汗（桂枝湯）若緊而汗者不可服桂枝也當用剔（建中）

○三傷寒見風（外証是傷寒而脉是傷風也脉主浮而緩）

外証寒多還少熱不煩手足微微厥此是傷寒復見風脉緩而浮無別說

傷寒見風風則傷衛寒則傷榮桂枝主傷衛麻黃主傷榮大青龍主榮衛俱傷也煩躁則用（大青龍湯）不煩躁者（桂枝麻黃各半湯）

○四傷風見寒（外証是傷風而脉是傷寒也脉主浮而緊）

手足微溫莫誤看惡風發熱更多煩若還脉得浮而緊便是傷風復見寒

傷風見寒（大青龍湯）脉似桂枝而無汗病似麻黃而反煩躁是也脉若緩而有汗者（桂枝湯）脉緊不煩躁者（麻黃湯）

○五風濕（脉亦浮濇浮濇主風也廣濟方本附湯主之裏証云脉浮濇而濇大便雖小便利也活人述本附湯証與此證）

風濕相搏脉濇浮額上微〻汗欲流身腫喜衣難轉側此名風濕是因由

風濕欲微發汗但濈〻身潤則風濕皆去若大發汗則風氣去而濕氣在焉麻黃杏子意以甘草湯防己黃芪湯[illegible]不嘔不渴脉虛浮濇桂枝附子湯[illegible]小便不利甘草附子湯[illegible]小便自利木伯湯[illegible]身体痛惡風微腫舌亡湯[illegible]通用敗毒散[illegible]信效方用五苓散[illegible]

○六中濕

其脉沉緩為中濕只緣風雨蒸氣襲一身盡痛及身黃大便反快小便澁

中濕小便自利木伯湯[illegible]小便不利大便反快甘草附子湯[illegible]

○七濕溫溫濕之脉陽濇而弱陰小而急

其人溫氣素來傷暑氣重傷病愈昌多汗妄言双眩冷溫溫當辨[illegible]

溫溫不可發汗發汗則死名曰重暍醫殺之也宜木附湯[illegible]

濕病圖

風濕　濕痺　濕溫

風與溫氣相搏太陽病關節疼痛○其人傷溫因雨不時山澤蒸氣因冒服体痛重不可而煩脉沉而細名而中暑名曰溫衣之苦但中其溫一身轉側額上微汗溫痺小史不利大溫濇脉逆冷胃及痛則以燥勝如素有不欲去衣被身便反快當利小便滿頭目痛妄言其溫又中於風是為風微腫不可大汗五苓散[illegible]但可取微汗脉小便自利者木附多汗其脉陽濇溫則當微表以去風行黃芪子黃芪湯[illegible]風濕寒而弱陰小而急燥以去溫又風寒溫草湯[illegible]防合而為痺身重汗者合而為痺亦麻痺已黃芪湯[illegible]出惡風痛極如歷恢苓白朮湯白仁當先利小便如素有[illegible]甘草附子湯[illegible]防已黃芪湯[illegible]其溫又中於暑是為溫[illegible]身体痛[illegible]溫下之[illegible]木湯勿[illegible]溫故多自汗以白虎去[illegible]脉浮惡風微額上汗出微喘小不可發汗汗之暑木附去溫石重汗之[illegible]腫不七湯[illegible]便利者死下利不名重暍必死是虛其虛乃醫之過也[illegible]止者亦死

○八風溫脉浮又云陽脉浮滑陰脉濡弱外証多汗若發汗後猶灼熱者名風溫主四肢不收也平金云風溫之病出陰陽俱浮發汗則譫言加溫針則耳聾唯言下之則小便難吐下則大便利並麥蕤湯

風溫為病古今傳喘息昏昏但欲眠身重脉浮常汗出更加發汗必譫言

風溫發汗後身猶灼熱者名風溫不可發汗發汗者死醫殺之也宜麥蕤湯[illegible]身灼熱者知母乾葛湯[illegible]渴甚者栝蔞根湯[illegible]脉浮身重汗出[illegible]已湯[illegible]寵安常葛根尤膽湯[illegible]証治論云風溫用小柴胡湯[illegible]未能了了者可[illegible]取小汗然不可大汗也

○九溫毒陽脉陰脉寸大

溫毒渾身似錦紋發斑癮疹嘔頻頻或時咳逆心煩悶冬感於寒發在春

溫毒黑膏[illegible]嘔清汗者葛根橘皮湯[illegible]

溫病圖

春溫

春傷寒為溫病脉數而大散似太湯發熱不惡寒同中暑煩渴不增寒先因冬月傷寒至夏至前發升麻葛根湯解肌湯熱多小柴胡湯發渴煩躁大便秘者大柴胡湯微利之脉實者方可

風溫

初感春溫發汗後身猶灼熱自汗喘息〻欲眠四肢不收名為風溫再汗之為逆必譫言不可下及燒針但可麥蕤湯熱甚者知母葛根湯小柴胡湯渴者栝蔞湯身重汗出漢防己湯

溫毒

多時觸冒寒邪至春始發痘初在表或已發汗吐下表證未解發為斑爛癮疹黃連橘皮湯葛根橘皮湯甚者黑膏

○溫之為病蓋以冬時得之熱輕故也所以自春止於夏至前也若夏至後則為傷寒熱病矣所治之法故不與傷寒熱病同但可以中和之劑輕於解散為佳若施汗吐下之法太峻則反變異矣所忌者風溫切不可發汗若汗之為大逆多不可救也

○十中暍 脉虛而微弱也蓋熱傷氣而不傷形所以脉虛形亦作血字甲乙巫云脉盛或寒得之傷寒脉虛身熱得之傷暑

夏月自汗名中暍脉虛微弱多煩渴面垢背寒身不疼外證大綱同病熱

中暍手足微冷煩渴四支不痛 白虎湯 痰逆惡寒 橘皮竹茹 不惡寒 竹葉石膏湯 頭疼惡心煩躁心下不快 五苓散 霍亂吐瀉 香薷散 信效方中用 小柴胡湯 依常法煎候極冷服之又曰太陽中暍其脉弦細芤遲小便已洒然毛聳口前開板齒者 白虎加人參湯 又問中暑何故洒然毛聳口開腠理司開闔寒則皮膚急腠理閉熱則皮膚緩腠理開七則洒然寒閉則熱而悶

中暍

太陽

太陽中熱者暍是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人參湯

煩熱

煩渴小便不利及三也面垢四也但不惡寒不身痛為中暍

○中暑有四候自汗一也煩渴二也脉虛三也面垢四也但不惡寒不身痛為中暍

圖

太陽中暍發熱惡寒身重痛脉弦細芤遲小便已洒然毛聳手足冷勞即熱開前板齒燥白虎加人參湯 湯 中暑發熱不惡寒 竹葉石膏湯 昏憒不省葱餅熨法

手足雖冷脉雖虛不可用熱藥當以清暑之劑及利小便為佳

○十一熱病 晚發第十三附無調

脉洪盛也蓋寒傷形而不傷氣所以脉盛形字亦作血字

夏月得病名熱病本与傷寒同一證惡寒身痛及頭疼發熱仍兼脉洪盛

熱病有汗 桂枝湯 無汗 麻黃湯 煩躁 大青龍湯 夏至前發 陽旦湯 夏至後如傷風證中 桂枝口湯 知母石膏升麻也 三月至夏謂之晚發 梔子升麻湯

熱

有汗

頭疼身熱惡寒脉洪

無汗

頭疼身熱惡寒脉洪

○熱病与傷寒一也夏為熱病者以夏月時熱兩盛故於治傷

病圖

盛有汗夏至前陽旦盛無汗夏至前則後麻寒柔內加以寒涼解其
湯夏至後桂枝加知母石膏湯元內外之煩毒蓋桂枝
母石膏升麻湯元無汗煩躁大青麻黃其性頗熱不加
熱毒未盛有桂枝石龍加黃芩湯元夏寒涼之劑則有黃斑
膏湯元月熱盛龍骨牡蠣子升麻湯元之變也

○十二溫病脈仍太陽而燥渴言浮緊也証同中暑不惜寒但英
熱也結人書寒入卷發熱同中云發熱而渴不惡寒
為溫病或云惡寒治之但有
證可參使得不必悉具有

溫病須當夏至前先因冬月中於寒頭疼發熱脈浮緊按法調停冠日
安

溫病升麻膏根湯元熱多者小柴胡湯元不渴外有微熱者小柴胡加
桂元虛煩者竹葉石膏湯元小柴胡去半夏加人參桂枝湯元發渴煩躁脈實
大便祕大柴胡湯元利之元嗽者小柴胡加子湯元

○十三晚發附熱病條无詳

○十四痙病一名痙病无汗惡寒曰柔痙万太陽又云大發汗惡寒曰剛痙有汗不惡寒
曰柔痙万太陽又云大發汗惡寒亦剛痙

元來痙病屬膀胱口噤如彌身直張此是傷風感寒濕故分兩證有柔
剛

痙病無汗曰剛葛根湯元有汗曰柔桂枝加葛根湯元二痙並通用小續命湯
口噤脚攣咬齒大承氣湯元證治論柔痙桂枝結蔞湯元痙剛痙葛根
湯元

痙病圖

剛痙

太陽發熱無汗反惡寒脈
弦長勁急胸滿口噤卧不
着席脚攣急咬齒眼閉甚
則發搐反張此剛痙也葛
根湯麻黃葛根湯元元大使祕者大承氣
湯元

柔痙

太陽有汗不惡寒脈遲濡
細弦四体不收時或搐搦
則成痙外証發熱惡寒与傷寒
相似但項背反張強硬口噤如
發癇狀此為異耳並可用小續
命湯痙亦作痙之者強直義
陽痙即剛痙陰痙即柔痙陽
陽痙陰痙雖愈

○痙屬太陽經太陽中風又感
寒濕而然也又云大發濕家汗
則成痙外証發熱惡寒与傷寒
相似但項背反張強硬口噤如
發癇狀此為異耳並可用小續
命湯痙亦作痙之者強直義
陽痙即剛痙陰痙即柔痙陽
陽痙陰痙雖愈

○十五溫虐尺寸脉俱盛也尺為陰脉寸為陽脉此言陰陽脉者唯此

尺寸俱盛名曰虐先熱後寒相擊搏多寒必定脉弦遲多熱自然脉弦數

溫虐寒熱相等及先熱後寒者小柴胡湯頌躁小便赤澁素有瘴氣不伏水土嘔五苓散白先寒後熱小柴胡加多熱但熱者白虎湯多寒但寒者柴胡桂姜湯大便秘閉日發作之大柴胡湯下

○十六疫癘乃四時不和之氣人感之即成病矣其脉陽虛而弱陰弦而緊

四時疫癘會應難老幼調停揔一般夏責於心冬責腎季脾秋肺與春肝

疫癘春感清升麻葛根湯二百二十二夏感寒理中湯二百二十三射干湯二百二十四秋感熱白虎加蒼朮湯二百二十五冬感暖而病曰冬溫麥煎湯二百二十六四時通用敗毒散二百二十七土無正形因火而名當隨其經而取之也

疫癘圖

春	夏	秋	冬
春應溫而清氣折也責在肝或身熱頭疼目眩嘔吐長幼率皆相似升麻葛根湯二百二十八 解肌湯二百二十九 四時通用敗毒散二百三十	夏應暑而寒氣折之則責邪在心或身熱頭痛腹滿自利長幼率皆相似理中湯二百三十一 射干湯二百三十二 半夏桂甘湯二百三十三	秋應涼而大熱抑之則責邪在肝濕熱相搏民多病瘴欬嗽喘急金沸草散白虎加蒼朮湯病二百三十四 瘴發黃茵陳五苓散二百三十五	冬應寒反大溫抑之則責邪在賢民病咽痛或生赤疹喘欬挛痛委蕤湯升麻葛根湯咽痛者甘桔湯敗毒散二百三十六

○疫癘者又非溫病之比此皆寒暑不調四時不正之氣是以一方之內長幼率皆相似謂之天行時氣治法與傷寒不同又不可拘於日數仲景曰疫氣之行无以脉診蓋隨時以施治也以平為期不可過取四時之中土无正位分居四季當隨其經而取之

○傷寒兩感謂三首兩感之証有自利者有不自利者有下之利不止者

傷寒兩感半陰陽初病頭疼不可當煩滿口乾多好渴元來是腎與膀胱

二日陽明與太陰渾身壯熱可憂心妄言不食腹中滿脾胃相兼病已深

三日肝經與膽經少陽還與厥陰并水漿不入渾身厥囊縮兼聾命欲傾

半陰陽者言病一半屬陽一半屬陰也龐安常云脉沉大者太陽少陰沉長者陽明太陰沉弦者少陽厥陰也諸方書不說兩感脉安常特設以示後人素問热論云兩感於寒而病者必不免於死法不過六日黃帝曰有三日而死者何也岐伯曰陽明者十二經脉之長也若三日而氣盡則死矣仲景亦無治法活人書五卷序云傷寒惟兩感不治仲景但一說云兩感病但作治有先後証治論引張眞說與仲景同謂如下利清穀身体疼痛當救裏宜四逆湯身体疼痛當救表宜麻黃湯便自調急當救表宜桂枝証治論并活人書解仲景治有先後之說皆云治有先後者但先救裏內經溫則可賢矣然救表亦不可緩也以上所論並先救裏然後救表愚意消息謂如下利不止身体疼痛則先救表如不下利身体疼痛則先救裏此亦謂之治有先後也

○兩感者乃陰陽雙傳也膀胱與腎為表裏一日傳之頭疼身熱煩滿而渴其脉沉而大胃與脾為表裏二日傳之身熱舌乾妄言不食中滿不睡其脉沉而長肝與膽為表裏三日傳之耳聾囊縮厥逆水漿不入口其脉沉而弦三日而死再傳止於六日矣故仲景无治法但云下利清穀身体疼痛急當救裏宜四逆湯身体疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯又云治有先後則知先救裏內才覺溫急當救表是或有可生之理但不能必類傷寒四證

兩感圖

太陽表
少陰裏

陽明表
太陰裏

少陽表
厥陰裏

雙傳

一痰証寸口脉浮滑寒壯熱惡風自汗胷膈痞滿氣上衝咽故不得息但頭不疼項不強也而頭疼膝中云非次頭疼與作病以此論之痰涎亦有頭疼証宜更以他証參之可也

二食積右手關脉數左手脉平和是也故曰人迎緊盛傷於寒氣口緊盛傷於食外証發熱惡寒但身不疼痛為異耳

三虛煩脉不緊數不頭疼不身痛但煩熱者是也

四脚氣頭疼身熱支節痛大便祕或嘔逆胸痛弱轉筋惡聞食氣

○痰証謌一首

痰証頭身都不痛發熱憎寒汗惡風寸口脉浮胸痞滿咽喉難息氣來冲

中脘有痰亦令人憎寒壯熱胸滿以傷寒但頭不疼項不強為異耳宜柴胡半夏湯（百五三）金沸草散（二百一）大半夏湯（百一五）三陳湯溫膽湯見和劑局方

○食積謌一首

食積惡寒而發熱吐逆頭疼氣口數左脉平和身不疼即此可知其端確

此証由脾胃伏熱因食不消發熱以傷寒却身不痛人迎脉平和為異耳若膈實嘔吐食在上脘宜瓜蒂散吐之（二百二十五）心腹滿痛天梁甲湯下（四十二）及用治中湯（百五四）五積散（四十三）或治中湯五積散吞青木香丸見局方

○虛煩謌一首

虛煩不過熱煩耳不可太攻恐寒起頭身不痛不惡寒脉不緊數此為異

煩熱証虛與傷寒相似不可汗不可下如此者內外皆不可攻之必損竭多死宜竹葉石羔湯（八十六）或竹皮湯（二百二十六）虛煩不止用枝子升麻湯（八十七）白虎湯最佳（七十）嘔吐者大半夏湯如陳皮（百二十五）服涼藥後脉愈大而無力熱愈甚而躁渴者獨煎人參湯或煎人參黃芪湯下五苓散（百七十九）上盛下弱虛煩或自利竹葉湯去石膏和荷子各服濟湯傷寒汗吐下後虛煩不得眠梔子豉湯（八十八）驚悸痰盛虛煩溫膽湯見局方婦人挾血虛煩四物湯內加人參竹葉麥門冬甘草方見局方陰証肢節疼

痛內實外熱虛煩者陰旦湯

○脚氣論一首

脚氣証與傷寒似頭疼身熱大便秘肢節痛乍嘔逆兼脚或痿弱此為異人有此病多始足或先緩弱及疼痺（寒氣濕痺痛痺）者行起忽倒腫或腫小腹不仁或心悸舉脉轉急及即嘔吐或痛急膝枯細寒中三陽患必冷暑中三陰熱病起此患多因氣實但未有脉案至虛死脉若浮緩起於風宜汗濕而弱者濕家理（宜溫法）洪而數者熱中來（宜下）遲而濇者因寒始宜熨續命神功脾約佳取恩補劑及淋洗

此病因地之風寒暑濕皆作素氣足常履之逐成脚氣始得不覺因他病乃知若毒氣入心則小腹痛脾不仁令人嘔吐若不治之死在旦夕矣其人素有此証不時發作（小續命湯數味瓜蔞）寒中三陽所患必冷（越婢湯）暑中三陰所患必熱（小續命湯半夏湯）

子成封二半夏湯二方脚氣論有

半夏湯二方脚氣者

大便秘脾約丸

脚氣

外証惡寒壯熱惡傷食亦頭疼身熱諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒不頭疼身不痛為異

傷寒是不傳乎所以寒濕之氣蒸于足發則類傷寒其証頭疼身熱支節痛大便秘或嘔但初病時起於脚膝強弱不能移動為異且寒於寒所惡必冷越婢湯小續命湯入生姜汁最妙寸伏者以意參之二陳湯心腹痛痛感於看所患必熱小柴胡半夏湯金沸者大柴胡湯下之續命湯去附子減桂一半脚腫木瓜散損脚散大便秘脾約丸大三脚散

風自汗實痛氣上惡寒但左手關前衝咽不得息但頭人迎之位其脉平秘或嘔但初病時起於脚膝強弱不能移動為異且寒於寒所惡必冷越婢湯小續命湯入生姜汁最妙寸伏者以意參之二陳湯心腹痛痛感於看所患必熱小柴胡半夏湯金沸者大柴胡湯下之續命湯去附子減桂一半脚腫木瓜散損脚散大便秘脾約丸大三脚散

傷食

惡寒但頭人迎之位其脉緊盛知傷食也大橘皮湯

虛煩

不惡寒但頭疼身熱與傷寒相似但不惡寒不頭疼身不痛為異耳表既虛則不可汗裏不實則不可下可与竹葉石膏湯虛煩不止梔子升麻湯內寒外熱者陰旦湯和解虛煩有熱不可攻熱去則寒起正宜服竹葉石膏湯

類傷寒四證圖

○三陽合病謂一首三陽有合病而三陽不可不知也

三脉散　藥方並見前詩括內

傷寒合病脉浮長長是陽明浮太陽目痛鼻乾知屬胃陽明頭疼腰痛是膀胱太陽

少陽証具悉分明脉更浮弦屬兩經浮太陽弦少陽若是弦中有長脉少陽之病合陽明弦少陽長陽明

脉浮而長者太陽陽明合病浮而弦者太陽少陽合病弦而長外有少陽証者少陽陽明合病也浮太陽者太陽脉長者陽明脉弦者少陽脉太陽陽明脾約是也大便堅小便利者其脾為約脾約丸[四十二]惡寒者升麻葛根湯[八十二]不惡寒反惡熱大便不秘者白虎湯不惡寒反惡熱大便秘或讝語者調胃承氣湯下之[十八]太陽少陽脇下鞕滿往來寒熱及有餘証者並與小柴胡湯[四十三]少陽七明因發汗因利小便已而胃中燥實大便難也調胃承氣湯[六十八]正陽陽明病人本風盛氣實也三陽明無表証者俱宜下大柴胡[四十三]大小承氣湯[十六七]三陽明俱宜下惟惡寒中寒為病在經與太陽合病屬表可發汗麻黃湯[二十]

三陽合病

太陽与少陽合病自下利者黃芩湯嘔者黃芩加半夏生姜湯[七十四]

太陽与陽明合病喘而胷滿不可下宜麻黃湯[二十]

太陽与陽明合病必自下利葛根湯

太陽与陽明合病但嘔而不下利葛根加半夏湯[三十五]

陽明少陽合病必自下利脉長者為順脉滑而數者為負負者尅賊也脉滑而數有宿食可大承氣湯○三陽合病表裏有熱白虎湯[六十六]

三陽明合病

太陽 少陽 正陽

陽明

大便堅小便利脾約是也惡寒者升麻葛根湯（六二）不惡寒反惡熱大便不秘者白虎湯（七十）大便秘讝語者調胃承氣湯（六十八）

因發汗後或利小便已而胃中燥實大便難調胃承氣湯（六十八）

汗出不惡寒身重短氣腹滿而喘有潮熱者外欲解也可攻裏手足濈濈然汗出此大便已實大柴胡湯（四二）大小承氣湯（六十六七）

表証俱宜下之

三陽明惡寒与太陽合病可汗

○併病謌一首 併者譬如二人傳金併歸一家之義

太陽元与陽明病後併歸來作一家尚有太陽宜發汗太陽證罷下無差

太陽初得病發其汗汗先出不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒者是也若發大汗不出則陽氣怫鬱不得越散當汗不汗煩躁不知痛處其人短氣但坐此緣汗出不徹故也何以知之蓋脉濇也更以麻黃湯汗出之則愈（二十）

太陽證未罷 桂枝麻黃各半湯微發汗（十二）

太陽證罷但有陽明證者 大承氣湯下（六十六）

併病

太陽少陽併病心下痞而眩少陽也頸項強太陽也○太陽少陽併病心下硬頸項強而眩當刺大椎肺愈慎勿下之（二百二十九）

二陽併病太陽經未罷桂枝麻黃各半湯微發汗（十二）○二陽併病太陽証罷但發潮熱手足汗出大便唯嚴語承氣湯（六十六）

少陽不勝陽明不負木相尅為順負者失也少陽脉勝陽明脉負是鬼賊相剋為

併者始初二陽合病後則一陽氣盛一陽病衰歸併於一經也

太陽

水 水木順生

併 小柴胡湯（四十三）

水 水木順生

○少陽

少陽

木 木水逆生

併 麻黃湯（二十）

水 木水逆生

○太陽

太陽

小 傳其所勝

併 大承氣湯（六十六）

土 水土反剋

○陽明

太陽發汗汗出不徹轉屬陽明續自微汗出不惡寒若面色怫鬱痛无常處是陽明後併回太陽當與汗之麻黃湯

陽明

土 傳所不勝

併 名負

木 互相剋賊

○少陽

○狐惑謌一首 千金云傷寒不發汗變成狐惑

狐惑傷寒聲啞嗄唇口生瘡誠可怕上唇食藏下食肛醫師治療應無價

上唇生瘡虫食其藏或云喉曰惑下唇有瘡虫食其肛或云陰曰狐

通用 治惡桃仁湯 二百十四 黃連羣角湯 八十一 雄黃銳散 二百十七

狐惑

○千金方云傷寒不發汗變為狐惑又緣傷寒腹內熱飲食少腸胃空虛三虫行作求食蝕人五藏及下部為蠱其候齒无色並惡飲食面白乍赤乍白乍黑舌上白唇黑有瘡四肢沉重忽忽喜眠虫食其喉為惑其声嗄虫食下部為狐其咽乾甚者虫食其藏而死當看上唇有瘡虫食藏也下唇有瘡虫食肛也殺人甚急或因下利而得之狐惑者取其進退猶豫之義也

○蚘厥謌一首 治法藏三陰三陽謌厥陰証下

飢而不食名蚘厥食即因而却吐蚘此是胃中元積冷理中四逆及烏梅

蚘厥

○蚘厥者病人元有食蚘此為藏寒蚘上入膈故時或發煩頻更復止得食而嘔又煩者蚘聞食臭出其人當自吐蚘或因發其汗胃中冷故長蟲出又有胃氣困乏雖飢不能食比食到口蚘聞食氣而上虛寒併於胃中所以食與蚘并吐而出也厥者此屬厥陰又厥逆之義也仲景止用烏梅丸 百八十八 活人謂胃中虛冷先服理中丸亦佳 百四八 或用四逆湯 百八

傷寒證類活人書括指掌大全卷之二