V
G133.176
H85

類編活人書括指掌圖論卷之三

雙鐘處士　李知先　元象　訂括
鼇峯　熊宗立　道軒　類編

傷寒問答四十六証歌

咳嗽一首

往來寒熱胷中滿此証誠知嗽在陽（屬太陽少陽也）陰証嗽時頻下利四支沉重更清涼（屬少陰）

太陽証咳嗽（小青龍湯 小柴胡湯 四十五）少陽往來寒熱胷脇滿痛或泄利而咳嗽（小柴胡湯 四十三 或湯中去棗子 人參加五味子乾姜 四十八）少陰四支厥逆腹中痛或泄利而咳嗽（四逆散加五味子乾姜 百九）少陰證咳嗽（真武湯 百三十九 四逆湯 百八）四逆散（主少陰四逆或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利重者 百十二）嘔渴心煩不得眠（猪苓湯 百）二表未解心下有水乾嘔發熱而嗽（小青龍湯 二十八）小便不利小腹滿者（小青龍去麻黃加茯苓 四十）

咳嗽

太陽少陽陽明雜證

太陽發熱而｜小青龍湯 二十八

太陽發熱嘔嗽而｜小柴胡湯 四十三

太陽証罷表未解心下有水乾嘔發熱而｜小青龍湯

少陽寒熱往來而｜胸脇滿或泄利小柴胡去棗人參加五味子乾姜湯 四十八

嘔渴而｜心煩不得服猪苓湯 百二十四

少陰

腹滿嘔洩浮弦欬｜潮熱小便難脇痛鼻乾不得汗嗜臥陽明中風也小柴胡湯

少陰四肢厥逆汗後傷水欬｜而喘而｜四逆散加五味子乾姜 百九

傷寒有發而｜大半夏湯 百二十五

少陰欬｜真武湯

○少陰欬｜四肢沉重小便不利或清利若太陽少陽在表之邪下利真武湯加

○肺為五藏華蓋猶覆釜之器專主於氣氣之清濁既分則元欬清氣不分濁腹中痛或溏泄欬矣或用杏子阿膠蓋欲分氣上干於華蓋加以傷水停飲肺不得清則為

療春冬傷寒秋夏傷寒五味子乾姜 百九

子乾姜湯 四十八

於肺氣則當發

嘔渴而｜心煩不得服猪苓湯 百二十四

少陰或欬或悸小便散而利若少陰証下利四逆散 百十七

傷寒法當溫之

寒證

熱證

失下

咳逆二歲一名二百活人書嵗逆兩字連呼是以嵗為咳逆也活治論千金方嘔逆動字連呼是以嵗為嘔逆也大抵嵗者皆謂逆也逆氣謂之咳逆之嘔逆

咳逆皆因胃有寒此名惡候古今傳橘皮半夏并姜附不差依方灸乳證橘皮湯姜湯 百三十八 茯苓湯 百三十九 半夏生姜湯 百三十八

不差即灸之婦人脹乳頭向下盡處脊間丈夫及乳小者以一指為率男左女右灸炷如小豆許三壯陷中有動脉是穴 證治論云嘔嵗手足逆冷者小橘皮湯 嘔嵗胃滿虛煩不安大橘皮湯 百六十九 百六十八

小柴胡主陽家嵗或用陳皮竹茹 陳皮竹茹 百六十 腹滿須看前後部備

灸承氣更相狗活人書云有陽證咳逆者小柴胡 橘皮竹茹湯主之 百六十

前後部乃大小便也前部不利猪苓湯 百二十四 後部不利調胃承氣湯 六十八 陽明中風脉弦浮小便難潮熱而嵗者小柴胡加芒硝湯 四十四 詳見小便條

○經曰趺陽脉浮鼻鳴氣滿脉滑則為嵗俗名乞嵗中氣不得神則

咳逆

脉微細｜｜者胃有寒搐皮乾姜半夏生姜湯羌活附子湯灸期門水寒相搏｜｜小青龍去麻枸附子湯

脉浮洪或有熱少陰失下證而｜｜者乃火熱奔急上行肺不得納放也耳章滔心湯

大便實小承氣湯

藥无效者硫黃鼠法

當溫之熱客于中氣不得伸則當逐熱以引之若胃有寒又飲以水水寒用傅而成咳逆則當溫之倘加以頭汗譫語腹滿微喘又見欬逆此危始甚矣

惡風三　一首

病人衛中八方風脉緩而浮是本宗自與傷寒分兩證不諶例作一般攻

桂枝湯

惡寒四　一首　憎寒即惡寒也

惡寒發熱發於陽陰病憎寒身躰凉解表桂枝并越婢溫中須索理中湯

發熱微惡寒者　柴桂枝湯　越婢湯　桂枝湯

惡寒脉下太陽或發熱或未發熱必惡寒有汗桂枝湯無汗麻黃湯陽明証俱宜下惟惡寒中寒係与太陽病也可汗麻黃湯自汗出多微惡寒者表未解也桂枝湯少陽頭汗出而微惡寒者小柴胡湯惡寒大綱多屬表惟少陰雖惡寒而脉必沉細也宜四逆理中輩以溫之四逆湯理中湯

少陰惡寒而踡下利手足溫者小建中湯惡寒而踡時〻自煩不欲厚衣大柴胡湯

惡

太陽

太陽發熱無汗｜｜麻黃湯發熱有汗｜｜桂枝湯

陽明雖有下証但｜｜者表未解也麻黃湯

少陽

少陽頭痛發熱｜｜小柴胡湯柴胡桂枝湯

發熱微｜｜柴

少陰

｜｜脉沉細少陰也四逆湯理中湯

少陰｜｜而踡

汗吐下後

汗後反｜｜虛也芍藥甘草附子湯

下利後｜｜而踡手足溫者小建中湯

吐下後七八日不解發熱而渴時時｜｜表裏俱熱白虎湯

大下後復發汗心下

○惡寒大率多屬表若無汗惡寒可發汗有汗惡寒可解肌經曰發熱惡寒發於陽也無熱惡寒發於陰也傷寒發熱惡寒太陽証也若無熱惡寒而踡脉沉而細此陰虛也方可溫之但微惡寒雖有裏証未可

寒

陽明脉遲汗出多微｜｜表未盡也桂枝湯（一）

胡桂枝湯桂枝二越婢一湯（十一）

時〻自煩不欲厚衣大柴胡湯（四十一）

痞｜｜無汗先用桂枝湯然後攻痞尺寸脉微而｜｜此陰陽表裏俱虛不可更吐下可小建中湯

遽下必當解表俟不惡寒方可攻也惡寒雖若尋常所係為甚重蓋以此別表裏不可不慎

背惡寒自有本條

身躰痛五　三首

脉緊而浮身躰痛太陽經病不堪任更兼中濕并風濕若是陰家脉帶沉

太陽脉浮無汗當以汗解麻黃湯（十）尺脉遲者血不足也黃芪建中湯（五十七）次第浮者麻黃湯（十）中濕　風濕各有本條陰家脉沉身躰痛附逆湯（百八）真武湯（百二十九）附子湯（百三十八）

清便自可身疼痛救表元來有桂枝若還下利多清穀四逆投之不必疑兩感條通

身如被杖名陰毒須向陰中調理之陰毒自有本條汗後有時加霍亂渾身疼痛脉沉之自有霍亂條

汗後霍亂身痛不休少与桂枝湯（一）汗後身疼痛脉沉遲者与黃耆建中陽（五十七）仲景桂枝芍藥人參湯（十一）

身痛

陽證

太陽脉浮｜｜無汗麻黃湯（二十）

汗後霍亂｜｜少与桂枝湯（一）

陰證

陰毒嘔逆下利｜｜如被杖衣暈面黑陰毒甘草湯四逆湯真武湯（百十八百八百三九）

汗後脉沉遲｜｜血不足也黃芪建中湯桂支芍藥半夏生姜湯（五十）（六）

濕證

中濕｜｜尽｜小便不利大便反快者甘草附子湯小便利者水附湯（百二十）

中濕｜｜小便不利五苓散（百九）太陽中風因而傷濕一身痛重麻黃加朮湯（六十二）

○太陽之痛但拘急耳中濕之痛不可轉側陰毒之痛体勢沉篤宛如被杖以此別之

咽喉六　資傷寒附一首

發斑唾血成陽毒自有本條陰證咽中必有瘡汗出陰陽俱緊滿法當咽痛號亡陽

陰證者少陰也陰陽脉俱緊主无汗有汗者曰亡陽屬少陰法當咽痛　治在自汗亡陽條　大抵咽痛桂枝湯百四十二　猪膚湯二百八十四　不問陰陽證皆可用也○證治論口瘡赤爛黃連清黃藥三汁又升麻六物湯百八十四　又有非時暴寒伏於少陰之經脉微弱而咽痛次必下利古方謂之腎傷寒先用半夏桂甘湯百四逆散一二日　次百四十二　當差應少陰經傷皆謂腎傷寒也亦多表裏無熱但苦煩憒默默而極不欲見光明有時腹痛或昧沉細舊用四順湯古人恨其熱不堪用云腎病而脉猶有熱者可服黃連龍骨百八十二　若已十餘日下利不止手足微冷无熱證者四順湯百四十二　諸方書中即不曾載黃連龍骨湯亦於黃連雞子湯去雞子加龍骨半兩也四順湯元即理中湯元中加甘草一倍是也四順元百五十二

咽

少陰有熱　少陰無熱　熱證

少陰腹痛脉沉細猶有熱者黃連汁升　少陰脉微弱而必下利先用半夏黃連汁升

○咽痛有寒有熱大陰之脉絡於咽證咽主應

痛

連龍骨湯八十二　麻六物湯百三　納受太陰脾土之氣邪熱乘之乃生咽痛若汗多下利虛而生熱亦能咽痛也

夏桂甘湯次用四逆散百四十三　麻六物湯百三　咽中閉塞不可下可為弱湯

脉陰陽緊主无汗有汗曰亡陽屬少陰法當下利不止手足冷陽脉應下反緩汗則惡寒赤爛

猪膚湯甘桔湯九百四十二　二百八百三

筋惕肉瞤七　一者腎上下左右有動氣者皆不可汗亦不可下詳見不可表條中

大凡發汗過多時筋惕身瞤此要知動氣左邊須忌汗若還發汗便難醫

俱屬真武湯百十四　羸甚者去芍藥惡熱藥或有熱證去附子虛弱人微發汗便有此証也　吐下後身振搖者茯苓桂枝甘草白朮湯百二十二　應發汗而動氣在左不可發汗發汗則筋惕肉瞤此為逆難治也且先服防風白朮

筋

桂枝湯百　次服小建中湯百十八

陽虛　動氣　逆證

太陽汗出不解仍發動氣在左不傷寒吐下後發汗

○內經曰陽氣者精則養神柔則養筋發汗及下後津液枯槁

惕肉瞤

熱頭服身瞤動[illegible]欲僻地真武湯虛甚者溫中去芍藥惡熱者去附子又可服茯苓桂枝甘草白朮湯 百二十八 百二十二

可發汗發汗則｜｜｜｜此為逆先服防風白朮牡砺湯次服小建中湯 百十七 百二十八

脉微心痞脇痛氣上衝能脉動惕此乃逆甚太陽汗下後復加燒針胷滿膚惕者為難治

陽氣大虛筋肉失所養故惕然而跳瞤然而動治以溫經益陽則可矣若犯其逆津液衰渴此危証也

傷寒無汗八 一首 冬陽明詳見瞤熱條 附陽詳見傷寒別名 剛痓三陰太陽共五証並各有本條

傷寒無汗分為七剛痓三陰與太陽冬病陽明皆係數下連陰易應尅罡

傷寒自汗九 一首 陽明証无汗附

九般汗自傷風始風溫風溫胃不和中暑亡陽并霍乱陽明柔痓亦同科

傷風 桂枝湯 二 若渴者 五苓散 百十九 若不渴者 茯苓甘草湯 百十九 若自汗出而小便難者 桂枝附子湯 六 自汗出而小便數者不可行桂枝也 芍藥甘草湯 百十九 風溫風溫 各有本條 衛不和病人藏無他病時發熱自汗是也 桂枝湯 一 中暑 自有本條 亡陽

凡發汗多而漏不上曰漏風亡陽 桂枝附子湯 [illegible] 又寸脉俱緊主無汗而反汗出曰亡陽屬少陰法當咽痛 桂枝曾湯 甘桔湯 百十二 四肢疼而厥逆惡寒者 四逆湯 百八 大抵陰病四肢逆冷額上及手背冷者法當無汗而有汗者曰亡陽 四逆湯 百八十 煩躁惡風汗出 防風白朮牡砺湯 百七十七 次服 小建中湯 五八 汗多不止者 溫粉撲之 百二十五 霍乱手足逆冷者 四逆湯 百八 有熱證而霍乱及中暑者 香薷散 二 信效多用 小柴胡湯 四十三 依常法前候極冷服之效 陽明汗多而渴者 調胃承氣湯 六十八 陽明法當多汗亦有無汗者不可不知也小便自利者不可用承氣湯攻之 宜蜜導法 二百二十七 惡寒者表未解 桂枝湯 一 反無汗惡寒者 升麻葛根湯 六十二 反無汗而喘者 麻黃湯 二十 柔痓 自有本條

太陽 陽明 中暑 陰證

發熱惡風｜｜太陽中風也桂枝湯若小便效者不可

陽明汗多而渴不大便者調胃

中暑霍乱｜｜內熱渴甚者白

陰証四肢逆冷有汗四逆湯發汗多遂漏不止

○經曰寒則傷榮榮脉受傷戰慄无汗无汗者當發表風則傷衛脉受傷緩弛自汗自汗者當實表實表多用桂枝然

自汗

行桂枝可考察其
草湯【百十六】
太陽病發熱汗■
細搐頭目眩身又
張汗出不惡寒者
柔痙太陽中風也
桂枝葛根湯通用
小續命湯【二】【百】
煩躁惡風一一不
得用防白术牡利
湯小建中湯
【百一七】【五八】

承氣湯【六八】
陽明一一
小便自利
此津液內
竭大便雖
硬不可攻
可蜜導煎
【二百七】

虎湯香薷
散小柴胡
湯苓服【二十】【百五十】
霍亂吐利【四十二】
一一手足
冷脈沉絕
不渴者四
逆湯理中
湯【百八】【百四五】

白通亦七湯桂枝
附子湯【六】
吐利止汗出而厥
脈微欲絕通脈四
逆加豬膽汁湯【三百二十四】
少陰小便白咽乾
嘔吐厥逆其一乾
姜湯【百十四】
汗多不止溫粉撲
之次服黃芪建中
湯【五十七】

桂枝須用詳細若脈浮
而弱服桂枝後煩而小
便數者不可再服逆伸
景云太陽病自汗四肢
拘急難以屈伸小便難
者可服桂枝附子湯若
小便數者慎不可與也
如表虛自汗及發汗過
多遂漏不止名曰亡陽
加茯苓之滿附子桂枝
黃芪不足以實之風溫
自汗自有本條

口燥咽乾十一首

病在陽經皆惡寒入參白虎咽乾柴胡專主少陽證若是陰家下即安

陽經者即陽明經也又一證無大熱背微惡寒並主燥渴白虎加人參湯【二十】

少陽【四十三】小柴胡湯　少陰證口燥咽乾而渴者急下之治在三陰三陽

譜少陰條　狐惑亦有咽乾證自有本條

口燥咽乾

陽明

陽明無大熱背微惡寒一一煩渴白虎加人參湯

少陽

少陽脈弦寒熱往來而嘔口苦舌乾小柴胡湯

少陰

少陰一一一一而渴急下之大承氣湯

咽乾者此津液枯燥慎不可發汗

若默默欲眠舌聲嗄咽乾者當作狐惑治之

○陽明燥渴此邪熱在胃緣土能制水故用白虎加人參滋津液求少陽邪在中焦口苦舌乾則以小柴胡和之若少陰熱在下焦銷鑠腎水當急下之不可緩也

寒熱往來十一一首

往來寒熱陰陽搏大小柴胡及桂姜結熱心煩仍喜嘔渴兼頭汗恰相當

結熱在裏大柴胡湯【四十二】心煩喜嘔胸脅滿不欲食小柴胡湯【四十二】渴而不嘔

頭汗出而痛胸脅滿小便不利柴胡桂姜湯【五十四】

寒熱往來

和解

心煩喜嘔胸滿不欲食小柴胡湯 四十三

少陽胸脇苦滿或泄而嘔小柴胡去參棗加五味子湯 四十四

渴而不嘔頭汗出小便不利胸滿小柴胡桂姜湯 四十五

不嘔清便欲發熱日二三次桂枝麻黃各半湯 十三

脉微惡寒而熱不可更發汗往支二越婢一湯 十四

如瘧

婦人中風續得寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧小柴胡湯 四十六

太陽証似瘧一日再發脉浮大者桂枝二麻黃一湯 十五

脉陰惡寒而熱不可瘧為欲愈桂支麻黃各半湯 十六

可下

經曰邪氣分氣則為瘧寒熱邪與陽爭反發寒邪與陰爭反發熱此半表半裏証也病至十餘日結在裏表証已罷方可下之余如不嘔清便日二三發小柴胡湯桂枝麻黃各半湯和解之然婦人熱入血室經水適來而胸脇滿經水適斷而續得寒熱謂有留邪必須治之如惡寒發熱經水適來至明慕昏如見鬼狀經曰邪犯胃氣交上二焦必自愈無經水斷發熱隨血去必自愈矣邪犯胃氣不可下犯上焦不必服小柴胡湯動胃氣也邪犯中焦不必刺期門動脾氣也

傷寒似瘧實難知脉大虛浮傷桂枝不嘔清便兩三發急投各半最宜

太陽證脉洪大浮者桂枝麻黃各半湯 十七

陽明證似瘧日晡發熱脉實者承氣湯 十八

陰發熱惡寒似瘧為欲愈桂枝麻黃各半湯 十九

脉虛者桂支湯 二十

故使似瘧小柴胡湯 四十七

婦人熱入血室其血必結

似瘧

經水適來

婦人中風發熱惡寒狀適來得婦人中風七八日續得寒熱之七八日热深脉浮身寒骨節痛如瘧發作有時經水適斷此結實狀譫語者此為熱當期門隨其實而瀉之 三十八

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈

經水適斷

陽明

○婦人熱入血室有三經水適來二條不言暴者蓋以經血方來熱氣來盛而入經血止則熱亦去矣故不可用汗下藥犯其胃氣及上二焦如其實而譫語此內實也刺期門以瀉之

若經水適斷續得寒熱其血必結故用小柴胡湯若陽明熱入血室此男子失血之証但當刺以瀉熱邪

發狂十三 二首 黑奴丸大渴漿盛吾常方可与不渴者与之則反為痼也

煩躁狂言仍面赤熱潮咽痛號重陽便於陽毒經中治壹壹升麻及大黃

萬壹若酒湯 百九七 陽毒升麻湯 百五十 黑奴丸 百九七 梔子仁湯 八十二 活人書第四卷六問中詳 袁

問云重陽者狂重陰者顛脫陽者見鬼脫陰者目直 壹壹

血證狂言或發狂 辰巳焦漱水遍身黃小便自利大便黑去血須還抵當湯

漱水謂漱水不欲下咽自有本源 又有因火刼驚狂謂之火邪其人亡陽煩躁卧起不安 金匱風引湯 躁煩加滑石 硬便 仲景云太陽病不解熱結膀胱其人如狂其血自下下者愈外不解者宜桂枝湯 一 急者乃可攻之 桃仁承氣湯 伏發黃門中血證狂治之

陽毒 畜血 火邪

陽毒狂躁發斑甚畜血下焦其人如狂火邪發狂見鬼神登高而歌棄衣而走踰垣上屋不知所以 ○經曰重陽狂登高而歌棄衣而走踰垣上屋不知所以 重陽 火

者踰垣上屋陽毒 汗厥湯 梔子仁湯 八十二 桂枝大黃湯 百 黑奴丸 百九七 少腹滿小便自利大便反黑病下焦 九 百五十 太易不解如狂躁其人如狂 桂枝湯 百 陽氣往勝陰氣衰 絕發躁狂走妄言面 赤唇痛發斑或下利 黃湯 百八 赤黃脈決實滑 狂宜用酸苦之藥令 陰氣復大汗解奏事 薏苡酒湯 百七 少腹滿硬 太陽身黃脈沉結少腹滿 陽明喜忘必有畜血屎黑硬其色 喜忘 ○血乃人身之河渠 流通則无疾滯則為患

陽毒狂躁發斑甚畜血下焦其人如狂 陽毒升麻湯 百五十 黑奴丸 百九七 梔子仁湯 八十二 活人書第四卷六問中詳 袁

問云重陽者狂重陰者顛脫陽者見鬼脫陰者目直 壹壹

血證狂言或發狂 辰巳焦漱水遍身黃小便自利大便黑去血須還抵當湯

漱水謂漱水不欲下咽自有本源 又有因火刼驚狂謂之火邪其人亡陽煩躁卧起不安 金匱風引湯 躁煩加滑石 硬便 仲景云太陽病不解熱結膀胱其人如狂其血自下下者愈外不解者宜桂枝湯 一 急者乃可攻之 桃仁承氣湯 伏發黃門中血證狂治之

陽毒 畜血 火邪

陽毒狂躁發斑甚畜血下焦其人如狂火邪發狂見鬼神登高而歌棄衣而走踰垣上屋不知所以 ○經曰重陽狂登高而歌棄衣而走踰垣上屋不知所以 重陽 火

者踰垣上屋陽毒 汗厥湯 梔子仁湯 八十二 桂枝大黃湯 百 黑奴丸 百九七 少腹滿小便自利大便反黑病下焦 九 百五十 太易不解如狂躁其人如狂 桂枝湯 百 陽氣往勝陰氣衰 絕發躁狂走妄言面 赤唇痛發斑或下利 黃湯 百八 赤黃脈決實滑 狂宜用酸苦之藥令 陰氣復大汗解奏事 薏苡酒湯 百七 少腹滿硬 太陽身黃脈沉結少腹滿 陽明喜忘必有畜血屎黑硬其色 喜忘 ○血乃人身之河渠 流通則无疾滯則為患

證

火邪

虛邪

傷寒脉浮以火迫之亡陽太陽中風以火劫之邪因火勢狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡砺龍骨救逆湯柴胡龍骨牡砺湯火逆下之因燒針煩躁變生奇草龍骨牡砺湯太陽汗下心下痞表裏俱虛之不得汗發躁不解必下清便復加燒針胸滿面青唇如噀者誰治色黃手足濕者可治

少陰劫刺語被火氣劫故也小便必難宜桂枝

小便自利人如狂血証諦黑抵當湯

也抵當湯傷寒有熱無表裏証發熱七八日脉雖浮數可下下不行初起畜血以為少腹滿應小便不利今反之微令已下脉數不解合熱結膀胱其人如狂血自下下者愈以抵當之利者有血也抵當丸

若為邪熱所攻折而利者有血也抵當湯

六七日不大便有瘀血也抵當湯

若吾泄熱瀉血也

實邪

○火邪者謂其不當用火而用之故謂之火邪凡傷寒汗不出服發汗藥至于再三發黃熱搏於內則小便難火而汗不行此津液內竭也其証固危若尋常汗証藥未至功而未剩尚可治也太陽以火熏汗不行遺以火迫於下劫奪取汗虛復加燒針胸滿面青唇如噀者名為火邪屋用地黃湯炎氣熏灼邪熱交併發為驚狂等証宜以汗解為火邪先從出病從腰以下則煩燥不已虛者直下必重而難治名火逆麻黃陽脫亡當量其虛實若亡陽宜桂甘草湯而解散之

脉浮无汗更加喘宜与麻黃屋属太陽若不惡寒知在胃汗多潮熱下何

常十四　二首

汗

無汗喘者麻黃湯有汗喘者杏桂枝湯

麻黃杏子桂枝湯加厚朴

太陽病汗之後不可行桂枝汗出而喘无大熱者麻黃杏子甘草石膏湯

麻黃杏子甘草石膏湯汗後潮熱不惡寒腹滿而喘者陽明胃經也宜下之承氣湯

承氣湯

陽明脉浮而喘無汗者汗之愈麻黃湯

陽明脉浮而喘無汗者汗之愈麻黃湯

汗後水停微發喘青龍加杏去麻黃二陽合病胃中滿只用麻黃按古方

青龍去麻黃

太陽汗後飲水多欬而微喘小青龍去麻黃加杏仁

小青龍去麻黃加杏仁

二陽合太陽之明也麻黃湯

麻黃湯

喘促脉伏而欬者五味子湯

五味子湯

麻黃豆二喘所以多用麻黃為之主也

緣

喘證

太陽

太陽先汗而一味黃湯。桂枝証醫反下之利遂不止脈促者表未解也一而汗出者葛根黃連黃芩湯 白四

太陽与陽明合病一而胃滿者不可下宜麻黃湯 白五

太陽汗之後不可行桂枝証醫反下之利腹滿一小青龍去麻黃加杏子湯 白六

太陽汗之後不可行桂枝証醫反下之利腹滿一小青龍去麻黃加杏子石膏湯 白六十

○太陽下之微一者表未解也桂枝加厚朴杏子湯 白六十一

微一小青龍去麻黃加杏子仁湯 白六十二

收一汗一微心煩者生姜汗半夏湯

陽明

陽明水飲汗後潮熱不惡寒一促脉伏而欬者五味子湯 白六十三

陽明汗出髮潤一不休者此為肺絕不可治

○傷寒喘只有太陽一明二証太陽身熱頭疼无汗而喘宜汗麻黃湯陽明汗出不惡寒而喘有潮熱者宜下太陽一明合病宜滿而喘則當先散表和故亦用麻黃湯至若飲水過多小便不利心下滿則以小青龍加減法行其水也若大便硬脉沉實腹滿不惡寒方可下若脉伏而欬喘促者此陰陽相背非吉兆也姑以五味子湯和之取其酸收耳設之意悟身汗如油喘而不休此為命絕矣

表不解

傷寒表不解心下有一乾嘔發熱者水結在中風發熱身熱內虛得水則消煩之若

裏

表裏

○水為至陰其性則寒病有內扣得水則消煩之若

水氣

扶帝欲飲水渴或利或嘔或不利小便而喘滿或頭汗出者大青龍湯 白八

頭汗出微喘小便不利而渴欲飲水煩躁者小青龍湯 白八

傷寒脈浮而心下悸者先以茯苓甘草湯去桂枝加白朮湯 白九

其熱波氏不得去所重在於脉而以治水法者茯苓甘草湯加桂枝白朮湯 白九

一藥起飲水反不渴又加微發熱一字

傷寒心下有一飲而喘熱无汗服桂枝湯已渴者與五苓散煩躁者與大青龍湯或欬嘔或小便利其脈 白九

渴十五 一首

太陽六脉浮而渴汗是陽明利少陰陽毒倍常兼中暑其人引飲喜杯深

太陽表不解心下有水氣渴者小青龍去汗夏加栝蔞湯 白八

太陽病服桂枝大汗出煩渴者白虎人參湯 白十

小便不利而渴者五苓散 白七十九

風濕渴者甘草湯

腸下滿手足溫而渴者小柴胡去半夏加人參栝蔞根湯 白十九

渴欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散主之 白七十九

陽明有汗不大便而嘔者上白胎而渴者小柴胡去半夏加人參栝蔞根湯 白十九

頭汗出而渴小便不利者必發黃 白五十

少陰咳而喘渴者不可與白虎湯宜小柴胡湯

陽明病汗多而渴不可與五苓散宜竹葉湯

便不利汗少脉浮者方可與五苓散

加人參湯

陽毒熏如丸

中暑白虎

渴證

內熱

脉浮發熱丨欲飲水吐汗下後已八日不解表裏俱熱惡風大丨舌上乾燥而煩丨小便不利諸苓湯小便不利而丨必發黃

燥欲飲水白虎加人參湯

汗後脉洪大而丨白虎湯

頃不得眠

便不利而丨必發黃

太陽服桂枝湯大汗出煩渴不解

猪苓湯汗

黃芩陳五苓散

○脉浮小便不利微丨白虎加人參湯

多者不可

熱消丨五苓散

中暑手足厥冷汗出煩渴丨四逆

○陽毒發狂煩躁大

脉不拘白虎加人參湯

丨潮熱咽痛黑斑丸

太陽色汗後下胃熱小便不利而丨往來寒熱心煩

小便

不大丨者不可与

柴胡桂枝湯

而丨小便

色白下焦

吐汗下後

少陰下利

液而燥二則手足逆

多耗奪津液而

之之法不過補其有

餘益其不足也陽虛

始傳三陽則未為變

傳三陰熱氣漸深焦

渴矣若病至六七日

而渴欲得水者可少

少陰

○渴之大率有二一則熱盡於內銷爍津

○陽明汗多而丨小柴胡去黃芩加人參栝蔞根湯

○半夏瀉心湯證惡風陽明汗多而丨小柴胡平夏加人參栝蔞根湯竹葉草龍麥湯

丸渴甚欲水不可絕

湯○風溫汗出而丨桂麥湯

之但勿令趨意也

霍乱十六一首

吐而利也轉筋附

四支拘急乃兼厥發熱憎寒四逆湯吐利止而身躰痛桂枝和解最為良

吐利止汗出而厥四支拘急脉微欲絕者通脉四逆加猪膽湯汗後霍乱身躰痛桂枝湯

熱多而渴者五苓散

寒多不渴者理中丸腹痛四支拘急下利

筋理中湯去木加附子

中暑霍乱四支冷汗出脉轉筋自有中暑霍乱

千金方云欲得水者皆用理中湯加石膏白虎

轉筋者猪食飲過度胃土不能勝加以陽盛於外陰生於內暑濕相搏陰陽交爭吐利並作渾霍亂乱邪在上焦吐而不利邪在下焦利而不吐邪在中

霍

熱證

吐利大渴煩躁冷汗吐利止汗出而厥不自出兩脚轉筋但尺脉微欲絕通脉四逆加猪膽汗湯

寒證

吐利止汗出而厥不欲水四支拘急脉微脉沉雖發汗足微厥欲絕通脉四逆加猪膽汗湯

此暑証丨丨也白虎膽

乱

加人參湯香薷湯五苓散七一百九十四
嘔利熱多而渴五苓散小柴胡湯冷服
但有熱証而｜｜者切不可用附子等燥熱藥如抱薪救火也止可用白虎湯及解暑藥亟冷服

汗後｜｜身体痛重者桂枝湯一
｜｜轉筋理中加石膏湯百四十
吐利寒多不用水者理中丸百四十五
乾｜｜者上不得吐下不得泄所傷之物不得出正氣隔絶多不可合

焦既吐且利所以此疾多生於醉飽盛於夏秋縱寒月有之亦猶伏暑而然脉候蚤沉手足蚤厥亦不可遽用熱藥若煩渴其者當以五苓散之類分利陰陽不得已而用溫藥當稍涼服之蓋邪熱遇熱亦相競也近世如守真用鹽元散治霍乱亦此義也

譫語十七　一首

譫語元来属胃家胃家若実下為佳三陽合病頻遺溺瘀血強言有等差胃實譫語　下利譫語並用調胃承氣湯六十六　大承氣湯六十六　小承氣湯六十七

或已得汗身和譫語柴胡桂枝湯百四十三　三陽合病口中不仁面垢譫語遺溺脉必滑実白虎湯七十　瘀血狂言小便自利大便黑小腹滿手不可近者抵當湯百四　發狂若黃脉水不欲無脉盛通　大抵譫語是熱属陽反見陰証者逆婦人熱入血室譫語則期明小柴胡湯喜忘小腹滿小便利抵當湯

血結胃滿　溫溫一証苦妄言自有本法　大便秘譫語不惡寒反惡熱白虎湯七十一

譫語

實熱

胃実｜｜下利｜｜並用調胃承氣湯大小承氣湯六十六　身熱四五日大便秘小便赤｜｜脊憤反発厥者陽厥也急用大柴胡湯大小承氣湯四十二　六十六七　大便秘｜｜不惡寒反惡熱白虎湯七十一　三陽合病腹滿身重難以轉側口中不仁面垢遺溺｜｜脉必滑実不可下宜白虎湯○火熱而致｜｜者亦用白虎湯

瘀血

瘀血狂言小便自利大便実小腹滿手不可近抵當湯○益夜｜｜喜忘小腹滿小便不利男子為瘀血婦人為熱入血室抵當湯一百四　瘀寒發熱經水過寒昏日明了暮則｜｜如見鬼状此婦人熱入血室連用小柴胡湯治之四十三　服湯遲熱入胃中上熱不常成血結胃状當利期門二百廿八

虛證

發汗多亡陽｜｜者不可下宜柴胡桂枝湯五十三　傷寒八九日下後胃滿煩驚｜｜小便不利身重不可轉側柴胡鬼骨牡蛎湯五五　濕溫妄言白虎加蒼朮湯七十二　下利直視｜｜喘滿者不治　已得汗身和｜｜者柴胡桂枝湯二

○譫語有実有虛実則易治虛則難愈実者胃熱上乘於心神氣昏乱語言訛謬及瘀血攻衝脉行大数劇則不識人當下之此為順虛者汗多亡陽或吐下之後重虛陽氣及風溫之証重於其汗以致陽脫陰勝又見沉微之脉此陽病見陰危殆必矣又有鄭声者非譫語也鄭声乃虛而声鄭重也當用溫藥治之若下利脉実溫者燥屎却當下之

下利十八　三首（三陽下利則身熱太陰下利手足溫少陰厥陰下利身不熱也）

傷寒下利多般數須辨陰陽勿差互惟有陽明合少陽若還尅賊名為負

腎虛下利苦咽乾（渴而利也此屬少陰）不渴誠知藏有寒（屬太陰）協熱（腸垢）胃寒（清穀鴨溏）并溫毒（膿血）利而讝語下之安（下利而[illegible]語者有燥屎也謂胃承氣湯）

太陽陽明合病脉浮大而長下利者（暑根湯三十）太陽少陽合病下利脉必浮而弦（黃芩湯七十三）嘔者湯中加半夏生姜也○少陽陽明合病下利胃脅滿乾嘔或往來寒熱也脉長大而弦者為負負者死但長大而不弦為順　脉數而滑或遲而滑者有宿食宜下（小承氣湯六十七）自利不渴屬太陰（四逆湯百八　理中元百四八）自利而渴屬少陰　脉微者（白虎湯七十一）厥逆脉不至者（白虎猪膽汁湯百四二　通脉四逆湯二百二四）咳而嘔渴心煩不得眠（猪苓湯百二四）三陰下利法當溫之若自利清水心下痛口乾燥者即宜下不可不知也　溫之四逆理中輩　下之大柴胡承氣也　三陽下利亦有飲水者乃有熱也（治如腸垢法）下利心中痞（自有痞而下利條）大便鞕結雖宜下亦有諸般不可攻腸垢鶩溏分冷熱不妨步躡古人蹤

華陀云寒即塘熱即垢古人云歲火不及寒乃大行民病鶩塘　應大便鞕結宜下之若有表証及不可下之証即依法調之（自有不可下條）腸垢即熱也協熱而利臍下必熱（黃芩湯七三白頭翁湯赤石脂丸二百十一二百九）鴨塘者寒也協寒而利臍下必寒（四逆湯百八　理中湯百四五）溫毒者膿血（桃花湯百八十三黃連阿膠湯七十七地榆散百八十九）

下

協熱

腸垢即熱也協熱而利臍下必熱黃芩湯白頭翁湯赤石脂丸自利而渴屬少陰白虎湯（七十）

協寒

鴨塘者寒也協寒而利臍下必寒四逆湯理中湯（百八）（百四十五）自利不渴屬太陰四逆湯理中丸（百四十八）

合病

太陽与陽明合病必自——葛根湯升麻葛根湯六二

太陽与少陽合

○雜病下利多因寒之所致傷寒下利多緣熱之所協蓋表感之邪欲傳於裏裏氣協熱遂成下利若下利黃赤渴欲飲水是為熱也若自利清穀不發煩渴方為寒也又下利身涼脉

利

欲飲而嚥渴 心煩不得眠猪苓湯 白二十四

少陰自利白通加猪膽汁湯 二百二十四

少陰下利不止 手足微厥無熱經四續知半夏生姜七九 一百五

少陰自利清水心下痛口中燥即宜下小承氣湯或大柴胡湯 大七四二

陽明少陽合病若陽明脉長利止胃實則生少陽脉則脉弦上微一者大柴胡湯 往來寒熱者

或小承氣湯謂有坐食也

脉弦而滑 病在胸滑 病在胸滑 脉弦而滑 病在胸滑 脉弦而滑 病在胸滑

脉高徐張湯 三百十一

脉數為負死經

少陰頭身熱脉大為逆又小便頻身熱脉大為逆又

三陽合病必自下利 桂陽 汗湯 二百二四

明少陽合病為甚重陽明為主少陽為本一氣不和

為下少陽為本一氣不和

陽明少陽合病若陽明脉則脉長利止胃實則生少陽脉則脉弦上

被本脉則死名曰負也又

自利者不可發汗又下利既極直視語頃語頃脉緊迫

无脉皆死候也

發

發黃十九 二二首 黃即辨也 辨即黃也

小便自利大便黑血證无疑定發狂若是小便全不利黃名瘅病瘅名黃

血證 紙當湯 百四 輕者 桃仁承氣湯 尺者地黃湯 百五入 黃瘅 茵陳蒿湯 五參散 九十六一首 九十七

太陽發熱渾身痛身目俱黃是濕家腹滿脉弦心脇痛陽明經裏中風邪

仲景云傷寒發汗已身目俱黃所以然者以寒濕在裏不解故也只

當以溫中求之自有 溫脉 發熱一身盡痛而身目俱黃者太陽中濕

也 腹滿鼻乾心脇痛潮熱身黃者陽明中風也 溫家 桃子 桃

黃連 赤小豆湯 白虎湯 欲發黃者忌用瓜蔕末一字許搐鼻中出黃水自愈 溫家 桃子 桃

抵發黃與溫家不利小便非其治也 腹滿脉浮弦咳嗽潮熱小便

難心脇疼短氣鼻中乾不得汗嗜卧此陽明中風也 小柴胡湯 喊者

湯中如決參也 見小便

玄田熱

頭汗出利頓而不渴小便不利四肢沉

引水漿 注也 茵

陳湯 茵陳五參散

脉沉浮大短三腹滿

陰黃

面無血下焦有人欲

往少腹滿或小便

不利大便黑屎下

痛抵當丸或桃仁

承氣湯 參者 茵

玄田血 中溫

○當汗不汗而生黃

當利小便不利亦生

黃天脾焉上其色黃

主於肌肉濕與相搏

於陽明經陽與之毒

土故應於肌肉間而

其色見也 猪膏

濕與熱鬱氣不得流

鬱而生黃病者溫

發

頭汗出利頓而不渴小便不利四肢沉

引水漿 注也 茵

陳湯 茵陳五參散

脉沉浮大短三腹滿

心脇痛鼻乾无汗發

卧身及目俱黃小

便難而發熱少陽中

參數得湯小便利

承氣湯 參者 茵

如皂莢汁則黃疸

地黃湯 黃疸

黃

畏也小柴胡湯(四三)小便赤也(百七)
大便自利而黃者傷冷中寒脉弱
茵陳梔子黃連三氣虛小便如常
物湯(七八)變為陰黃理中加
往來寒熱一身茵陳湯(百四)
盡痛小柴胡湯
加梔子(四三)

發熱一身盡痛身目俱黃太陽中濕[illegible]
赤小豆湯[illegible]初見[illegible]當散[illegible]
在內又宿穀未消[illegible]黃生失治之之法當泄熱去濕通利小便分導其氣則黃愈矣若蓄血狂言小腹滿硬按之則痛此血證明也故用抵當丸或抵當湯桃仁承氣湯

發斑二十一首

溫毒成斑肌肉焦黑膚一切毒須消若還熱毒乘虛出疹豆斑瘡別有條目(壹百六十三)

大抵發斑不可用表藥[illegible]其汗重令開泄[illegible]斑爛也

○咽痛[illegible]

下部[illegible]利[illegible]清汁脈赤[illegible]

發斑

[illegible]斑瘡豌豆[illegible]
[illegible]又方
[illegible]瘡出煩躁者[illegible]
證治論用化斑湯乃白虎加人參湯
[illegible]孫兆用紫雪方
[illegible]

陽毒

陽毒已深內外結熱[illegible]
[illegible]

溫毒

冬月太溫人受不正之氣至春發為斑爛[illegible]如錦紋者必出紫雪[illegible]

咽痛

[illegible]

○下之太早熱氣乘虛入胃故發斑下之太遲熱留胃中亦發斑也陽證熱藥過多胃熱焦爛亦發斑也發斑切不可表汗若汗之重令開泄更增斑爛也亦斑出五死一五生黑斑出十死一生或曰黑