深入斑發紫黑是毒皮湯傷寒五六日生瘡咳而下利斑出十無一生蓋熱陷於內不可治矣斑出猪膽雞子湯黃連橘湯丸毒氣入胃深故也

活人書括指掌圖論卷之三

類編活人書括指掌圖論卷之四

痞二十一 支結附 三首

滿而不痛名為痞枳桔頻投氣自寬桔梗枳殼湯也關上脉沉知審實若還浮者瀉其肝

結胸與痞關脉須沉若浮者為結熱當服三黃湯百三三以瀉其肝也 惡寒汗出者附子瀉心湯乃三黃湯中加附子也百三十二

下利心中痞結時瀉心服罷病愈期下焦有病人難會須用餘粮赤石脂

下利而心下痞服生姜瀉心湯百二十三甘草瀉心湯百三十而利不止者當治其下焦赤石脂禹餘粮湯三百十活人書論理中元并生姜甘草只治中焦者病在下焦須餘粮石脂也

結胸與痞皆應下表未除時莫妄投散痞三黃并枳實陷胸甘遂與瓜樓

表證未除者當先解表表解乃可攻痞活人書惡寒問中云傷寒大下後復發其汗心下痞而惡寒者表未解也未可攻痞當先解表表解乃可攻痞兩項事体一同　解表桂枝陽二　攻痞三黃湯百三三　外證未解心下妨悶者謂之支結關脈必浮宜柴胡桂枝湯五十三　胷脇滿微結者小柴胡加乾姜牡蛎湯五十二　發熱嘔吐下利汗出而痞者大柴胡湯下之四十二　表證罷身凉不惡寒汗出發作有時頭疼心下痞引脅乾嘔短氣十棗湯百八十一　發汗吐下後心下痞噫氣不除旋復代赭湯為根百六十六　有此證而或咳逆氣虛者先服四逆湯百八　胃寒者先理中元百四八　次服旋復代赭湯

痞

胷滿而硬

胷滿硬按之不痛為丨關脈沉者大柴胡湯四二　太陽未解而數下之遂協熱而利心下丨

胷滿而濡

胷滿而濡者半夏瀉心湯旋覆代赭湯　胷滿而濡小柴胡加乾姜牡蛎湯五二

支結

○疾發於陰下之太早為痞氣胷與痞雖同而異結胷為寒邪痞為虛靳也蓋表邪因下乘虛入於中焦但滿而不痛為虛靳也治之之法宜先用

滿

硬表裏不解桂枝人參湯八　心下丨硬引脇乾嘔短氣脈不浮十棗湯　心下丨硬惡寒汗出者附子瀉心湯百二十　下之後腹中雷鳴心下丨硬再下之丨益甚此虛氣上逆也甘草瀉心湯百三十

下之心下丨甘草瀉心湯生姜瀉心湯百三二　下利心下痞服瀉心湯利不止當治下焦赤石脂禹餘粮湯　表未解者先解表後攻痞宜桂枝湯　但丨滿胷膈不利者通用桔梗枳殼湯百七十二

百二十二　不滿不硬心下妨悶謂之支結小柴胡加桂湯五十　丨丨小便不利五苓散百七九

桔梗枳殼芎藭味通其氣表証未解者又當用桂枝解散然後用諸瀉心湯引而伸之直至表証俱先脈皆沉安惟痞滿未散方可用十棗湯之類泄之若氣上衝胷心中滿而硬可用大柴胡湯四二

結胷二十二　二首

脉浮者不可下宜先服小柴胡湯表解然後用下結胷芎藭也

傷寒本是三陽證下早因而有結胷陰證下之成痞氣依方調理有神功

結胷五種須分別大小結胷并水結熱實結胷煩躁多寒實結胷渾不熱

大結胷（大陷胷湯百二）論云此藥大峻不可輕用若不得已即用大陷胷元（百三）小結胷（小陷胷湯百二）水結胷（小半夏茯苓湯百二十一）小柴胡去棗加牡蠣湯（四十七）熱實結胷心下懊憹煩躁煩渴（太陷胷湯百二）寒實結胷（三物白散百八十二）相實理中丸百五十二

証治論云（諸結胷宜甚酌用藥不愈者增損理中丸百四十九）痞（桔梗枳殼湯百七十三）未成結胷急與（理中元百四八）若大段為醫轉損有厥逆証者兼與（四逆湯百八）婦人有血結胷此為熱入血室當刺期門穴與（小柴胡湯四十三）若喜忘小腹滿小便利屬（抵當湯百四穴載纖語條）

結胷

熱實

汗未解悞下之邪氣乘虛結於心下便滿而痛或喘為大——大陷胷湯（百二）汗已行未全解悞下之為小——小陷胷湯煩渴脉實

寒實

无熱証而結此寒實——也枳實理中丸三物白散（百三十二）太陰証下之胷必硬滿及用諸——藥不効者增損理中丸為醫轉損致厥逆証者四逆湯（四八）——手不得近用

血結

婦人有血——此為熱入血室當刺期門服小柴胡湯（四二）

水結

飲水不散而成水——小半夏茯苓湯

○病發於陽下之太早為結胷不按而痛陷之深也蓋表邪未除而遽下之邪氣乘虛客於胷中其病心下堅滿按之石硬而痛項強如柔痓狀其脉寸關尺皆沉大率者三黃瀉心湯（百三）——有熱証或煩渴嘔噦宜先服小柴胡湯解表寺藥戶可下——藥——脉浮者是表未解切不可用下藥

胷寺藥不効者枳實理中丸渴者加栝蔞下者加牡蠣（百五十）

風濕

血——喜忘小腹滿小便不利驚湯（百六）

小柴胡去事加牡蠣湯（百二六）

再用下之若脉浮是表未解下之必死又當先解而後故裏也大陷胷湯用藥煩燥可先用小陷胷湯或枳實理中丸分理中焦極為穩當

短氣

結胷

太陽病醫反下之煩躁——心中懊憹心下硬則為結胷大陷胷湯（百一）乾嘔——汗出不惡寒十棗湯（百八）

風濕

風濕相搏汗出——小便不利惡風不欲去衣茸草附子湯水停心下——五苓散（百七九）

○短氣者似喘非喘氣短不相接續也經曰微虛相搏則為短氣本虛証也如復滿潮熱及結胷短氣者則當散其實邪若水停心下可分而利之

煩躁二十三 一首 中關脉浮身熱而煩者本陽証脉也尺寸俱沉手足厥自利煩躁[illegible]乃少陰証脉也

陰氣勿忘為陽氣勝熱而煩躁太陽經少陰亦有煩躁者此是陽虛陰所乘

太陽無汗煩躁 大青龍湯 渴者五苓散 無熱但狂言煩躁五苓散之證 心中懊憹而煩躁 建中湯 自汗心煩小便數者不可用桂枝宜芍藥湯

五七日不大便繞臍痛煩躁發作有時此有燥屎也屬陽明宜承氣湯之類隨輕重下之 少陰心煩不得卧黄連阿膠湯 吐利手足逆冷煩躁欲死者 茱萸湯 下利咽痛胸滿而煩者 猪膚湯

欬而嘔渴煩不得卧者 猪苓湯 惡寒而倦時時自煩欲去衣被 大青龍湯

若陰病發躁謂之陰躁或陰毒之病危篤而用火熨之或飲熱藥而發煩躁不可妄投寒藥煩躁甚者宜再與熱藥如四逆湯 陰盛隔陽病人身冷脉細沉疾煩躁而不飲水者 四逆湯 引飲者非也

表證 裏證 陽證 陰證

表證 太陽無汗 大青龍湯 五六日不下之復發汗 大承氣湯 下之復發汗 桂枝湯 下之復發汗 桂枝湯

裏證 少陰吐利手足厥逆 四逆湯 下利咽痛胸滿而煩者 猪膚湯

陽證 太陽無汗 大青龍湯 少陰吐利手足厥逆 四逆湯 下利咽痛胸滿而煩者 猪膚湯

陰證 陰盛隔陽 四逆湯

○煩為內不安躁為外不安煩躁有二陰陽所發陽明躁等太熱而為陽證中論

煩躁

湯 太陽汗有燥屎 承氣湯 傷寒六七日無大熱而煩躁者 發汗若下之病不解而煩躁者 桂枝湯 不得眠此為陽太盛陽太盛四逆湯 欲水者 少少與之 消渴連 用五苓散

有燥屎 承氣湯 無熱證 桂枝湯 傷寒六七日無大熱而煩躁者 發汗若下之病不解而煩躁者 桂枝湯 不得眠此為陽太盛四逆湯 陰盛發躁 陰盛隔陽 四逆湯 欲水者少少與之 建中湯 自汗心煩小便數者不可與 消渴連惡寒而倦 建中湯 自汗心煩小便數者不可與 消渴連欲去衣被 茱萸章湯 用五苓散 大青龍湯

陰盛發躁名陰躁熱發厥物極則反也有煩躁面赤而脉沉微欲吐而躁四逆湯 陽盛發躁名陽躁熱發厥物極則反也有煩躁面赤而脉沉數欲吐而躁大青龍湯

傷寒六七日無大惡寒但發熱者不可與承氣湯 惡寒而倦時時自煩欲去衣被者可與桂枝湯 陽盛隔陽身冷脉細不欲水者 茱萸章湯 虛也不可便謂躁熱 霍亂欲飲水者 猪膚湯 變熱厥之別當以脉別之可也

嘔吐二十四 二首 太陽水穀不下謂之嘔吐 惡云未下則曰吐已下惡而嘔曰嘔

大凡嘔吐屬陽明須要陽明氣下行若是上行為氣逆胃家由是不和平

胃家有熱難停食胃冷無緣納水漿二証皆令人嘔吐 嘔家聖藥是生姜

孫真人生姜是嘔吐聖藥嘔家証甚多然小柴胡專主嘔 湯寒

差後有餘熱在胃院而嘔者竹葉湯加生姜汁 此不獨差後可用應有熱證而嘔者用之佳

嘔而胃滿者 長蘆湯 得湯反劇者小柴胡也

金匱方穀不下而嘔吐者 小半夏湯 胃中以喘不喘以嘔不嘔四歲不識穀心煩煩然無奈者 桂枝湯 嘔而渴者 茯苓湯

後渴者此為欲解急與之水先渴後嘔者為水停心下此屬飲家業胡不中與也 茯苓湯

活人書謂吐食為嘔吐水為吐也渴欲飲水水入即吐名曰水逆 嘔 茯苓湯 發汗後水藥不下者為逆 小半夏湯

寒多而吐者理中湯不欲水而吐者湯中去术加生姜 嘔噦

手足逆冷者小橘皮湯 嘔噦嘔逆虛煩者大橘皮湯 二件並載咳逆條

熱結

而發熱者小柴胡湯 而渴者茯苓湯 先渴後發熱者小柴胡湯加生姜 嘔

寒水飲

寒多而者理中湯 不欲水而吐者湯中去术加生姜 心下有水飲者小半夏湯 胃滿者茯苓湯

○有声曰嘔无声曰吐嘔則從此吐則從此文字表明後學表不可不明

嘔吐

嘔而胃滿虛煩不安大柴胡湯 太陽與陽明合病必自下利不利者不利但頭者葛根加半夏湯 胃中有熱胃中有邪氣腹滿者黃連湯 不止心下急滿鼓脹者大柴胡湯 頭大柴胡湯 差后有余熱在胃脘而者竹葉加生姜汁湯 ○太陽少陽合病自利而嘔黃芩半夏生姜湯

頭汗出二十五首

要知頭汗非陰証則頸而還是發黃心下滿時名水結曾經汗下別推詳

發黃茵陳蒿湯 水結小半夏湯 應有餘証及平在裏

半在表者小柴胡湯 汗下若胃脘滿結小便不利往來寒熱心煩者

吐則飲食入口即吐名水逆五是也嘔不然有寒如嘔而渴虛煩發熱而嘔者此熱嘔也故用小柴胡之類嘔而胃滿乾嘔吐延涎頭痛諸一穀不下小隔上有寒者乃為寒嘔故用四逆吐則錯若患一而復脚緣多寒必當溫之如水逆水藥當用茯苓半夏寬中行水之劑

發汗后不easy不下為逆半夏湯 發汗后不easy不下 茯苓湯

氣當作脚氣治

宜柴胡桂姜湯 五十四

頭汗

汗下後	發黃	水結	餘證
汗下后胷[illegible]滿結小便不利但未寒熱心煩｜｜出柴胡桂姜湯○陽明下之其外有熱手足溫不結胷心中懊憹飢不能食但｜｜出者梔子豉湯	｜｜出剤頸而還發黃証也茵蔯湯茵蔯五苓散	心下滿｜｜出水結也小半夏茯苓湯	應有餘証及半表半裏｜｜出者小柴胡湯

○遍身有汗謂之熱越熱氣越於四体也若瘀熱在裏不能發越鬱於陽經況頭乃諸陽所會是以但頭汗出知其熱瘀於內必發黃也餘則隨証以辨之

可水不可水二十六 一首 仲景云得病反能飲水此為欲愈后人盛此見其發小曷者使病人尽意飲之因此其禍不可勝數

大渴飲時能一斗常令只与二三升若還不与非其治強飲无疑別病生

飲水過多水停心下氣上乘心則為悸為喘結於胷脇則為水結胷胃中虛冷則為嘔為噦冷氣相持則為噎上迫於肺則為欬嗽清腸中則為利邪熱所薄畜於下焦則為小便不利小腹滿或裏急溢於皮膚則為腫以此知不可強飲明矣全不与水則發喘而死則又非其治也

漱水不欲嚥二十七 一首

陽明口[illegible]苦頭疼水不下咽將衄血瘀血停留定發狂病家外証无寒熱

陽明身熱一頭疼者必發衄脉微者犀角地黃湯 百五十八 茅花湯 百九二 外証无寒熱者必發狂此瘀血停留也輕者犀角地芳湯桃仁承氣湯 百五八 六十九 甚者抵當湯 百四 取盡黑物為度

漱水不欲嚥

陽明	瘀血
陽明身熱頭疼｜｜｜｜｜必發衄脉微者犀角地芳湯茅花湯 百五八 百九二	外証无寒熱｜｜｜｜｜必發狂此瘀血停留輕者犀角地芳湯桃仁承氣湯 六十九 甚者抵當湯取盡黑物為度 百四

○此屬陽明証凡內有熱者欲飲水今欲漱而不欲嚥是熱有經而重无熱也陽明氣血俱多經中熱甚迫血妄行故知必作衄

背惡寒二十八　一首

背上惡寒人少會少陰之病口中和三陽合病口乾燥以此區分免薦差

口中和附子湯 目　口乾燥白虎湯 七十

背惡寒

口燥渴

傷寒無大熱口燥渴心煩丨微惡寒白虎加人參湯 七十五

口中和

少陰病一二日口中和丨丨丨無熱也附子湯 百三十六

○寒邪客於[illegible]中寒寒但背惡寒者蓋背為陽腹為陰又背為五藏之所系此陰氣乘於陽也當別其內外寒熱以辨之口燥渴知其內有熱口中和知其內有寒智者思過半矣

吐血二十九　一首腹血附

皆因邪熱中三陽當汗[illegible]失料量熱毒入深留五藏故成吐血可驚惶

言當汗而失汗也遂致熱毒入深故吐血也瘀血甚者[illegible]輕者桃仁承氣湯 六十九 兼服犀角地黃湯 百五十八 證治論三黃瀉心湯 百三十二 又[illegible]湯 九十二 又地血散 二百八

大下後寸脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾膿血者肝黃升麻湯 二十二

服桂枝湯吐者其後必吐膿血犀角地黃湯 百五十八

吐血

熱毒

當汗失汗熱毒深入故丨大下後寸脉沉遲尺脉丨瘀血甚者抵當丸脉不至咽喉不利唾膿血實者桃仁承氣湯陰者脉黃升麻湯 二十二 犀角地黃湯三黃瀉心脉遲細其人无熱所吐湯柏皮湯地血湯 服桂支湯吐者必吐膿血色皆紫黑血寒則凝血犀角地黃湯 百五十八 也理中湯 百五十

虛煩

○當汗失汗汗氣潰入血經血熱愈甚故宜治以寒涼若寒氣凝血則當溫之使血得熱則行也

衄血三十　一首千金鼻病論云凡時行衄不宜斷之如二三升以上恐多者可斷即以龍骨末吹之九竅出血者皆可用

太陽衄血病將解衄後仍將脉審詳有汗脉浮須用桂緊而無汗用麻黃

桂即桂枝湯也方第一麻黃即麻黃湯也方第二十太陽病自衄及服諸表藥後自衄者為欲解也有汗脉浮再用桂支湯汗脉緊再与麻黃湯脉微者犀角地黃湯百五八又黃芩芍藥湯百九十二衄而渴欲飲水水入即吐先服五苓散百七九次以竹葉湯八十五大抵陰証無緣有血少陰証但厥而無汗強發之必動血動血者死或出口鼻或出耳目也是謂下厥上竭

衄血

太陽

太陽病自丨及服麻黃湯後丨者為欲解煩汗脉浮緩再与桂枝湯廿一无汗脉浮緊而丨者再与麻黃湯二十丨血不止茅花湯百九二

少陰

脉微

強發少陰汗必動血為大丨從耳目口鼻出又曰下厥上竭為難治百五八脉微者犀角地黃湯黃芩芍藥湯七十四丨而渴欲飲水水入即吐先服五苓散次服竹葉湯

○血本為陰為氣變則為汗血与汗一也太陽表之未尽得衄則解經曰其人發煩目瞑劇者必衄得血乃解盡陽盛劇欲衄故也若不當汗而強汗之必動血或從口鼻耳目中出是為厥竭故難治也

多眠三十一　一首

多眠四証先看脉若是風溫情嘿嘿太陽外証欲解時更有少陰與狐惑脉浮自汗風溫也姜蕤湯百九十八脉細者太陽外已解也小柴胡湯四十三但浮无汗者麻黃湯六沉細者少陰也四逆湯百八狐惑自有本條

多眠

太陽

太陽病脉細丨丨外已解也小柴胡湯四十三

少陰

尺寸俱沉細但欲寐者少陰証也四逆湯百八

風溫

湯脉浮滑陰脉濡弱多汗或發汗後身猶灼熱喘息丨丨風溫也姜蕤湯百九六

狐惑

狀如傷寒四支沉重忽忽喜睡若上下唇有瘡者當作狐惑治

凡病者多不得眠傷寒反多眠者其說有二惟太陽欲解則多眠此神將復也如少陰脉沉細但欲寐者神昏也故多眠風溫為病常不了了故多眠狐惑亦神恍惚也

自有本條

不得眠三十二　二首

傷寒差後不得眠者何也蓋熱一氣与諸陽相并陰氣未復所以病後不得睡也

太陽大汗胃中乾躁悶虛煩不得眠下後更加重發汗夜間安靜昼煩寃渾身大熱仍嘔乾錯語呻吟睡不安吐汗下之心懊憹精神顛倒更虛煩

太陽大汗出胃中乾欲飲水者少与之胃中和則愈脉浮小便不利而渴者五苓散 下後復發汗而不得眠者无表証脉沉微可与乾姜附子湯 汗下後仍不解煩躁者茯苓四逆湯 大熱乾嘔錯語呻吟黄連解毒湯 吐汗下後心懊憹虛煩顛倒栀子豉湯 吐下後晝夜不得眠酸棗湯 少陰二三日已上心中煩不得眠黄連雞子湯 下利而渴不得眠猪苓湯 大凡傷寒差後不得眠栀子烏梅湯

不眠

吐下後

吐下後心懊憹虛煩得太陽大汗出大熱嘔錯語栀子豉湯 胃中乾栀子烏梅湯 吐下後晝夜得酸棗湯 欲飲水者黄連解毒湯 下後復汗得先表証脉少少与之 沉乾姜附子湯 差後得栀子烏梅湯 下利而渴得猪苓湯

煩熱

○汗為心之液汗多則神昏故不眠 大熱則神不清故不眠大下則動血 心主血故不眠差後抗氣与諸陽并 脉浮小便不利得五苓散 陰氣未復亦不眠

潮熱

潮熱三十三 一首脉浮弦而惡寒者屬表証

汗

汗成下証脉須潮病在陽明裏欲作結胸并表証莫將承氣胃中調大承氣湯証云其熱不調未可与也則知潮熱當下無疑矣設當行大承氣湯亦須先与小承氣若不轉失氣者不可攻之詳見承氣下後發熱復硬者大柴胡湯 若有表証或大便溏利欲攻与証皆小柴胡湯 結胸潮拶屬太陽也大陷胸湯 日晡發熱脉實者下之宜承氣湯 屬陽明承氣湯 日晡發熱脉浮者汗之宜桂枝湯 時脉但浮者必有盜汗黄芪桂枝湯 冬陽明病脉浮緊者必發潮熱發作有時黄芪桂枝湯

潮

可下

一一脉实者大承氣湯 一一不惡汗後一一不惡 太腹滿而喘陽明胃經也太小承氣湯 下後一一大便

未可下

日晡發熱脉虛者欲汗之桂支湯 陽明中風脉浮弦便難而藏腹滿脉緩一一无汗者則小柴胡加茯苓湯 冬陽明病脉浮緊者必發潮熱發作有時

惡證

傷寒五六日吐汗下後不解日晡一一如潮熱如潮汛之應候不失其時屬陽明胃經也其候應於未申所以潮熱多發於日晡經曰潮熱者實也又曰潮熱者外欲解也又曰其熱不潮未可与承氣湯以此知惡寒小柴胡湯 日晡鬼狀猪復滿鼻乾心煩瘧衣損床微傷寒潮熱則是表解

熱

腹硬大柴胡湯 四十二

結胸——屬太陽脉不浮者大滔胸湯 百一

——身黃陽明中風也梔子蘗皮湯麻黃連軺赤小豆湯 八十九 二十五

冬陽明脉浮——或盜汗黃芩湯 百三

喘直視服承氣湯脉弦者生脉濇者死

裏氣將復下之為愈矣若熱未潮表未罷或小便難大便溏是未全入于裏當先隨其證而治之

發熱三十四 二首 發熱一而渴自汗不惡寒者名風溫也自有本條

太陽發熱惡風寒汗出陽明胃汁乾嘔逆頭疼身發熱医師當作少陽看

太陰厥陰皆不熱唯独少陰良有說陰証發熱自不同脉沉下利四之厥

太陽惡風有汗 桂枝湯 一 惡寒无汗 麻黃湯 二十 陽明汗出脉浮 桂枝湯 一 脉实者調胃承氣湯 六十八 少陽一證並 小柴胡湯 四十五 无表裏証發熱七八日脉雖浮数 大柴胡湯 四十二 假令已下後復脉数不解消穀善飢不大便者有瘀血也 抵當湯 百四 少陰脉沉發熱者 麻黃細辛附子湯 二十六 下利清穀裏寒外熱手足厥脉不出者宜 通脉四逆湯 一 身熱不欲飲水者謂之表熱 小柴胡加桂 三十 熱面口燥煩渴者謂之裏熱 白虎加人參湯 五十七

發熱

太陽

太陽頭疼——有汗惡風桂枝湯 一

太陽身熱汗出濈濈然脉浮者桂枝湯 一

太陽中風自汗嗇嗇惡寒潮潮惡風翕翕——鼻鳴乾嘔桂枝湯

太陽——惡寒熱多寒少脉微弱者无陽也不可汗桂枝二越婢一湯 十一

太陽頭疼——无汗惡風脉黃湯太陽——无汗而喘麻黃湯 十四

太陽无汗——夏至後麻黃知母石膏湯 二十四

太陽无汗惡寒——葛根升麻

陽明

自熱汗出濈濈然脉实者調胃承氣湯 六十八

汗後不惡寒但熱者实也調胃承氣湯

陽明——汗多者急下之大承氣湯 六十八

太陽病三日發汗不解恐恐——屬胃也調胃承氣湯

內实身熱汗不出反惡熱大柴胡湯 四十二

傷寒——汗出不解心下痞

○太陽初受病脉浮發熱此表証也屬足太陽膀胱經膀胱主分津液实腠理緣其津液不分腠理不密故風寒客之風則傷衛發熱汗出惡風者衛中風也寒則傷榮發熱无汗惡寒者榮中寒也中風發熱當用桂枝以解肌中寒發熱

發熱

湯太陽脉浮緊无汗｜自蚵者硬嘔吐而利大柴胡湯
愈天行時疫一二日身無如火頭陽明｜｜大便不利者白虎
痛肉瞤脉洪大者白虎根湯 三十 湯和解之 四十
脉浮數微惡寒｜｜脉浮无汗表不解則隨而發熱蓋
脉浮數或下之仍頭痛｜｜傷寒｜｜脉浮无汗表不解者不可与白虎湯飲水无風為陽風性解
无汗心下滿小便不利桂枝去桂 表証者白虎加人參湯 三
加茯苓白朮湯 十九 散故即熱也太
太陽｜｜无汗而渴小柴胡湯 四 陽明脉浮而緊咽燥口苦腹
不渴外有微熱小柴胡加桂枝湯 五 滿而喘｜｜汗出不惡寒反
應｜｜而喘柴加芒硝湯 六 惡熱身重若發汗則躁心憒
太陽表未解心下有水氣乾嘔｜ 後發熱蓋寒為
｜而欬或渴或嘔或小便不利小 陰寒性動急佛
腹滿或咽小青龍湯 三十八 鍚煩躁不得眠若下之則胃
太陽中風脉浮緊惡寒身痛无 結於經方變熱
汗｜｜煩躁大青龍湯 三十八 乃表証已罷故
太陽發汗汗出不解仍｜心下 舌上胎者梔子豉湯 八十八
悸頭眩身瞤動振振欲擗地真 陽明脉浮｜｜渴欲飲水小
武湯 四十九 不惡寒而但身
便不利者猪苓湯汗出多者熱此邪入於府
不可与茯苓等津也 四十四 方可下也

當用麻黃以發散此不易之法
太陽初中風邪

發熱

少陽 少陰 風溫 下後 汗後 勞倦後

脉弦細｜｜頭 少陰吐利 汗后身灼熱者大下后身 汗後仍｜ 新差後勞
弦而嘔少陽也 風溫小柴胡湯 熱不去心 復｜｜參
小柴胡湯 中結痛柩 ｜傳胸身 門冬湯 四
少陽汗出｜｜ 手足不逆 子豉湯 八十八 腫動真武 新差後血
微惡寒小柴胡 冷反｜｜ ○多汗身灼熱大下后則 氣尚虛動
湯 四十三 ｜而渴小柴 者不死脉 名風過脉除湯 傷血故｜ 湯 四十七 則生熱 枳
胡去半夏加人 不至者灸 俱浮緊汗則濕 酒湯 四十六 ｜善喜若 于後脉浮 芫花干湯
參桂姜湯 四十二 少陰七壯 言溫針則耳聾 壅以克藥 而沉緊 新差后食
少陽｜｜口若 雖言下之則小 下之身熱 ｜而沉緊 新差后食 復｜｜竹
乾小柴胡湯 少陰病始便難吐之則大 不去柩子 石膏湯 四十五 葉石膏湯
○嘔而｜｜者 得之反｜便利益甚發熱 乾姜湯 四十五 大汗后令氣 大汗後脉
湯 四十 湯 四十一 ｜脉沉者 知母根湯 浮大下后令氣 弱其人亡血 緊疾｜｜ ○新差后
小柴胡湯 麻黃附子 防己湯 四十二 病當惡寒后 乃｜｜无汗 八十四
傷寒五六日柴 細辛湯 ｜｜而渴不惡 止有大紙湯 愈盛名陰 實氣鬱傷 食則｜｜
胡証具以他在 寒為溫病解肌 寒八日已上 陽交死証 梔子豉湯
下之柴胡証在 大｜｜者 為難治 也 湯 八十四
仍与之不為逆

傷寒其脉弦細身熱或往來寒熱至于煩渴微嘔則熱在半表半裏矣是以少湯一証正用小柴胡和解之三陰无身熱惟少陰則有熱是未离於表故用麻黃細辛附子藥發散溫中也發汗已身灼熱名風溫是風与溫自合故用去風解溫之劑若汗後食勞復發熱者隨証治之經有俞〻發熱者若俞所覆焫〻而熱明其熱在外也若蒸〻發熱者如熏蒸之蒸明其熱在內也若脉陰陽俱虛熱不止者死發熱脉躁盛重表之无汗者死大汗后發熱愈盛者死發熱下利厥逆煩躁不得卧者死此皆藥所不及也

不可表三十五　一首（為[illegible]為下[illegible]上渴應下而汗者為亡陽）

脉弱无陽遲少血溫溫何逆与虛煩婦人經水適然下動氣虛家汗最難

脉弱者无陽也（佳[illegible]）尺脉遲者血少也先以黃耆建中湯以養血脉尚遲者再作一劑次用小柴胡湯桂枝二越婢一湯和解之

三方並載熱多[illegible]少陰下溫溫（自有本條）何逆者乃四種[illegible]

盡煩熱（自有本條）婦人經水適下發汗則鬱胃不知盖緣表裏皆虛也（小柴胡湯）動氣不可汗仍不可下証治論用（柴胡桂枝湯）在左發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為難治（及自有前[illegible]）在右發汗則衄而渴心若煩飲則吐水先服一二服（五苓散）次服（竹葉湯）在上發汗則氣上衝正在心端（李根湯）在下發汗則无汗心中大煩骨節疼頭痛目運惡寒食而皮吐穀不得下前先服（大陳皮湯）吐止后服（小建中）

虛家六証

一咽中閉塞　二咽喉乾燥　三亡血　四衄家

五林家　六瘡家皆不可表宜（小柴胡湯）

○誤汗后諸危惡証並載於死証條下

不可汗圖



○汗為在表之邪始自得病時腠理不密寒邪客之故令人洒淅惡寒頭痛身熱而腰脊強乃用輕劑就表而以汗解既汗之后病尤未愈雖裏証悉具微有惡寒亦表未解則當先解表而后攻裏也若表已解脉不浮与夫諸虛溫溫動氣者暍等証若更汗之是重虛其虛此為逆也以致病之反覆表裏舛雜至于不救為醫者可不敬慎歟

汗後惡寒三十六　三首

汗後惡寒宜芍藥脉沉發熱下尤良四支疼惟仍義利厥逆四逆湯

汗後渾身熱似炮精神狂乱語譫之更加不食脉躁疾醫經云曰陰陽交

汗後依前寒熱者仍須看候脉何如若还有表重加汗裏証終當下即除

發汗宜用 [illegible] 湯 [illegible] 下即宜用 大柴胡湯 [illegible] 大小承氣湯 [illegible] 芍藥者乃芍藥甘草附

子湯 [illegible] 陰陽交交者死言發汗後不為汗衰脉準前躁疾者若汗

後脉靜者生汗後發昏而熱不退狂言者承氣湯下之立愈二差一再服

汗後惡寒

表未解　大便實　大便利

丨丨丨表未解者汗之麻黃湯 [illegible]	汗後熱不退大便實微惡寒者先解表表解後用大柴胡湯小承氣湯 [illegible]
丨丨丨表未解者汗之麻黃湯 [illegible]	汗後陽微惡寒大便不實者芍藥附子甘草湯 [illegible] 自利厥逆者四逆湯 [illegible]

○汗後惡寒但表解未尽則為輕証法當再汗之若陽微於外寒積於內厥逆自利則用四逆湯陽微於外熱伏於內大便實者下之若汗後脉不為汗衰准前躁疾者此名陰陽交交者死

不可下三十七　一首

脉浮有表并虛細區吐惡寒无失氣大便堅受小便清或少或多或自利

脉浮者為有表也不可下（大抵脉浮而惡寒者為有表也）　表証未罷不可下　脉虛細（王叔和云脉微而細不可下）　嘔吐仲景云嘔多雖有陽明証切不可下

惡寒者大陽陽明合病為表可發汗若是少陰証宜温之　无失氣者謂不轉失氣也依潮热條大承氣湯法及藥評承氣湯條下法

大便堅而小便少恐津液還入胃不能還　胃而先鞕後溏也每日三四行今日再行此津液還入胃不能當自大便也　大便堅而小便多其脾為約（詳見小便數條）及三陽合病條　陽明病自汗出而小便自利者津液內竭也可用蜜道煎法（方載小便自利条下）

小便自如乃可攻之謂如常也每日三行今日亦三行不多不少故曰小便自如也方可下　諸動气諸气在右下之則津液內竭鼻乾頭眩○涛宜（諸動气諸虛家厥逆皆不可下）　動气在左下之則腹裏拘急不止動气反動身瞤有汗反欲拳先服（桂枝十味湯）次服（小柴胡湯）動气在上下之則掌握汗出欲水自灌（桂枝湯）動气在下下之則腹滿卒起頭眩食則下清穀心下痞堅（瞤章心）

（桂枝湯）因中閉塞不可下（桂枝湯加連湯）厥逆（厥家脉子湯）

無失氣　腹脹不聲○初病之時邪在表表故汗之若太陽證罷曾嘗陽明五六日大便不惡寒反惡熱脉沉而虛煩上攻不大便不惡寒反惡熱脉沉而為亡陰實方為可下此至表證已罷惡為傷血（屬於裏若少陰脉沉細口乾便為乾此熱結下焦銷樂腎水故當重虛而死急下之余知害實無語語腹脹而為結胸氣喘潮热蓄血无表證不大便者可下也若大便堅硬小便清者津液內竭知不在表猶未可下小便少者腹裏拘急津液亦充亦未可下加以滑藥身蟲汗自出之脉動气寸證或下之太早皆致危殆者多矣死生之系腹滿頭眩可不究諸心乎

因中閉塞　嘔吐

脉虛日

結胸脉浮大

脉浮有表

動气在右

動气在左

動气在上

動气在下

不可下之則

腹裏拘急

為亡陰

為傷血

為結胸

為結胸氣

為津液內竭

腹滿頭眩

身蟲汗自出

下後有熱三十八

三百 汗後惡寒 勞復食復 陰陽 差後 附

汗後陽微即惡寒下之陰弱還生熱皆緣醫者誤調停致使病家多失血

發汗則損氣損氣則脉微故惡寒也 四逆湯 惡寒條中用梔子湯

汗大下之則傷血傷血則脉濇故發熱也 百九十七 此皆仲景所

謂不當汗下而誤汗下者故有此二證也致有失血者血本爲陰得

氣而流因下之亡陽上不主陰與氣加之所以脉濇此下之過傷其

血也

胃經下後身猶熱漸覺心中成痛結者或梔子恰相宜去病還如湯沃雪

大下後身熱不去心中結痛 梔子豉湯 八十八

傷寒差後熱還生因食因勞與動經脉實下之浮即汗大黃鼠屎取湿平

差後發熱謂之遺熱 四十三 脉實者下之 [illegible]

脉浮者汗之 [illegible] 證治論用 [illegible] 瀉者 [illegible] 下利

下後熱

雷鳴痞痛生薑瀉心勞役 [illegible] 梔子 [illegible] 大黃 [illegible]

卜後熱圖下附懊憹勞食復汗吐下後不解過經不解共七圖

太陽

太陽證服桂支湯或下之仍頭項強翕翕發熱無汗心滿痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯 八十九

陽明

陽明下之仍外熱心中懊憹飢不能食頭汗出梔子豉湯 八八

大下後則傷血故脉濇等 [illegible]

醫以丸藥下之熱不去微煩梔子乾姜湯 九十二

○仲景云大發其汗使陽氣微又大下之使陰氣弱其人亡血病當惡寒後乃發熱无休止時陰陽既虛氣血俱弱故其 [illegible] 不可止息所用蒂 [illegible] 子亦酸苦湧泄之義也

可下

可吐

陽明病下之心中懊憹 [illegible] 可吐下後虛煩不得眠 [illegible]

○懊憹者心中惱亂不安也經曰表未解醫反下之胃中空虛客氣動膈

懷

七而煩胃中有燥屎者反復顛倒心中｜梔心中懊憹蓋是表邪因
也大承氣湯 六十六 子豉湯吐之 八十八 下乘虛內陷於心鬲也
陽明病無汗小便不利陽明病下之其外有熱治之當隨其虛實復逐
心中｜｜必發黃也手足溫而不結胸心中｜其邪方可安也
大承氣湯茵蔯湯｜飢不能食頭汗出梔子吐之

勞食復

勞復

新差後津液未復
血氣上虛勞動則
生熱宜用枳殼梔
子湯鼠矢豉湯
鼠糞湯麥門冬湯

食復

新差後胃氣尚弱
飲食稍多則為食
復發熱腹滿宜服
枳殼梔子大黃湯
竹葉石膏湯 九十五

○傷寒大病邪毒犯於府癥
如木浸牆壁水浪土尚未堅固如
之勢乃隨至是未勞復非似強
力將重若梳浴動氣則為勞一
食復者經曰病已差尚微
煩設不了了者以新虛不
勝谷氣故令微煩損穀
則命

汗吐下後 吐後 吐下後 汗後下 下後汗

汗吐下後不解

發汗吐下後虛
原不眠劇者反
覆顛倒心中懊
濃梔子豉湯 八八
太陽汗吐下解
後心下痞硬噫氣
不除旋覆代赭
石湯 四十二
吐後腹脹滿邪
熱入胃也調胃
承氣湯 六十八

吐下後心下逆滿氣上衝胸頭五六日已發汗不
脇脈沉緊發汗則動經身為痛
搖茯苓桂枝白朮甘草湯 四十三
吐下後七八日不解熱結在裏表
裏俱熱時上惡風大渴舌上
乾燥煩欲飲水白虎加人參湯
吐下後不大便五六日至十餘
日日晡發潮熱不惡寒獨語
如見鬼循衣摸床脈弦者生
滿者
死但發熱譫語大承氣湯
太陽吐下後微煩小便數大
便硬小承氣湯 六十八 六十七
傷寒本寒醫復吐下之食入口
即吐乾薑黃連黃芩人參湯

復下之胸脇滿
微結小便不利
渴而不嘔但頭
汗出往來寒熱
心煩為未解柴
胡桂薑湯 五十四
發汗若下之病
仍不解煩躁者
茯苓四逆湯
發汗若下之煩
熱胸中窒梔子
豉湯 八十八
大汗若大利而
厥者四逆湯 四十八

解如後下之脈
汗若則知病在
外當須解外桂
枝湯 二
下後復發汗昼
日煩躁不得眠
夜而安靜不嘔
不渴無表證脈
沉微身無大熱
乾薑附子湯 十四 十二
下後復發汗必振
寒脈微細此內外
俱虛也

虛 實 渴

○病之初感始於
太陽經故以發

汗後不解

身熱不去

發汗病不解反惡寒者虛也
芍藥甘草附子湯 脈微弱
躁者乃可服 [illegible]
太陽發汗後仍不解仍發
熱心下悸頭眩身瞤動振振欲擗
地真武湯 [illegible]
發汗後身疼痛脈沉遲桂
支加芍藥人參新加湯 [illegible]
太陽發汗遂漏不止其人惡
風小便難四支微急難以屈
伸桂支加附子湯 二
大汗出熱不去內拘急四支
疼下利厥逆而惡寒四逆湯 [illegible]
汗後腹脹滿厚朴生薑甘草半夏
人參湯 [illegible]

利不止　胸腹滿

發汗後不惡寒但熱
者實也[illegible]
也調胃承氣湯 [illegible]
服桂支湯脈洪大者
桂支湯如前法若形
如瘧日再發汗出必
解麻黃湯 二十
發熱汗出不解心
中痞硬嘔吐下利大
柴胡湯 四十
發汗後臍下悸者欲
作奔豚茯苓桂支甘草
大棗湯 四十
發汗後不可更行桂
支湯汗出而喘無大熱
者麻黃杏人甘草湯

煩

太陽病發汗後
大汗出胃中乾
燥不得眠欲得
水者少少與之
令胃氣和則愈
若脈浮小便不
利微熱消渴者
五苓散 [illegible]
發汗已脈浮數
煩渴者五苓散
服桂枝湯大汗
出大煩渴不解
脈洪大白虎加
人參湯 [illegible]

汗為截要汗之既行如油然作雲沛然下雨雲歸空霽其病乃愈倘汗出不解者或表邪未盡而然或邪亂傳裏而然或汗之過多而然或因邪氣乘虛內容為之所以各不同也

○去傷寒之邪不過汗吐下之

下後不解

大便利

傷寒五六日大
下後身熱不去
心中結痛未欲
解也梔子豉湯
醫以丸藥下之
身熱不去微煩
梔子乾薑湯
服桂支湯或下
之仍頭項強無
汗翕翕發熱心
下滿微痛小便
不利桂枝去桂
加茯苓白朮湯

太陽桂枝證醫
反下之利遂
不止脈促者
表未解喘而
汗出者葛根
黃連黃芩湯
六七日大下
後寸沉而遲
手足厥逆下
利脈不至咽
喉不利唾膿
血泄利不止
為難治麻黃
升麻湯 [illegible]

嘔煩

太陽下後
脈促胸滿
桂枝去芍
藥湯若微
寒去芍藥
方中加附
子湯 [illegible]
下後心煩
腹滿臥起
不安梔子
厚朴湯十九

陽明下之
心中懊憹
而煩梔子
豉湯有燥
屎者大承
氣湯 [illegible]
太陽過經
十餘日二
三下之嘔
不止嘔不
止心下微
煩大柴胡湯

三法也三法得當病勢易衰則愈矣儻三法失宜加以病勢危惡則傳變不已誠可慮也況發汗吐下後邪氣乘虛而未盡則雍塞而未散或當量其虛實以治之況賢謂知邪氣之虛實矣

過經不解

傷寒十三日不解過經譫語以有熱也當以湯下之若小便利者大便當硬而反下利脈和者知醫以丸藥下之非其治也其自利者脈審微厥今反和者內實也調胃承氣湯 [illegible]

傷寒上二日不解胷虛而嘔日晡潮熱已而微利此本柴胡証下之而不得利今反利者知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後服柴胡加芒硝湯 [illegible]

熱多寒少三十九 一首

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證在与小柴胡湯嘔不止心下微煩為不解大柴胡湯太陽過經十餘日心下欲吐胷脇大便反溏腹微滿微煩若不經吐不者當与柴胡湯若曾經吐下者則邪氣乘虛入胃為實調胃承氣湯 若脇浮緊或熱多寒少亦自可發汗或遲或弱皆不可也

汗吐下之不差溫補針艾之適當則十全之功可自得矣若過經者以六日傳六經七日為一候若不愈至于十三日乃再傳經盡所以謂之經也

熱多寒少分三証不嘔清便各半湯尺脈尚遲為血少脈皆數弱亦無陽

清便者大小便如常也 桂枝麻黃各半湯 [illegible] 尺脈遲者 [illegible] 中脈尚遲再作一劑次第用 小柴胡湯四十二 桂枝二越婢一湯和解之 [illegible] 无陽者 [illegible]

乾嘔四十 一首

一名窒滯嘔而无物出也

而无物名乾嘔下利三般屬少陰脇痛頭疼并水氣个中自是少知音少陰下利三証利不止厥逆无脈乾嘔煩者 白通加猪膽汁湯 [illegible] 脈微者 白通湯 [illegible] 裏寒外熱脈微欲絕或乾嘔者 通脈四逆湯 [illegible] 乾嘔吐涎沫頭痛者 吳茱萸湯 [illegible] 得藥而反劇者 小柴胡湯 [illegible] 汗出頭痛乾嘔者 桂枝湯 [illegible] 心下有水氣乾嘔發熱者屬表 小青龍湯 [illegible] 身涼汗出兩脇痛乾嘔短氣不惡寒比表解裏未和也 鬲上有寒飲乾嘔者可溫之 四逆湯 [illegible] 証治論乾嘔而利者 黃芩半夏生姜湯 [illegible]

寒 熱 水氣

○嘔而有物為嘔而无物為乾嘔本屬胃之三脘是

少陰下利裏寒外熱脈自汗頭疼身熱表不解心下胃陽上為受納之府裏氣

乾嘔

微欲絶通脉四逆湯 四十五 桂枝湯 一 利而不止厥逆无脉 灸之 泄泻不頭痛 白通加猪膽汁湯 四十六 長柔黄湯得 四十七 胃 湯 三八 有水氣 不起或為熱嘔或為寒 發熱小青龍 嘔故不能納又不能出力 乾嘔也千金曰嘔家發 自涼汗出兩 生姜取其散逆氣金匱 要略多用半夏取其散結氣 此治乾嘔之大法也 高上有寒飲 煮當溫 陽反劇者小柴 胡湯通用表藥 脇痛 者 之四逆湯 四十八 胡 四十九 胃 五十 桔梗湯 五十一 而利黄芩芍藥湯 胃熱下 桔梗湯 十棗湯 五十二

傷寒不得汗四十一 二首

傷寒躁盛身无汗或用麻黄汗不行此是諸陽之脉極有中无一可全生若還无汗渾身痒脉更浮進本為虛有是无陽難作汗建中术附或医書无陽身痒 桂枝麻黄各半湯 五十三 陽明主有汗今反无汗如虫行皮中 术附湯 五十四 建中陽 五十五 汗不流是汗出將盡覆不周汗出不勻致手足腰背挛痛也 用牛蒡根散 五十六 陽 虛 表 實 ○自大陽傷寒无汗而不

脉浮而遲為無陽不能作汗其身必拜桂枝麻黄各半湯 五十七 傷寒无汗服麻黄湯後或煩躁或嘔逆始則無汗服藥後則已乃用蒸法 五十八 五十九 六十 以汗解今汗証雖具脉汗湯等兼汗不出者死不得 陽明一日以分反无汗 服桂枝湯或下之仍頭痛 自舉如虫行皮中久虛 頭強發熱无汗心下滿小 柔至三剂汗不行此陽虛 津枯不能為汗故云热病 脉躁盛不得汗者謂陽 脉極故不可治也 故不附湯黄芪建中湯 白术湯 六十一

不得汗

頭疼四十二 一首

惡寒發熱大陽經惡热頭疼胃氣蒸脉細而弦兼發热少陽頭痛自分明三陰本没頭疼痛若有頭疼屬厥陰非次頭疼涎作病心煩鼻塞温家鼻大陽惡寒發熱頭疼无汗 麻黄湯 六十二 桂枝湯 六十三 已發汗未發汗頭痛如破者連鬚愁白湯 六十四 六十五 不已者 湯 六十六 陽明頭疼胃氣所蒸也 瓜蔕散法 六十七 論條中云无頭疼詳具其下温家 少陽頭疼 小柴胡湯 六十八 涎病頭疼 瓜蔕散法 六十九 鼻塞頭疼 瓜蔕散鼻 出鼻中黄水即愈厥陰頭疼脉必微浮 者欲

愈也宜挂枝麻黄各半湯 十三

活人書云三陰无頭疼唯厥陰有頭疼至吳茱萸證却云乾嘔吐涎味頭疼厲少陰以此論之少陰亦有頭疼但稀少耳孫真人云少陰傷寒不壯熱不頭疼其稀少可知少陰雖有熱而无頭疼厥陰有頭疼而无身熱若身熱而又頭疼屬湯證无疑矣

頭痛

太陽

太陽｜｜無汗麻黄湯｜｜有汗挂枝湯 二十 已發汗未發汗｜｜如破連須葱白湯葛根葱白湯｜｜小便清知不在裏當汗之挂枝湯發熱｜｜似瘧為

少陽

少陽｜｜寒熱往來脉弦細小柴胡湯 四 非次｜｜及發寒熱脉緊不大即是鬲上有痰瓜蒂散吐之 一百二十 一頭中寒溫故白鼻空寒清重而

陽明

陽明｜｜不惡寒反惡熱大便實胃氣所承氣湯 六十六

厥陰

厥陰乾嘔｜｜吐涎沫吳茱萸湯 百六 厥陰｜｜為欲愈小建中湯 五十八

○頭痛本屬太陽經其脉最長三陽之邪皆得犯之三陰之中太陰少陰脉至頸胸而还不循於頭則无頭痛惟厥陰上入頏顙連目系出額故有頭痛若厥陰得濕脉則是陰病見陽明生矣若頭痛入連繫腦手足寒而

欲愈挂枝麻黄各｜｜瓜蒂搐

半湯 十三 鼻法 二百 脉沉細可作胃氣厥逆而治之

百合四十三 一首 百脉一宗悉致其病不復經絡其狀欲食復不能食欲卧復不能卧欲行復不能行如有寒又無寒如有熱又無熱常默默不知所以口苦小便赤服藥入口即吐利如有鬼邪蓋此病因病後失於調理餘證在陰則攻陽餘證在陽則攻陰者或發其汗攻陽者或反下之以此為逆各不得解故用百合等藥取其和合於百脉也

百合

腹脹四十四 一首

問君腹脹是如何只謂陰陽氣不和若是曾經汗吐下依方調治莫蹉跎

腹脹者何也陰陽不和也桔梗半夏湯最良 百七十四 仲景云太陽證發汗

後腹脹滿者厚朴半夏甘草人參湯百二十九 太陽證不後心煩腹脹滿卧起不安者梔子厚朴湯九十 吐後腹脹滿者調胃承氣湯六十八

腹脹

汗下後 可下

太陽病發汗後——者吐後——滿脉實者調厚朴半夏甘草人參湯 胃承氣湯 六十八 百二十九

太陽證下之後心煩——心陰六七日不大便——急下之小承氣湯 六十七

卧起不安梔子厚朴湯九十 通用桔梗半夏湯 百四十七

○腹脹者陰陽氣偏而不和也若汗下吐後動氣傷血偏而不順邪氣入腹乃為腹脹治須調其氣血和其榮衛可此若脉沉實腹堅滿不大便方可下也

小便不利四十五 一二首

小便難小便自利及利小便一首 小便數而不快二首 二首 血附

傷寒汗下亡津液故使胃中乾燥極法主小便多不通醫家反利名為逆熱在下焦偏喜飲小便又却不通時脉浮自屬五苓散沉脉猪苓亦頗宜汗下後亡津液胃中乾極故小便不利醫見不利往往利之誤矣若得小便利者病必自愈但不可用藥行之也熱在下焦小便不利脉浮者

脉沉者猪苓湯百四十 表不解心下有水發熱而咳小腹滿小便不利者尤去麻黃加茯苓也四十 翕翕發熱頭頂心痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯十九 嘔而發熱胸脇滿心下怔忪小便不利小柴胡去黃芩加茯苓湯四十六 心陰小便不利四逆散加茯苓百十三

陽明經病饒多汗切戒醫家利小便若是發黃井中濕是中專以利為先傷寒有所不利者行之取其滲泄也大病差後從腰已下有水氣者杜鼓滓湯二百四 此利水道滲泄之義也發黃中濕各有本條 小便難而黃者陰虛為陽所湊中有熱也故小便難而黃 乃全木通散二百十八 小便難者太陽病汗後漏不止惡風四支拘急難以屈伸小便難也桂枝加附子湯六 ○自汗傷風條通 陽明中風脉弦浮大短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗嗜卧身黃小便難潮熱而噦者小柴胡加茯苓湯四十四 ○濕勞條通 小便自利者太陽證下焦有熱小腹必滿小便不利而反利者下血證也抵當湯四 陽明證自汗出應小便不利而反利者津液內竭也屎雖硬不可攻之宜蜜前導法百二

少陰證四逆而小便自利者虛寒也四逆湯方入其武
脾脉與腎盡皆虛寒從虛由此入虛則令人數小便熱則小便行道
澁跌陽澁與浮相搏滿主腎虛便溺數浮為胃實大便難方書所論為
脾約○經云大抵渡數則大便難也脾約元脉合病太陽上明條下　太陽病
自汗四支拘急心煩微惡寒脚挛急若小便數者切不可
行桂枝也宜與甘草乾姜湯方藥甘草湯　太陽病汗吐下後小便數大便
因鞕者小承氣湯利　傷寒自汗脉浮小便數而胃不和讝語者少與
調胃承氣湯　承血證治論用四逆湯脉法　仲景云跌陽浮濇少陰脉如經
也其病在脾法當下利注云脾虛不能制水腎氣平和故少陰如經
也浮則胃熱濇則脾寒所以不能刻消水穀故下利也与前所論不
同下利則依下利條隨冷熱治脾約者依本條治

小便不利

熱

寒熱

陰濕

○膀胱五苓藏溺液即熱
寒於內津液不下行改
小便不利當寒熱

太陽汗後脉浮微濇又陽明五日證已熱行津餘所得
渴而五苓散渴甚者行結苓下渴浦寒熱滿痛不利水氣不得行即當溺
湯傷寒七八日身黃如橘子頭痛苦此姜湯渴者便難無根蒂滿脾水氣不得行即當
色腹散滿者因陳湯　小便柴胡湯　尺湯自汗發熱
頭汗出渴引水漿發熱心下條小柴　微用散溫之辛甘發
在內必發黃因陳湯大胡湯不者黃芩芍藥
便下難作湯微熱渴者當有芩八九日下之脉濇
澁緊也大承氣湯　唯嚴恒有黃骨毒證

血證

陽明

少陰

太陽身黃小便當利不利　陽明自汗遲少陰四逆　○小便陰小便黃蘇
反自利其人如狂血証諸　小便不利而　其內有熱小便自利其
也抵當湯　百四　反自利津液虛湯及真　人如狂少腹滿膏不為
傷寒有蓄腹滿熱小便不內竭也桑蟲　百八　熱乃畜血也若湯明津
利今反自利為有血也抵硬不可宣武湯去伏　芩　百三九　竭自利与夫少陰自
當先下之不可餘藥宗密道前　血延胡索散　利乃胞寒不禁可不
血延胡索散　猪膽汁法　溫乎

小便數

可溫

太陽自汗出脈拘急難以屈伸心煩微惡寒脚拳急——者不可行桂枝宜与甘草乾姜湯芍藥甘草湯（百四）（百十六）

可利

太陽汗吐下後——而胃不和讝語者少与調胃承氣湯（六八）

太陽汗吐下後——大便因硬者小承氣湯屎溲數則小便數而大便堅脾約丸（百五二）

○小便數者乃頭數也貫与膀胱俱虛客熱乘之虛不能制水又小便熱則水行澁匕則小便不快故令數起也若大便堅是為脾約約者儉也脾主為胃行其津液今胃強脾弱約束不行致小便數而大便難也

藏結四十六

一首 狀如結胸飲食如故時々下利而舌上白胎者是也

飲食如常時下利更加舌上白胎時連臍痛引陰筋者藏結无來死不醫无陽証不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜舌上白胎者不可攻也可刺關元穴仍与小柴胡湯（四十三）

藏結之候其狀如結胸飲食如故時々自下利舌上白胎臍痛引陰筋不往來寒熱一云寒而不熱其人反靜此藏結也仲景

藏結

謂病脇下素有痞連在臍傍痛引少腹入陰筋者此名藏結死差宿昔之積結於脇下為痞今因傷寒邪氣入裏与宿積相合使真藏之氣結而不通致連在臍傍痛引少腹入陰筋而死仲景无治法舌上白胎者不可攻可刺關元仍与小柴胡湯（四十三）

活人書括指掌圖論卷四終