V
G133,76
H85

類編活人書括指掌圖論卷之五

傷寒表裏証二十論

表裏証　發熱　有水　惡寒　身体痛

身熱不渴為表有熱（小柴胡加桂五十）厥而脉滑為裏有熱（白虎加人參湯十一）黃帝所謂發表不遠熱攻裏不遠寒也又一云身熱口燥煩渴為裏有熱（白虎加人參湯七二）乾嘔微利發熱而欬為表有水（小青龍加羌花三十八）身躰原表証罷欬而脇下痛為裏有水（十棗湯百八十二）發熱而惡寒者發於陽也表惡寒（麻黃湯二十）（桂枝湯二）無熱而惡寒者發於陰也裏惡寒（附子湯百三十六）（小柴胡湯四十二）（四逆湯百八）○自有惡寒條身躰痛發熱頭疼而脉浮者表未解也（麻黃湯二十）身躰痛自利而脉沉者裏不和（四逆湯百八）

表裏詞　長短句

發熱惡寒發於陽柴胡桂麻黃無熱惡寒陰上起四逆理中治下利清穀身体疼救裏急經營（真武湯四逆湯百三九）（百八）身痛清便自調者救

表母緩也〔二十一〕桂枝湯身熱不渴熱在表加桂柴胡小〔五十〕厥而脉滑渴躁煩白虎人參安〔七十二〕乾嘔微利欬發熱表水君須別〔小青龍加〕羌花〔三十四〕身涼表罷欬脇痛裏有水氣重〔十棗湯〕〔百八十二〕表中風寒裏不消沉細數須調此為裏脉表却熱辛葦微汗洩〔麻黃附子甘草湯〕〔二十六〕陰病發汗須動經也須細調停少陰發熱脉沉者麻辛附子也〔麻黃細辛附子湯〕〔二十六〕太陰脉浮可汗之仍須用桂枝〔二〕此為陰証發表藥對証〔保安〕柴

表証　論浮脉

發熱惡寒身体痛而脉浮者是也浮屬陽也素問云寸口脉浮而盛曰病在外〻者表也　寸口脉沉而緊曰病在中〻者裏也仲景云脉浮者病在表可發汗　又曰表有病者脉當浮又曰結胸証脉浮者不可下則知脉浮屬陽証無疑矣惡寒者表之虛屬太陽宜汗也

表証謌

發熱惡寒為表証脉浮身痛太陽定惡寒乃是表之虛發表藥性宜審訂春月陽微其氣弱汗之太過則陰勝冬月潛伏汗非宜輕導解之可安靜

春初冬月若病輕不問風寒有汗〔柴胡桂枝湯〕〔五十三〕無汗〔麻黃葛根湯之類〕〔二十二〕若病重不拘此

裏証　論手足心汗

不惡寒反惡熱手掌心并腋下濈〻汗出胸中乾咽燥糞結聚潮熱大便鞕小便如常腹滿而喘或讝語脉滑而沉者裏證也仲景云手足濈然汗出者大便已鞕也傷寒欲下而小便少手足心并腋下不滋潤者不可攻也裏証者內熱是也內熱者裏之弱屬陽明宜下之

裏証謌

裏証之脉沉而滑不惡寒兮反惡熱掌心腋下汗潤滋咽燥胃乾仍糞結腹滿而喘或讝言大便不調兼潮熱內熱乃是裏之弱此屬陽明宜下泄

傷寒脉浮大是表証當汗其人發熱煩渴小便赤却當下此是表裏俱見証（五苓散百十九）仲景云中風發熱六七日不解而煩有表裏証渴欲飲水水入即吐名曰水逆（五苓散百十九）六七日不大便頭痛有熱者是裏証當下其人小便清者知不在裏仍在表却當汗此兩証俱見（桂枝湯）

陽病人心下滿不欲食大便鞕脉沉細是裏証當下其人頭汗出微惡寒手足冷却當汗此兩証俱見（四逆湯）

小柴胡湯太陽病表証未除而醫數下之遂協熱而利心下痞鞕謂之表裏不解（桂枝人參湯）

太陽病醫反下之因尔腹痛是有表復有裏（桂枝加大黃湯）痛甚者（桂枝湯方）（詳見腹痛）

條太陽病桂枝証誤為醫下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出者（葛根黃芩黃連湯）（此皆仲景治傷寒有表復有裏等者當以意推之）

表裏俱見論

脉浮而大表之形渴煩小赤熱五苓不大六日頭疼熱小便却清

桂枝說心滿不食沉細鞕緊頭汗小柴胡太陽誤下加熱利脉痞桂枝參伊止因尔腹脹者何方桂枝加芍甚加黃桂証下之利不止脉如促者表未已喘而汗者當何如當根芩黃方可理

表裏俱見

脉浮大

脉浮而大是表証人心煩煩躁吉腹滿有表証而脉遲下者脉浮而緊是有裏當下若脉浮而緊是有裏而喘發熱汗出宜用大柴胡湯不便赤証宜用大承氣湯不惡寒反惡熱可下宜小建中湯若脉浮而緊是有裏而喘發熱汗出宜汗之桂枝湯

脉遲弦細

脉遲弦細不欲食脉浮而緊是有裏俱見不可當下其人頭汗出腹痛在反加芍藥湯身熱惡寒手足厥冷此兩証俱見宜利不止脉而渴者宜小柴胡湯四十三

誤下

太陽表未解而誤下之因尔腹痛在反加芍藥湯太陽醫下之因尔腹痛在反加芍藥湯人參湯

太陽表未解而誤下之因尔腹痛在反加芍藥湯根黃芩黃芩湯

○表裏俱見疑似之間最宜詳辨在表宜汗在裏宜下今既兩証俱有大率以表証證裏則先治其表表証既先治其裏裏証既先治其表表証既先治其裏也

無表裏証

傷寒四五日後以至過經十三日謂之過經无表証又於裏証未可下者但非汗証亦非下証者皆用調（桑胡湯加減）若用之不愈而大便鞕無表証者（大柴胡湯下之）仲景云六七日目中不了瞖不和無表裏証發熱大便难七八日脉雖浮數可（大柴胡湯下之）假令已下而脉數不解消穀善飢至六七日不大便者有瘀血也（若當歸四日自有血証）少陰病始得之反發熱脉雖沉（以桂黃細辛附子湯微汗之）若二三日常見少陰无陽証者（麻黃甘草附子湯微發汗）此二証又非表裏之所能拘不可不知也

表裏俱無詳

四五日後至湯經非汗非下小柴行十餘日外用不愈隨証可下大柴輕下後脉數不解時六七日間不大遺瘀血結凝當辨別抵當湯中可治之

無表裏

過經

傷寒四五日至十三日過經无表証与裏証又未可下小柴胡湯不愈大便硬者大柴胡湯六七日目中不了了情不和无表裏証發熱大便难脉雖浮數大柴胡湯甚者大承氣湯

瘀血

下後脉數不解至六七日不大便有瘀血也抵當湯脉數善飲消穀六七日不大便亦瘀血證也

○无表裏証者但非汗証又非下証俱可用小柴胡湯服後疾其餘証更以小柴胡加減法治之亦良

表熱裏寒表寒裏熱

病人身大熱反欲得衣熱在皮膚寒在骨髓也仲景無治法宜與（陰旦湯）寒已次以（小柴胡湯加減其表五十）身大寒反不欲衣寒在皮膚熱在骨髓也仲景亦無治法先與（白虎加人參湯）熱除次以（桂枝麻黃各半湯以解其外）表熱裏寒者脉須沉而遲手足微厥下利清穀此裏寒也所以陰証亦有發熱者此表解也（四逆湯）表寒裏熱者脉必滑身厥舌乾也所以少陰惡寒而倦此表寒也時時自煩不欲厚衣此裏熱

也[illegible]此仲景之餘議也　少陰惡寒而踡或有從反傍者
踡音拳君手足拳縮也此理亦通故兩存之煩躁條通

表熱裏寒謂

病身大熱反欲衣寒在骨間熱在皮陰旦湯先寒既退小柴加桂
次溫之裏寒表熱脉沉遲手足微厥利下時所以陰証發熱者四
逆湯中實主持

表寒裏熱謂

身寒反不欲衣者寒在皮膚熱髓也白虎加參先除熱桂麻各半
湯宜下表寒裏熱脉滑厥口燥舌乾勿須訝所以少陰惡寒時自
煩不欲衣宜溫

陰盛陽虛陽盛陰虛[illegible]

陰盛則外寒陽虛則外寒屬表故表[illegible]條云外寒者表之虛汗之則
愈也　陽盛則內熱陰虛則內熱內熱屬裏故裏[illegible]條云內熱者裏

之弱下之則愈也外臺云表病裏加汗之則愈表和裏病下之則愈
蓋謂此也古人云病有根本治有先後也

陰證似陽謂

陰證似陽當辨別躁煩陰盛故也面赤下虛故也身微熱裏寒故也蓋陰發躁藥
宜溫尺寸微沉為君說
此証大率以脉為主諸數為熱諸遲為寒若以虛陽[illegible]發煩躁誤
以為熱醫反與涼劑則氣消成大病矣四逆湯加葱散主之[illegible]臺秘要云
陰盛發躁名陰躁欲坐井中方可宜以熱藥治之不可妄投涼劑

陰盛隔陽謂

陰盛隔陽其身冷躁煩不欲疾細沉霹靂散餘其躁止得眠汗出
即安平
宜以霹靂散通散寒氣然後熱氣上行汗出乃愈[illegible]

陽證以陰謂

陽證似陰何以測四肢逆冷小便赤大便或秘或黑時此脉沉滑
君須識傷寒失下血氣空伏熱之深故厥逆指甲時溫可驗之此
證下之宜端的
用大承氣湯加下之汗出立差輕者白虎湯熱厥與冷厥不同熱厥
微厥即發熱陰厥却不發熱四肢逆冷脉沉細大小便滑泄矣

陰陽毒

陰獨盛而陽暴絶則為陰毒若陽獨盛而陰暴絶則為陽毒大凡陰
陽離絶非大汗不能復其正氣也六脉俱洪大芤或沉取之大而不
甚疾者非陰証也陽毒其脉當弦而洪數陰毒其脉沉細而疾陽病
則身熱而無汗陰病則身冷而有汗岐伯云陽勝則身熱腠理閉喘
麤為之俛仰汗不出而熱陰勝則身寒汗出數慄而寒〻則厥此証
不可以常法治之金匱論陽毒之為病面赤斑〻如錦文咽喉痛壅
膿血五日可治七日不可治陰毒之為病面目青身疼狀如被打喉

咽痛死生與陽毒同

陽毒

陽毒已深脉洪大內外結熱舌卷焦黑鼻中如烟煤宜用水漬法傷
寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒身重腰背痛煩悶不
安狂言或走或見鬼或吐血下利赤黃其脉浮大而數面赤斑〻如
錦文咽喉痛壅膿血五日可治至六七日不可治陽毒升麻湯咽痛
玄參升麻湯甚者或有喻垣上屋

陽毒

○陽毒之証初受病時所感邪毒深重加以當汗失汗當下失
下或吐下後邪熱乘虛而入或悞服熱藥使毒熱散蔓如抱薪
積火无不延燎至于六脉洪大舌卷焦黑鼻中如煙煤身而錦
斑狂言直走踰垣上屋登高而歌弃衣而走皆真証也五日可
治六七日不可治可用陽毒升麻湯斑盛者青黛一物湯咽痛
玄參升麻湯若熱甚者時狂時昏口噤咬牙藥不可下若用水
漬法候牙寬狂乱稍定投藥亦良如黑奴丸不可輕用

陽毒謌　脉多弦而洪數身熱无汗煩躁

妄言狂走為陽毒面赤咽疼身錦斑下利赤黃仍或有脉當滑促實洪看

陰毒

陰毒已深疾勢困重六脉附骨取之方有按之即無一息八至已上或不可數宜用葱熨法灼艾法二百二十二　傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日已上至十日變成陰毒身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣入心心下堅強短氣不得息躁渴虛汗或時鄭声嘔逆下利身如被杖唇青面黑四肢厥冷其脉沉細緊[illegible]景云此陰毒之候五日可治至六七日不可治也陰毒甘草湯主之百十八

陰毒謌　脉沉細而弦疾身冷有汗　五言

陰毒四肢逆脉細沉而疾心腹痛渴煩吐利冷汗出一身如被杖恍惚如有失尺小寸或大沉取看消息沉而大不甚疾者非陰也俱洪則非陰甚者一息七

陰毒

○陰毒一証初受病時所感寒邪深重致陰氣独盛或汗吐下後變成陰毒六脉沉微復中絞痛或自下利四肢沉重咽喉不利虛汗嘔逆唇青面黑手足厥冷身如被杖短氣不得息此陰毒之候三日可治四五日不可治先服陰毒甘草湯真武湯附子湯次灸氣海關元三二百壯或用葱熨臍下以手足溫和脉息漸應為効如厥逆寒極囊縮者可用薰法嘗有回生之驗

厥証　陽厥當下　陰厥當溫　下証陰臭而見四逆者是失下後血氣不通四肢便厥也

厥有一証有陽厥有陰厥仲景所謂熱深則厥深也蓋陽極則發厥也不可一例作陰証治之　初得病而身熱至三四日後熱氣方深大便秘小便赤或譫語煩躁昏憒及別有熱証而反發厥者陽厥也急用大柴胡湯四十二　小承氣湯六十六　承氣湯六十七　隨輕重用之若大段輕者白虎湯七十一　初得病身不寒熱大便不秘引衣自蓋或下利或小便數无熱証而厥逆者陰厥也四逆湯百八　四逆湯二百二十四　理中湯百四五　四逆加茱萸生姜一百十二　通脉當歸　陰

陽二厥脉皆沉所以使人疑也陰厥脉沉遲而弱陽厥脉沉而滑或云緊又陽厥指八時一溫陰厥當冷也証治論云若頭痛不見未辨陰陽者且與四順元試之若是陽厥便當見熱証若是陰厥則不發熱矣（方見四逆手足指頭微寒者謂之情清此疾為輕只可服理中之類已成厥者則用四逆也）脉不至者通脉四逆等湯　厥而脉乍結者邪氣結在胷中也亦令人厥（八帝散性甘草厥而恍惚者有水也宜先治水焉厥陰（見心藏厥証條下）藏厥証條下

厥論

陰厥脉沉兼細弱足多拳卧惡寒過陽厥脉沉須實滑頭疼惡熱八溫和

陽厥

初得病身熱頭痛已後大便秘小便赤或畏熱或飲水或

得病後四肢逆冷脉沉而細足拳卧而惡

陰厥

○厥者至也手足至冷甚於四逆也此陰陽隔絶致湯氣伏逆陰氣偏勝是故厥有二種但以

厥證

湯手卻足煩躁不得眠識之引氏蓋厥不欲水証皆憤而一陽厥也大柴胡或下利清穀而一逆湯亦不氣湯渴者白虎湯者陰厥也四逆湯白手足冷脉乍結邪氣結在胷滑厥逆脉不至者胷心下痛煩躁不能食氏通脉四逆陽

（二百三十四）

帝法证之（二百二五）

宜治而一面色不澤身冰手足指頭微冷謂之清兩手忽无脉或一手无脉經云脉

必是有正汗也多用綿衣无脉

包手足急厥手足冷厥或加美生姜湯

兼与補技麻黃各半湯解出帝促脉伏而一五味子

脉大汗而解（百十三）

湯（百八十）

傷寒一逆心下怔仲者宜四利手足一冷頭疼欲先治水次用伏苓甘草湯

死証深黃湯

未厥前大便秘小便亦澀語頃渴及別有熱証而後厥者此陽氣伏逆而陰氣偏勝名陰厥也急用四逆湯真武湯溫之惟陽厥最宜詳審蓋熱深厥深不可不察

不渴无熱証而厥者此

陰氣偏勝名陰厥也急

腹痛四証

實　陽　虛　陰

陽大陰亦有腹痛載三陰三陽諸中　太陰條

仲景云尺脉弦而腸鳴泄利腹中急痛者虛痛也先与小建中湯不差者中去黃芩加芍藥四十五（五十八）或湯（四十三）閉脉實腹滿大便秘按之而痛者實痛也（仕十六）加大黃湯毛　黃連湯　大承氣湯（六十六）　太陽病醫反下之因尔腹痛是

有表復有裏仲景用桂枝加芍藥湯（十）即是小建中湯也痛甚者加大黃方載三陰三陽調太陰條及表裏俱見條

少陰腹痛或泄利下重四逆散（百十二）通脉四逆加芍藥（二百二十四）腹痛小便不利真武湯（百三十九）若六七日腹脹不大便急下之小承氣湯（或用大承氣湯（六十六七））

腹痛謂

傷寒腹痛要消詳有虛有實有陰陽太陽下之因腹痛桂枝加芍甚加黃少陰腹痛洩利重四逆頻加芍藥湯虛痛建中論老少實宜承氣用斟量

腹痛

寒

少陰｜｜泄利手足厥逆脉微欲絕不惡寒面色赤裏寒外熱通脉四逆湯加芍藥（二百二十四）

少陰病四逆或欬或悸或

寒熱

傷寒胸中有邪中有邪痛欲

此上

實

六七日不大便｜脹滿而｜急

○坤為腹純乎陰也故太陰病則為腹痛自利脉弦微手足溫而不渴此內寒也故可溫之少陰泄利厥逆脉

小便不利或泄利下重四逆散｜中｜者加附子（百三十二）

少陰病逆逆或利而嗽四逆加五味子乾姜湯（百九十）

少陰病二三日至四五日｜｜小便下利四肢沉重疼痛自下利者此有水氣或欬或嘔或小便利真武湯

本太陽病醫反下之因尔｜滿時｜屬太陰小建中湯

熱下寒也黃連湯（七十六）

陽脉濇陰脉弦法當｜中急｜先服小建中湯不姜者与小柴胡去黃芩加芍藥湯

下之大小承氣湯（六十六七）

大實痛者桂枝加芍藥湯

微不渴亦內寒明矣若關脉沉實大便硬臍腹痞悶喘滿疼痛者則當下之若時痛時止乃病發於陰下之早因尔腹痛亦未可遽下且与小建中湯溫之

動悸九証

水氣承心振寒而悸茯苓甘草湯（百十九）傷寒二三日心中悸而煩小建中湯（五八）發汗臍下悸欲作奔豚自有本條發汗過多心下悸欲得按者桂枝甘草湯（二）發汗出仍發熱心下悸身瞤動振振欲擗地真武湯（百三十九）脉結代心動悸炙甘草湯（百十六）少陽不可發汗汗則讝語此屬胃胃不和故悸小柴胡湯（四十三）中風往來寒熱或心下悸小柴胡湯（四十三）厥而心下悸悸者怔忪也宜先治

水（茯苓甘草湯（百十九））次治其厥（自有本條）

動悸謌

悸動元來有九證臍下奔豚桂棗苓汗後發熱身瞤動真武湯功可准憑煩悸小柴和胃府水乘心悸伏苓行

動悸

汗後

發少陽汗則譫語——小柴胡湯（四十三）

汗後悸欲作奔豚茯苓桂甘大棗湯（百廿一）

汗過多心下悸欲得服桂支甘草湯（二）

汗出仍發熱心下悸身瞤動欲僻地真武湯（百三十九）

水氣

水氣承心振寒而悸茯苓甘草湯（百九）

厥而心下動悸者怔忡也先治水茯苓甘草湯

脉代

脉結代心——炙甘草湯（百十六）

○動悸即怔忡心動惕而不安也其由有三一為氣虛二為停水三為汗多氣虛神弱心不自持一也水氣承心心火思水二也汗為心液心去心空如魚无水三也各隨証以療之

奔豚（所以多用桂者以桂能泄奔豚故也）

從小腹上衝心者（桂支加桂湯十四）太陽病下之後氣上衝者（桂枝湯（二）若不上焦不可与也）發汗後臍下悸者欲作奔豚（茯苓桂甘大棗湯（百廿一））吐汗下後心下逆滿氣上衝胸起即頭眩其脉沉緊發汗則動經身振振搖者（茯苓桂甘白朮湯（百廿二））

（二十二）

奔豚謌

奔豚小腹上衝心桂枝加桂却為林汗吐下後心逆滿氣上衝胸轉不經頭眩六脉兼沉緊更加發汗動經深身若振振動搖者茯苓桂朮可宜行

奔豚

衝心

傷寒或因燒針腎氣逆上發為——欲衝心者桂枝加桂湯（十四）

太陽病下之後氣上衝者桂枝湯若不上衝不可与也

汗吐下後

發汗後臍下悸欲作——茯苓桂甘大棗湯（百廿二）

吐下後心下氣逆滿氣上衝胸起即頭眩其脉沉緊發汗則動經身振振搖者茯苓桂甘白朮湯（百廿二）

○奔豚者腎之積也其人素有腎積因傷寒之邪攻衝下焦致其發動所以如江豚之奔衝或因汗吐之後心氣虛而攻動腎積也多用桂者以其桂能泄奔豚茯苓能伐腎邪也臍下有動氣亦曰奔豚

協痛

傷寒表裏有水或熱邪偏注多令脇痛乾嘔微利發熱而咳脇痛表有水也（小青龍加茯苓湯三十八）表証罷身涼乾嘔脇痛裏有水（十棗湯百八）不可妄投量其虛實往來寒熱（小柴胡湯加茯苓或去棗加牡蠣四十三）身涼兩脇利痛此熱攻注於脇也（膝氣散局方）或結而成塊或走入脾間作痛五磨飲子（局方）

脇痛謌

乾嘔微利欬發熱表水青龍加有訣身涼表罷咳脇疼裏水十棗功尤竭往來寒熱脇疼時小柴亦有加減法身涼脇刺熱攻注五磨膝氣尤為切

氣痛（即動氣）

傷寒氣痛有四證俱不可汗所謂左右上下築觸動氣是也在左汗之則頭眩汗不止筋惕肉瞤此為逆也難治先以防風（白朮牡蠣湯百六十七）次以（建中湯五十八）在右汗之則衄而渴也煩飲水則吐先以（五苓散百六九）次以（桂枝湯十五）在上汗之則氣上衝心端（李根湯百六三）在下汗之則無汗心中大煩骨節痛目運惡寒食即反吐穀不得入先以（大橘皮湯百六八）吐止次（小建中湯五十八）

動氣謌

上下左右動氣者不可汗而不可下汗後筋惕肉瞤時十病決然九死也

舌上白胎（凡丹田有熱也）（藏結舌上胎滑自有本條）

脉陰陽俱緊口中氣出唇口乾燥足冷鼻中涕出舌上胎滑者勿妄治也到七八日以來微熱手足溫為欲解或八日已上反大熱者為難治小惡寒者必欲嘔也（不柴胡去半下加人參括樓湯四十九）腹中痛者必欲利也（聖中丸百四八）陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反惡熱身重若下則胃中虛客熱熏鬲心中懊憹舌上白胎者（梔子豉湯吐之八十八）脇下鞕滿不大便而嘔舌上白胎者亦屬陽明（小柴胡湯四十三）胃氣和汗出而解