眴音縣　瞑音冥　鼾下日切　噤音禁

痰痰上胡計切下子朋切　怔忡上音征下音忡　塘音唐　嗄所訝切

痊充至切　挛力全切　鴆許酷切　懊憹工於刀切下奴刀切

諄朱倫切　佛音弗

活人書括指掌圖卷之六

類編活人書括卷之七

藥評　各評新增諸括

○諸承氣湯大柴胡湯（湯寒忌原元子藥附）

大便鞕十餘日看證可下則用大柴胡湯下之以過經其人氣稍虛當不者用大柴胡則穩恐承氣湯太緊病人不禁

又云凡大便秘而妨悶恐尚有表證者亦須少々飲小承氣湯微解之切不可過多令勿太洩也

傷寒論湯明病不大便六七日恐有燥屎欲知治法少與小承氣湯腹中轉失氣者此有燥屎也乃可攻之若不轉失氣者此先鞕後溏也切不可攻々之必腹脹不能食也潮熱條云設當行大承氣湯亦須先與小承氣湯不轉失氣者不可攻也

諸語發潮熱脉滑而疾者小承氣湯主之飲小承氣湯一升若轉失氣者更飲一升若不轉失氣者勿更與也仲景無治法活人書用小柴

胡湯明日又不大便脉反微濇者裏虛也此為難治仲景無治法活人書用黃耆建中湯

傷寒有承氣之戒又問轉藥熱緊答曰大承氣最緊小承氣次之調胃承氣湯又次之大柴胡湯又次之仲景云湯滌熱積皆用湯液不得用元子藥不可不知也調胃承氣湯有芒硝句故和五小承氣為上也[illegible]中有芒硝者為緊无者次之

大柴胡又一證傷寒發熱汗出不解心下痞鞕嘔吐而利非大柴胡不可也此非是有陽明證而嘔又非霍亂利謂之太陽大柴胡證也故可下之

血證中別有桃仁承氣湯血證有本條

大小承氣湯謌

傷寒凡下要精專極熱心煩不惡寒腋下掌中頭汗出時潮濕語苦雖便下焦轉矢圓多燥脉滑承氣小為先大滿大實被火病脉沉實而腹疼連胃間宿穀并煩躁脇熱膽便血又鮮能食便澁時膹脹大承氣劑悉皆痊

調胃承氣湯謌

太陽不解脉沉時振慄還生汗泄沛倘脉陽微宜再汗陰微可下莫生疑蒸蒸發熱二三日陰脉微時欲下之讝語鞕便調脉順鬱煩滿痛便當施

大柴胡湯謌

熱多寒少鬱微煩心下仞兼急嘔干假使過經渴微痞大柴胡下悉能寬

桃仁承氣湯　抵當湯謌

太陽邪熱結膀胱病者精神略似枉少腹結來誠痛急表罷桃仁承氣湯

邪氣傳裏微沉脉發狂熱結在膀胱少腹鞕滿有瘀血可下宜投

抵當湯

○小柴胡湯論

近時多行小柴胡湯不問陰陽表裏皆令服之此藥差寒不宜輕用雖不若大柴胡承氣之緊要之藥病不相投其為害一也

傷寒五六日嘔而發熱者小柴胡證具而以他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆得湯必蒸蒸而振發熱汗出而解

小柴胡湯謌

少陽一證小柴胡藥性差寒仔細推勞復熱潮仍可覓傷寒和解效而殊

○大青龍湯

大青龍證脉似桂枝反无汗病似麻黃反煩燥是也脉弱有汗為桂枝証脉緊不煩躁為麻黃大青龍湯治病與麻黃湯證相似但病尤重而又加煩燥者用大青龍湯也以其中風并傷寒俱盛故青龍湯添麻黃又合以桂枝湯藥味在內更加石膏所以為紧此治榮衛俱病若證不審誤用大青龍湯則發汗多傷人以其有煩燥一証故可用大青龍也大抵感外風者為傷風感寒冷者為傷寒故風則傷衛寒則傷榮桂枝主傷衛麻黃主傷榮大青龍主榮衛俱傷也風傷衛者病在皮膚之間已以衛行脉外為陽主外皮膚之間衛氣之道路故也其病淺寒傷榮者寒氣中於肌肉也以榮行脉中為陰主內肌肉之間榮氣之道路故也其病深所以桂枝與麻黃所施各異戒勿誤用以有淺深之別風寒之殊太医當宜審諦大青龍尤宜戒用仲景云脉微弱汗出惡風者不可服青龍服之則厥逆筋楊肉瞤此為逆也宜服真武湯仲景特設此藥以救之

大青龍湯謌

風寒俱見大青龍榮衛皆傷乃可攻汗出惡風脉微弱投之一一逆為凶

○白虎湯

證治論云白虎湯性涼惟夏至後可用謂如地土七八月猶熱處有肚熱為病相度尚可用白虎湯服之自然汗解然白虎湯用石膏故亦治傷寒不專只治暍也或問孫兆曰杜壬張翼皆言夏月若東見麻黃桂枝證亦豈得不用而用白虎也兆曰此說尤妙但臨時看證用之假如虛弱人老人不可亦用白虎也蓋白虎性涼耳若得之下利腹痛者可勿服改服小柴胡也

活人書云或問夏至後皆可行白虎湯耶答曰白虎湯治中暍并汗後一解表藥耳非正傷寒藥也今之医諸見六月中病多云中暍不辨熱病用藥太涼況夏日陰氣在內最難調治白虎湯尤宜戒之

評曰證治論云白虎用石膏亦治傷寒不必專治暍也活人書云白虎湯右中暑并汗後一解表藥耳朱肱作活人書後序云夏月納陰在內不可食熱乃君子秋陰養陽之時也此間又云陰氣在內禁用涼藥已上所說多不同大抵隨時審證當用即用不可執一說也

白虎湯謌

中暍汗之堪解表藥性寒涼恐不經老弱脉虛寧勿服故將白虎號湯名

○麻黃桂枝湯 服枝湯立者其後必吐膿血出証治論服麻黃湯發煩目瞑翻者必衄出活人書

頭疼發熱汗出惡風宜桂枝湯之類應解散而用桂枝者頭疼發熱无汗惡寒宜麻黃湯之類應解散而用麻黃者二者均為解散正分輕重不可不察也仲景云無汗不得服桂枝有汗不得服麻黃古人有汗者當解肌無汗者當發汗

評曰等是太陽尚有差別有況不分陰陽而用藥乎當汗而下即死當下而汗亦死古人所以云桂枝下咽陽盛則斃謂當下而汗也承氣入胃陰盛而亡謂當汗而下也陽盛者內熱內熱屬裏故當下也誤投桂枝是陽盛即斃也陰盛者惡寒惡寒屬表故可汗也誤投承氣是陰盛而亡也信乎麻黃桂枝大小承氣者死生之係也

麻黃桂枝湯謌

傷寒無汗屬麻黃有汗桂枝可作湯設服脉黃轉煩躁目瞑劇者
衄木防陽盛桂枝行即斃不然嘔逆吐紅漿桂証若逢夏至後石
膏加入桂枝旁

○桂枝石膏湯

傷寒三日外与諸湯不差脉熱仍數邪氣猶在經絡未入藏府者桂枝
石膏湯主之此方可夏至後代桂枝證用若加麻黃可代麻黃青龍
湯用○有汗脉緩為桂枝証無汗脉緊為麻黃証青龍証

○十棗湯

痞證條云脇下痛乾嘔短氣身凉不惡寒汗出無表証者十棗湯乾嘔
證條云身凉汗出乾嘔脇痛不惡寒者此表解裏未和也十棗湯之
有水證條云身凉表証罷欬[illegible]脇下痛者十棗湯
評大抵身凉乾嘔短氣脇痛者當行十棗湯也然雖是表證已澤[illegible]
附之表未解者不可行也藥性太猛切戒輕用

十棗湯謌

頭痛心疼汗孔張嘔而下利痞非常惡寒短氣邪連脇主治濃煎
十棗湯

○聖散子

論病證多變者無如傷寒或有傳者必待傳遍而後已或不傳者病止
在于一經又或有中溫而似之者或有疫氣而似之者如此之類極多
不可以一槩卒治之之要必在察脉以觀其表裏辨證以審其汗下然
後投之以藥疾乃可得而愈也若不能永之於此而以傳授之古方謂
可以愈疾者恐或未然譬法律之設以悁天下有罪者皆不能逃於其
間也追人之情偽千變萬化法律果能盡該載乎東坡居士在黃州日
得巢君所傳秘方名為聖散子不問陰陽二証皆可服之使後人不能
不致疑於其間今觀其序自謂此方用藥似乎不近人情至於救急其

驗特異乃知神物護靈不拘常制則是東坡自知其間用茱萸豆蔻良姜附子之類有陽証者不可服也又言不可與傷寒比者此言何謂耶豈其謂非傷寒然後可服此藥耶且木附豆蔻良姜皆是燥而去溫者恐黃州瀕江地多卑溫而黃之居人所感者豈非中溫而致然耶不尔則是年雨水浸淫而人得此疾所以服此藥而多愈也苟非此而服之果能不誤病者乎又言疫氣流行之時平旦以此藥煮一盆不問老幼貴賤皆令服之則疫氣不入其門東坡所以神此方者恐其用意在此而不在彼也且如疫氣之為病四時所感亦自不同當其未發之前籍此以驅除不祥之氣則有此理若病証已見則便有陰陽之分四時各有治法當隨其證而用之豈可專用此方哉何況令之愚醫不辨方脉感於不問陰陽二證之說以其療諸經傷寒豈不謬哉夫此方在世猶杼柚之有經一成而不可變者也傷寒之於人猶杼柚之有緯生來之變其可窮乎苟有活人之心者不可不以此說而廣之

聖散子論

東坡聖散出瀕黃不問傷寒陰與陽古言醫者人司命潛心玩未活人方

○炮炙煎煮法酌準料例 用藥賣事附

傷寒方內所載衡量皆依漢制與今之輕重淺深不同者蓋隨時更變也若古方大陷胸湯大黃六兩芒硝一升甘遂二錢水六升煮取二升分二服以今用之無乃太甚乎若以漢之五銖錢秤較加以二倍頗與今數合後世以古之三兩為今之一兩則彷彿也若桂枝湯用桂枝芍藥生姜各三兩即今之一兩甘草二兩即今之六錢一字半水七升即今之二升三合半庶可適中如大陷胸湯雖三之取一亦似不倫蓋歷年寖遠傳寫乖訛或分兩少而水數多或水數多而分兩少輕重不等器量頗殊却當視病淺深察藥柔[illegible]以意甚量不可偏執若此甚衆不能枚舉然秤有銖秤有字秤銖秤以六銖為一分四分為一兩字秤以

四字為一錢十錢為一兩若升合者各方謂一升準今之一大白盞也一合二合從此酌量之後之雜方謂水一盞者準今一中盞是乃酌古準今以便修製云 出指常圖

○增補藥品

南陽書謂仲景證多而藥少使皆如仲景調理既正變異不生則麻黃桂枝青龍用之而有餘以後世望聖人難矣此說甚至因採外基千金聖惠等方補而完之今除仲景正方外并於南陽等書擇可用者兼而充之但雜方內藥性峻烈及不循法度者亦不敢取然南陽所載湯劑每服並抄五錢匕恐劑小病大者不能的中今以劑之小大稍加增損餘如群隊和平所投切當以効為期不能較於毫忽也

麻黃 去根節湯泡去黃水焙乾秤用

桂 去麤皮不見火惟妊婦復寒用桂須炒過則不損胎氣也

半夏 湯炮七次妊婦傷寒用之則多炮逾數則不損胎氣

枳實 水浸去穰切碎炒

茱萸 湯炮洗

甘草 炙

桃杏人 用楊浸去皮尖去皮仁者熬炒黃作楊刑生用

枇杷葉 炙刷去毛

蠶蟲 去翅足炒

茴香 微炒

蕘花 熬赤色如元以生桃花代

蜀漆 先去根乃常山苗也

茯苓 去皮

烏頭 包剉

凝水石 即寒水石

代赭 已上諸石作門蛇碎作元斫研

硫黃 研

大黃 鎳絃者以溫帋裹煨

麥門冬 去心

蠶甲 湯皮去裙以帶炙黃

商陸 即章桃根

葶藶 炒祈成膏

芫花 熬

海藻 洗去

大蘗皮 去麤皮

石膏 搥不見鉛

赤石脂 白石脂

龍骨 研

椎黃 研

乾姜 炮

麻子 炒磨去皮取仁

學朴 去[illegible]

水蛭 去[illegible]

瓜蒂 熬黃

巴豆 去心皮熬黑研

牡蠣 熬

龍膽 即草龍膽

附子 包去皮臍每个八片

滑石 搥

禹餘粮 紫石英

丁沉木香 並不見火

礬 枯濁研

甘遂 連珠者以溫帋裹

黃連 去毛

烏侮去核　椒去目及閉口者　防風去芦
人參去芦　羌活去芦　桔梗去芦
前胡去芦　柴胡去苗洗　犀角鎊屑如无以升麻代
釜底煤研篩　竈突墨研篩　梁上塵篩
羚羊角鎊屑　薰陸香即乳香研　午菜即牛蒡根
英粉白粉即米粉也　通草即木通　苦酒即米醋
香豉即淡豆豉　猴鼠矢即雍鼠矢頭尖者是　溺尿同即童子小便也
芒硝朴硝有芦頭者亦得　膠飴即也　阿膠
猪膽汁　雞子黃　麝毛上七味並湯熱土香后小再前三沸令曰服
猪膚諸家所論不同泥安常云去膜如此論之即猪脂膏也膚下安得有膜或有用猪皮者兼木草中不載猪膚桓六尋猪膚解諸毒疑可用風諸莫上墨膚也所以言膚者則膚之二
延胡索去將皮　柴苑去土　陳皮去苑莫
青皮去接　細辛去土　栝蔞根去範皮

[illegible]去皮　秦皮去麄皮　海藻洗去鹹
蒼朮米泔浸去黑皮　旋覆花去皮梗　獨活
百合水洗清去白沫　皂角去女子垢炙　知母
茅花　蘧麥　白微
紫蘇　茵蔯　牛膝並土梗
天南星炮　黃耆炙　梔子壁
連軺却連翹根如無用連翹　白粉即米粉　萎蕤沙黃精而下異所用多言其根
大青用葉或白蕪莖　甘爛水取水大七井置大盆中以豹揚之山有水珠數千瓢相逐取用之
潦水漢書霜潦亦作旁又曰行潦乃水之有声亦兩澤水　溫地黃一斤汁乞者五兩不見大
枳殼即枳實也每二片折一松凡言片者只用一片　熬凡方言熬者都用炒
芍藥味腹下利者多去之或用芍藥先煮一兩沸次下餘藥
動氣者去木加桂以桂能泄齊腎也腎惡燥故去木也　小便數者去桂去茯苓用芍藥　小便不利者用茯苓　太陽病自汗而小便數者不可行桂枝小便條中詳

太陽病無汗而渴者不可與白虎湯　陽明病汗多而渴者不可與五苓散

活人書括論升合分兩

張公度辨次仲景傷寒論云伉存中得漢之權量量六斗六升當今之一斗七升九合其重一兩當今之六銖愚今於紹興斗中二升七合折古之一斗也大略是四分之一耳凡言一升若用二合半則庶幾焉一兩用二錢半恐太少耳升合當用古之法每升一合半分兩當用今之法每兩十文活人書疑三分之一謂如今之一兩折古之三兩也二說大同而小異故兩有之

其間有用藥一劑而用水少者今當只以藥五錢水一盞半為率作服未效有作不可拘於古分兩也利湯欲生宜少水而多取也補湯欲熟宜多水而少取也

煉蜜決　新增

每白蜜一斤入新汲水四兩攪勻用炭火慢熬約消耗去六兩許是蜜成煉若火力熬太過則焦硬難丸火力不及則易烊最宜得中凡以煉蜜作丸藥有輕重燥潤其性不同輕虛乾燥藥末每一斤用蜜一斤堅石滋潤藥末每一斤用蜜半斤此為大約難以准定在乎臨搜和作丸時加減得中為度

類編活人指掌大全卷七