補活人書括指堂圖方卷八

藥方加減例

古人云湯寒有輕重湯劑不可一例用明當隨證加減謂如桂枝加桂湯即本方中加桂若干減者即去桂若干餘皆倣此

桂枝湯 加黃芩各陽旦湯○太陽中風發熱汗出鼻鳴乾嘔

桂枝　赤芍藥　生姜一兩半　甘草一兩　大棗十八枚

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服取汗桂枝湯唯春初可行春末及夏至已前加黃芩夏至後加知母一兩石膏二兩或加升麻半兩若病人素虛寒　加減戒口小便數者及飲酒家不喜甘者切不可行桂枝也

桂枝甘草湯 發汗過多叉手自冒心　下悸欲得安

桂枝一兩三分　甘草六分二字半

升麻　梔子仁各半　大青　杏仁　黃芩各

水一盞半葱白三莖煎至八分去滓溫服

六四 陽毒升麻湯 陽毒赤斑狂言吐腰血

升麻一分　犀角屑　射干　黃芩　人參

甘草各一分　水三盞煎至一盞半去滓分二服

六五 玄參升麻湯 發斑咽痛

升麻　玄參　甘草各半兩

水三盞煎至一盞半去滓服

八六 大承氣湯 胃實嚴語五六日不大便腹痛煩渴少陰口燥咽乾日脯發熱脉實

大黃一兩三分　厚朴二兩六分　枳實即枳殼十半个　芒硝一合

水四升先煮二物取一升七合去滓內大黃煮取一升去滓內芒硝

更一二佛分二服得利止後服

[illegible] 活人書嚴語問中減外臺承氣湯无芒硝尤穩若病經當於个方中除芒硝也

水一升煮取三合半去滓頓服

三 桂枝葛根湯 傷風項背強 有汗不惡風柔痓

桂枝湯內加葛根一兩三錢一字半

四 桂枝石膏湯 熱病 夏至後同桂枝用

桂枝湯內加石膏一兩三錢一字半

雙鐘 桂枝石膏湯 後无白字方名並活人書活內方

桂枝半兩 石膏二兩 黃芩半兩 甘草半兩 梔子四分

升麻 乾葛 生姜已上各三分 白藥子一分安常不用

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分溫服食頃再服若

得汗即停後服也

五 桂枝新加湯 久名桂枝芍藥半夏生姜湯○汗後身痛脉沉

桂枝湯內加人參一兩芍藥生姜各三錢

六 桂枝附子湯 風濕身疼 脉浮虛濇 漏風

桂枝湯加附子一枚

七 桂枝大黃湯 關脉沉實按之痛大便秘

桂枝湯內加大黃一兩三錢一字半芍藥一兩減甘草

八 桂枝人參湯 太陽熱之早忽熱利不止心下痞表裏不解

桂枝一兩三錢一字半 甘草上同 白朮 人參

乾姜各一兩

水三升先煮四味取一升七合內桂更煮一升分三服

九 桂枝括婁乾葛湯 柔痓

桂枝 葛根二錢半 芍藥各三錢 括婁根 甘草各二錢

水二盞生姜七片棗一枚煎至八分去滓服

十 桂枝芍藥湯 即小建中湯 脉浮腹痛

桂枝湯加芍藥一兩

桂枝加芍藥生姜人參湯

桂枝湯中加芍藥半兩　生姜半兩　人參一兩半

石剉如麻豆大每服五錢水一盞酒一盞八分去滓溫服

十一 桂枝二越婢一湯太陽發熱惡

桂枝　芍藥　麻黃　甘草各三分　大棗四枚

石膏二錢一字　生姜四錢一字

水一升七合煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取一升去滓溫分二服

十二 桂枝二麻黃一湯服桂枝後形似瘧日再發得汗必解

桂枝　芍藥四錢半字　麻黃二錢半　甘草三錢一字　杏仁十六个

生姜四錢半字　大棗五枚

水一升二合半先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取六合去滓分二服

十三 桂枝麻黃各半湯太陽脈深緩如瘧○无汗身痒

桂枝五錢二字半　芍藥　甘草　麻黃各三錢一字　杏仁二十四个

生姜三錢一字半　大棗四枚

水一升六合半先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煎至六合[illegible]三服

十四 桂枝加桂湯奔豚留心

桂枝湯內加桂六錢一字半

十五 桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯陳山汝火劫之亡陽登任臥起取安

桂枝　蜀漆各二兩　甘草六錢二字半　牡蠣一兩六錢　生姜一兩

大棗十二枚　龍骨一兩三錢一字半

水四升先煮蜀漆減七合內諸藥煮取一升半去滓分三服

桂枝去芍藥加附子湯

甘草一兩　生姜一兩半　附子半个　大棗六个　桂枝一兩半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

十六 桂枝甘草龍骨牡蠣湯火逆下之因燒針煩躁

桂枝三分一字半　甘草　龍骨　牡蠣各六分一字半

水三升六合煎至一升二合去滓分三服

十七　桂枝加知母石膏升麻湯熱病夏至後用之

桂枝湯內加知母石膏各四錢半升麻三錢

十八　桂枝加厚朴杏子湯太陽下之微喘者表未解也

桂枝湯內加杏仁二十一箇厚朴半兩溫服覆取微汗

十九　桂枝去桂加茯苓白朮湯服桂枝或下後不解背滿小便不利

芍藥　茯苓　白朮各二分　甘草一分

水一盞半生姜三片棗一枚煎至八分去滓服小便利則愈天苓利小便

二十　麻黃湯太陽脉浮頭疼發熱惡寒身痛無汗而喘

麻黃一兩　桂枝六分二字半　甘草三分一字半　杏仁五十个

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服覆取汗蓋

麻黃湯性熱唯冬及春兼病人素虛寒者乃用正方　至之後服之

必發熱黃須加知母半兩石膏一兩黃芩一分

二十一　麻黃葛根湯太陽發熱無汗惡寒　同屋

麻黃　赤芍藥各三分　乾葛三分半　豉半分

水二盞葱白一莖煎至八分去滓服

二十二　麻黃升麻湯大下後脉沉遲尺脉不至咽喉不利唾膿血厥逆泄利不止者為難治

麻黃八分一字　升麻　當歸各四分半字　知母　黃芩

姜蕤各二分半　石膏　白朮　芍藥　天門冬

桂枝　茯苓　甘草　乾葛　字半

水三升三合先煮麻黃杏二沸去　沫內　取一升半分三服

次第令盡汗出愈

二十三　麻黃杏子甘草石膏湯太陽汗後

麻黃一兩三分一字半　杏仁五十个　甘草六分二字半　石膏一分六分

水二升三合半先煮麻黃減六合去上沫內諸藥煮取八合分二服

廿四 麻黃知母石膏湯 太陽无汗夏至後服

麻黃湯內加知母半刃石膏一刃

廿五 麻黃連軺赤小豆湯 傷寒痰熱在裏身必齊黃中濕身痛身目皆黃

麻黃 連軺 甘草 各六錢二字半 生梓白皮 杏仁 四十个

大棗 一十枚 生姜 一刃 赤小豆 各一刃六錢二字

潦水三升三合半先煮麻黃再沸去上沫內諸藥煮取一升分三服

半日盡

廿六 麻黃附子細辛湯 少陰發熱脉沉微汗之

麻黃 細辛 各六錢二字半 附子 一个

水三升三合半先煮麻黃減七合去上沫內諸藥取一升分三服

麻黃甘草附子湯 少陰无表裏証

麻黃 三刃 甘草 一刃 附子 一个

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服相次三刃

服以身微汗為度

廿七 麻黃杏仁薏苡甘草湯 風濕相搏一身盡痛

麻黃 薏苡仁 各半刃 甘草 二錢半 杏仁 十个

水三盞煎至一盞半去滓分二服避風微汗

廿八 越婢湯 風痺脉弱

石膏 一刃 白朮 半刃 附子 半个 麻黃 七錢半 甘草 二錢半

分三服每用水一盞半生姜三片棗一枚煎至八分

廿九 茯苓白朮湯 溫〻

茯苓 乾姜 甘草 白朮 桂 各一錢半

水二盞煎至八分去滓服

三十 葛根湯 太陽无汗惡風 剛痓 太陽〻明合病

葛根 一刃三錢一字半 桂 芍藥 甘草 各六錢二字

麻黃 生姜 各六刃 大棗 十二枚

水三升三合半先煮麻黃葛根減七合去上沫內諸藥煮取一升四合分三服微似汗

葛根湯 風溫脉浮身重汗出

石膏一兩　葛根二兩　生姜　升麻　大青

龍搭　桂枝　甘草　麻黃　芍藥已上各半兩

姜蕤一兩

石剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服

葛根解肌湯　發熱而渴

卅一 葛根半兩　黃　苓　芍藥　麻黃二錢　甘草

桂各一錢半

水三盞半束二个煎至二盞分二服如脉浮再服取汗

卅二 葛根葱白湯已汗未汗頸痛

葛根　芍藥　知母各三錢　川芎　生姜各六錢

葱白一兩

水三盞煎至一盞半分二服

卅三 葛根橘皮湯溫毒發斑心煩嘔逆

葛根　橘皮　杏仁　知母　黃芩

麻黃　甘草各一錢

水一盞半煎至八分去滓服

卅四 葛根黃芩黃連湯太陽中風慢下之脇熱利不止

葛根一兩　黃芩　甘草各二錢　黃連三錢

水三　煎至一盞半去滓分二服

卅五 葛　夏湯太陽二明合病不下利但嘔者

葛根二錢　半夏　麻黃各一錢半　甘草　桂枝

芍藥各一錢

水二盞生姜五片棗子一枚煎至八分去滓服取微似汗

卅八 大青龍湯 傷寒見風多脈見太陽无汗脈浮緊煩躁可服之脈无見汗出不可服

麻黃二兩　桂枝　甘草六錢二字半　杏仁四十个　生姜一兩

大棗十二枚　石膏二雞子大

水三升煮麻黃減七合去上沫內諸藥煎至一升去滓服取微以汗汗出多者溫粉撲之一服得汗止後服

卅九 大青龍加黃芩湯 太陽无汗惡風煩躁夏至後用

本方內加黃芩六錢二字半

卅八 小青龍湯 太陽表未解心下有水氣乾嘔發熱而欬或一或

麻黃　芍藥　細辛　乾姜　甘草

桂枝各一兩　五味子半夏各八錢二字

水三升三合半先煮麻黃減七合去上沫內諸藥煮取一升去滓溫服

小青龍去半夏加栝樓 表不解渴有水氣

本方中去半夏加栝樓根一二分

小青龍湯加蕘花湯 嘔微利熱欬為表有水

本方中加蕘花如彈子大

卅九 小青龍去麻黃加杏子湯 太陽汗後飲水多咳而喘

本方內去麻黃加杏子仁一兩

四十 小青龍去麻黃加茯苓湯 太陽咳敕表不解心下有水小便不利

本方內去麻黃加茯苓一兩

四一 小青龍去麻黃加附子湯 水寒相搏咳逆

本方內去麻黃加附子半兩

四二 大柴胡湯 內實大便雖身熱不惡寒反惡熱

柴胡一兩六錢二字半　黃芩　芍藥各一兩　半夏八錢

枳實四枚即大者八片　大黃六錢二字半　生姜一兩六錢二字半　大棗十枚

水四升煎至二升去滓再煎三五沸分三服一方加大黃一倍

四三 小柴胡湯 傷寒四五日往來寒熱胸滿心煩喜嘔風溫身熱少陽發熱

柴胡二及六錢二字半　黃芩　人參　甘草各一兩
半夏八錢一字　生姜一兩　大棗十二枚
水四升煎至二升去滓再煎至一升分三服

四四　小柴胡加茯苓湯小傳雖潮熱腹痛
本方內加茯苓一兩

四五　小柴胡去黃芩加芍藥湯下後陰弱生熱脉微惡寒
本方去黃芩加芍藥二兩

四六　小柴胡去黃芩加茯苓湯嘔而發熱胷脇滿小便不利
本方去黃芩加茯苓一兩二錢一字半

四七　小柴胡去棗加牡蠣湯水結胷
本方內去棗加牡蠣一兩三錢一字半

四八　小柴胡參棗生姜加五味子乾姜湯少陽寒熱胷滿或泄
本方內去參棗生姜加五味子八錢一字乾姜六錢

四九　小柴胡去半夏加人參括婁湯發熱而渴
本方內去半夏加人參半兩括婁實一枚

五十　小柴胡加桂湯身熱欲近衣　身熱不渴
本方內去人參加桂一兩

五一　小柴胡加五味子湯溫病發熱而渴不惡寒欬者
本方內加五味子半兩

五二　小柴胡加乾姜牡蠣湯痞而胷脇滿脹
本方內加乾姜半兩牡蠣六錢

五三　柴胡桂枝湯風溫汗後身熱　病而心下妨悶　動氣
柴胡一兩二錢一字半　桂枝　黃芩　人參
芍藥各半兩　甘草　半夏各三錢一字　生姜半兩
水六盞棗六枚煎至三盞去滓分三服

五四　柴胡桂姜湯往來寒熱胷脇滿小便不利嘔而不渴

柴胡二兩六錢二字　桂枝　黃芩各一兩　乾姜
甘草　牡礪各六錢二字半　栝蔞根一兩三錢一字
水四升煮取二升去滓再煎取一升半分三服

五五 柴胡龍骨牡礪湯 傷寒八九日下之胷痛頭鬱小便不利驚悸火劫驚狂亡陽煩躁卧起不安一身盡痛
柴胡一兩三錢一字　龍骨　桂枝　鉛丹
人參　黃芩　茯苓　牡礪各半兩　半夏四錢半字
大黃六錢二字半　生姜半兩　大棗六枚
水二升六合半煎至一升三合半內大黃更煮沸去滓溫分三服

五六 敗毒散 疫癘四時通用 傷風有汗夏至後用 風溫身腫体痛惡風
羌活　獨活　前胡　柴胡　芎藭
枳殼　白茯苓　桔梗　人參已上各一兩　甘草半兩
右為細末每服二錢水一盞入生姜二片煎至七分溫服或沸湯點
亦得治傷寒溫疫風溫風眩拘睠風痰頭疼目眩四肢痛憎寒壯熱
項強睛疼及老人小兒皆可服或瘴煙之地或溫疫時行或人參
痰或處卑溫脚弱此藥不可闕也日三二服以知為度

五七 黃耆建中湯 傷寒身痛天脉遲 汗後貞原時渴
黃耆　桂各一錢半　白芍藥二錢　甘草一錢
五錢姜五片棗二枚煎至八分去滓入調湯一大匙再煎服舊有
溏或嘔者不相餳

五八 小建中湯 即桂枝芍藥湯 少陰惡寒手足跑而溫 傷寒二三日心中悸而顫
桂枝　甘草各一兩　芍藥二兩　大棗十二枚　生姜六錢二字半
餳三合半舊微溏或嘔者去餳
水二升三合半煮取一升去滓內餳微火今烊分三服

五九 小續命湯 二室通用
甘草半兩　麻黃半兩　防風一分半　芍藥　白朮
人參　川芎　附子生　防己　黃芩已上各一分

桂枝 半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服二朶痓自汗者去麻黃

六十 小續命加姜汁湯 脚氣寒中三陽

煎湯成去滓入生姜自然汁一匙再煎一沸服

小續命去附子減桂一半加芍藥一倍湯

謂如元用芍藥一分今加一倍足成半兩是熱證多者宜用此

六一 小續命去附子減桂一半湯

本方去附子減桂一半 脚氣暑中三陽所患必熱

六二 升麻葛根湯 無汗惡寒 變方通用 發斑 小兒蒼麥

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等分

每服六錢水一盞半煎至八分去滓服寒多即熱服熱多即溫服

六三 升麻六物湯 口瘡赤腫

V
G133.761
H85

六七 小承氣湯 六七日不六便腹脹滿一陽明無表証 汗後不惡寒朝熱狂言而漏
大黃一兩三錢一字半 厚朴六錢五字 枳實大者六半个
水一升三合半煮取六合去滓分二服得利止後服

六八 調胃承氣湯 太陽陽明不惡寒反惡熱大便從譫語嘔
大黃六錢 水二字半 清酒洗 甘草三錢一字 芒硝一合
水一升煮取二合半去滓內芒硝微煎溫服

六九 桃仁承氣湯 外已解小腹急大便溫小便不利血證也
桃仁五十个 桂枝 芒硝 甘草各六錢二字半 大黃一兩三錢一字半
水二升三合半煮取一升二合去滓內芒硝微煎分五服

七十 白虎湯 汗後脉洪大而渴 虛煩 中暍
知母二兩 甘草六錢一字半 一石膏三兩三錢一字半 粳米二合
水三升三合半煮米熟去滓分三服

七一 白虎加人參湯 又名化物湯 赤脚 口燥煩渴 中暍
白虎湯內加人參六錢二字半

七二 白虎加蒼朮湯 溫溫 疫疠 秋感熱
白虎湯內加蒼朮二兩增水作四服

七三 黃芩湯 湯垢協熱利 太陽少陽合病下利
黃芩一兩 芍藥 甘草六錢二字半 大棗十二枚
水三升三合半煮取一升去滓分三服嘔者加半夏八錢姜一兩增
水作四服

七四 黃芩芍藥湯 卹後脉微
黃芩湯內不用大棗

七五 黃芩半夏生姜湯 乾嘔而利
黃芩湯內加半夏八錢一字生姜半兩

七六 黃連湯 腹滿痛天便秘 胸中有熱腰痛欲嘔
黃連 甘草 乾姜 桂枝各一錢 人參六錢二字半

半夏入分一字　大棗十二枚

水三升三合半煮取二升去滓分五服日三服夜二服

七七 黃連阿膠湯 溫毒下利膿血

黃連一兩三分一字半　黃芩二分一字半　芍藥六分二字半　阿膠一兩

鷄子黃二枚　水一升七合先煮三物取七合去滓內膠烊盡

小今內鷄子黃攪勺分三服

七八 黃連鷄子湯 少陰煩躁不得卧

與黃連阿膠湯同

七九 黃連橘皮湯 溫毒發斑 下部生瘡

黃連二分　陳橘皮　杏仁　枳實各一分　麻黃

葛根各二分半　厚朴　甘草各一分

水三盞煎至一盞半去滓分二服

八十 黃連龍骨湯 少陰脉沉胫痛咽痛苦煩休酒有熱

黃連一兩　黃芩　芍藥各一分　龍骨半分

分三服每服水一盞半煎至八分去滓服

八十一 黃連犀角湯 鉱感

黃連半兩　犀角一兩如无升麻代之　烏梅七分　木香一分

水二大盞半煎至一盞半去滓分三服

八十二 黃連解毒湯 大熱乾嘔錯語神吟不得眠

黃連一分　黃芩　黃蘗各半兩　梔子四分

水二盞半煎至一盞半去滓分二服

八十三 酒煮黃連丸 暑毒發熱而損不惡寒嗽者

黃連四兩以尤灰好酒浸面上過二寸重湯煮乾焙

為細末麪糊丸如梧桐子大每服五十丸熟水下

黃連一物湯

右以黃連一物濃煮汁服

八四 蜜漬黃蘗汁 口瘡赤爛

以黃蘗去麄皮蜜漬一宿旋旋嚥汁或用蜜炙微焦碾

末用半錢搽口中亦佳

八五 竹葉湯 陽明汗多而渴 差後渴 劇而渴欲飲水水入口吐

石膏二兩八分一字 麥門冬一兩半 人參 甘草各三分一字

半夏四分半字 竹葉二兩

水二升半煮取一升半內粳米一合再煮米熟湯成去滓入生姜自然汁三匙再煎一沸服神

八六 竹葉石膏湯 與竹葉湯方証同

八七 梔子仁湯 發狂煩躁面赤咽痛熱潮

梔子仁 赤芍藥 大青 知母各一分 升麻

黃芩 石膏 杏仁各一分 柴胡一分半 甘草半分

豉一百粒 水三盞煎至一盞半去滓分二服

八八 梔子豉湯 吐下後心懊 大下後身熱不去心中痛結

肥梔子四枚 香豉半兩

水二盞先煮梔子至一盞豉同煮至七分去滓服得吐止若服

八九 梔子蘗皮湯 溫家發黃 傷寒發黃

梔子四枚 黃蘗皮四分 甘草二分半

水一盞半煎至七分去滓服

九十 梔子厚朴湯 大陽下後腸脹即起不安

梔子十四枚 枳實四枚 厚朴一兩三分一字半

水一升煮取半升去滓分二服得吐止後服

九一 梔子升麻湯 虛煩不止 三月至夏至前謂之晚發可服

生地黃汁一兩六分 梔子三十 升麻三分 柴胡半兩

石膏半兩

水四盞煎至二盞半去滓分三服

九二 梔子乾姜湯 鹽以丸藥下之身熱不去

梔子十四枚 乾姜六分二字半

水一升二合煮取六合去滓分二服

九三 梔子烏梅湯 傷寒差後不得眠

梔子 黃芩 甘草各一分 柴胡二分 烏梅肉二个

水一盞半生姜三片竹葉二七片豉五十粒煎至八分

九四 枳殼梔子湯 芳復發熱

枳殼一枚 肥梔子三枚 豉一兩

清漿水二盞半空煮退八分內二藥煎取九分下豉煎去滓服覆令汗出

九五 枳殼梔子大黃湯 食復發熱

於前方內加大黃如博碁子大五六枚同煎服

九六 茵蔯湯 黃疸 頭汗出欲發黃

茵蔯蒿半兩 大黃三分 肥梔子三枚半

水三升三合半先煮茵蔯減一半內二味煮取一升去滓分三服小便利出如皂角汁一宿腹減黃從小便出也

九七 茵蔯五苓散 疫病秋感熱發黃瘴 頭汗出欲發黃

茵蔯蒿末一兩 五苓散半兩

和勻每服二錢食前米飲湯調服或濃煎茵蔯湯調五苓散

九八 茵蔯梔子黃連三物湯 大便自利而黃

茵蔯蒿三分 梔子 黃連各二分

水二盞煎至八分去滓服

九九 知母麻黃湯 差後昏沉

知母三分 麻黃 甘草 芍藥 黃芩各一分

桂枝半分 水三盞煎至八分去滓服取微汗

一百 知母葛根湯 風溫身灼熱

知母一錢半　乾葛四錢　石膏三錢　甘草　木香
升麻　黃芩　南星　人參　防風
杏仁　芎　羌活各一錢　姜蚕二錢半　麻黃二錢
每服七錢水二盞煎至八分去滓服

百一 大陷胷湯 大結胷
大黃一兩　芒硝八字二字　甘遂末一字半
水二升先煮大黃至七合去滓內芒硝煮一二沸內甘遂末分三服
得利止後服此藥大峻不可輕用若不得已即用大陷胷元也

百二 小陷胷湯 小結胷
黃連三錢一字　半夏八錢一字　括蔞實大者一个
水二升先煮括蔞取一升去滓內諸藥煮取七合分三服

百三 大陷胷丸 結胷項強如桑痓狀下之則和
大黃一兩六錢一字半　葶藶　芒硝　杏仁各二錢三

上三味為細末內杏仁芒硝合研如脂丸如彈大一枚別搗甘遂末一字白蜜半合水七合煮取三合半溫頓服之一宿乃下如不下更服取下為効

百四 抵當湯 血結胷譫語　瘀血狂言小腹滿漱水不發熱
水蛭　䗪蟲各三十个　桃仁二十个　大黃一兩
水三盞煎至一盞半去滓分二服

百五 抵當丸 當汗失汗熱毒深入吐血　身黃喜忘發狂　瘀血
水蛭七个　䗪蟲八个　桃仁七个　大黃一兩
為末分作四丸水一盞煮一丸取七分盞溫服當下血未下再服

百六 陽旦湯 即桂枝湯加黃芩一兩　春末夏至前可服

百七 陰旦湯 身大熱欲近衣此內寒外熱
芍藥　甘草各二錢　乾姜　黃芩各三錢　桂枝四錢
大棗一枚　水三盞煎至一盞半去滓分二服取小汗

百八 四逆湯 太陰自利不渴 陰証脉沉身痛

附子一枚生去皮作八片 甘草六錢二字半 乾姜半兩

水一升煮取四合去滓分二服強人可大附子一枚加乾姜半兩

百九 四逆散加五味子乾姜湯 少陰四肢厥逆或泄利而嗽

甘草 枳殼 柴胡 芍藥各一兩 五味子

乾姜各半兩 為細末每服一錢米飲調下

百十 茯苓四逆湯 汗下後煩躁不得眠

茯苓二兩 人參三錢二字 附子一枚生去皮作八片 乾姜半兩

甘草六錢二字半 水一升七合煮取一升去滓分三服

百十一 當歸四逆加茱萸生姜湯 下之厥逆

當歸 桂枝 芍藥 細辛各一兩 通草

甘草各六錢二字半 茱萸三錢 生姜六錢

水六盞煎取三盞分三服

百十二 四逆散 少陰四逆或痰或悸或小便不利或腹痛

甘草 枳殼 柴胡 芍藥各半兩

為細末每服二錢米飲調下嗽加五味子乾姜悸者加桂腹痛加附子泄利重者加濃煎雞白湯

百十三 四逆加茯苓散 少陰小便不利

四逆散加茯苓半兩

百十四 甘草乾姜湯 少陰少便色白病形悉具而渴 吐逆 動氣下之反劇身雖有熱反欲倦

甘草 兩 乾姜半兩 水二盞煎取一盞分二服

百十五 甘草附子湯 風溫小便不利大便反快

甘草 白朮各三錢二字一 附子 枝 桂枝六錢半

水煎每服五錢得微汗解出汗身脉者加防風悸氣小便不利加茯苓悸氣即動氣也

百十六 炙甘草湯 一名復脉湯 脉結代心動悸

甘草一兩二分 人參六分二字 生地黃半兩 桂枝 麻子仁
麥門冬各一兩 阿膠六分二字
水酒合五升生姜一兩大棗十二枚清酒二升三合水二升七合煮
取二升去滓內膠烊盡分五服

同上 芍藥甘草湯 自汗出小便數
芍藥 甘草各三分 水二盞煎至八分去滓服

百三 芍藥附子甘草湯 汗下後惡寒
芍藥 附子 甘草各三分
水二盞煎至八分去滓服

百八 陰毒甘草湯 陰毒
甘草 升麻 當歸 桂枝各一分 雄黃
蜀椒各一分半 鱉甲三分
水一盞煎至八分去滓服如人行五里更進一服溫覆取汗毒當從
汗出未汗再服

百九 茯苓甘草湯 自汗不渴 水氣厥心振寒而慄
茯苓 桂枝各二分 甘草一分 生姜三分
水一盞半煎至八分去滓服

百十 小半夏茯苓湯 太結胸
半夏四分 赤茯苓三分
水二盞煎至八分去滓入生姜自然汁半盞再煎一二沸

百十一 茯苓桂甘大棗湯 汗後臍下悸欲作奔豚
茯苓二兩六分二字半 甘草六分二字半 桂枝一兩三分一字半
大棗一五分 甘爛水 說見制衣藥例
三升三合先煮茯苓減六合內諸藥煮取一升去滓服三合

百十二 茯苓桂甘白朮湯
兩三分一字半 桂枝一兩 白朮 甘草各六分二字