先生姓汪氏名機字省之別號石山世居徽祁之朴墅早歲習春秋補邑庠弟子員性至孝因思事親若不可不知醫復精于醫賴以存活者衆鏡山李先生別傳詳矣所著有素問抄　推求師意　外科理例運氣易覽瘍治理辨石山醫案針灸問對諸書若干卷行于世先生〻于天順癸未九月十六日酉時歿嘉靖己亥十二月初四日戌時

嘉靖辛丑五月朔旦　[illegible]

# 石山醫案卷之一

門生石墅陳桷惟宜較勘刊行

## 孝衛論

丹溪論陽有餘陰不足乃據理論人之禀賦也蓋天之日爲陽月爲陰人禀日之陽爲身之陽而日不虧禀月之陰爲身之陰而月常缺可見人身氣常有餘血常不足矣故女人必須積養十四五年血方足而經行僅及三十餘年血便衰而經斷陰之不足固可驗矣丹溪揭出而特論之無非戒人保守陰氣不可妄耗損也以人生天地間營營於物役役於事未免久行傷筋久立傷骨久坐傷腎久視傷神久思傷意凡此數傷皆傷陰也以難成易虧之陰而

日犯此数傷欲其不夭枉也難矣此丹溪所以立論嘗戒
于後也非論治陰虛之病也若遇有病氣虛則補氣血虛
則補血未常專主陰虛而論治且如產後的屬陰虛丹溪
則曰右脉不足補氣藥多于補血藥左脉不足補血藥多
于補氣藥丹溪固不專主于血矣何世人昧此多以陰常
不足之說橫于胸中凡百諸病一切主于陰虛而于甘溫
助陽之藥一毫不敢輕用豈理也哉雖然丹溪謂氣病補
血雖不中亦無害也血病補氣則血愈虛散是謂誅罰無
過此指辛熱燥烈之劑而言亦將以戒人用藥寧可失于
不及不可失于太過蓋血藥屬陰而柔氣藥屬陽而剛苟
或認病不真寧可藥用柔和不可過于剛烈也書曰罪疑
惟輕功疑惟重本草曰與其毒也寧善與其多也寧少之
意正相合也雖然血虛補氣固爲有害氣虛補血亦不可
謂無害吾見胃虛氣弱不能運行血越上竅者多用四物
湯涼血之藥反致胸腹痞悶飲食少進上吐下瀉氣喘嘔
血去死不遠豈可謂無害耶是以醫者貴乎識病真耳
或又曰人稟天之陽爲身之陽則陽常有餘無待于補
何方書尚有補陽之說予曰陽有餘者指衛氣也衛氣
固無待于補而營之氣亦謂之陽此氣或虛或盈虛而
不補則氣愈虛怯矣經曰怯者着而成病是也況入于
日用之間不免勞則氣耗悲則氣消恐則氣下怒則氣
上思則氣結喜則氣緩凡此數傷皆傷氣也以有涯之

氣而日犯此數傷欲其不虛難矣虛而不補氣何由行
或問丹溪曰人身之虛皆陰虛也若果陽虛則暴絕死
矣是陽無益於補也又曰氣無補法世俗之言也氣虛
不補何由而行是氣又待于補也何言之背戾耶子曰
經云衛氣者水谷之悍氣也慓疾不受諸邪此則陽常
有餘無益于補者也朱子曰天之陽氣健行不息故閑
得地在中間一息或停地即陷矣與丹溪所謂陽虛則
暴絕同一意也此固然矣使陰氣若虛則陽亦無所依
附而飛越矣故曰天依形地附氣丹溪曰陰先虛而陽
暴絕是知陽亦賴陰而有所依附也此丹溪所以拳拳
于補陰也經曰營氣者水谷之精氣入于脉內與息數
呼吸應此即所謂陰氣不能無盈虛也不能不待于補
也分而言之衛氣爲陽營氣爲陰合而言之營陰而不
稟衛之陽莫能營晝夜利關節矣古人於營字下加一
氣字可見衛固陽也營亦陽也故曰血之與氣異名而
同類補陽者補營之陽補陰者補營之陰又況各經分
受有氣多血少者有血多氣少者尚或爲邪所中而無
損益則藏府不平矣此內經所以作而醫道所以興也
譬如天之日月皆在大氣之中分而言之曰爲陽月爲
陰合而言之月雖陰而不稟日之陽則不能光照而運
行矣故古人於陰字下加一氣字可見陽固此氣陰亦
此氣也故曰陰中有陽陽中有陰陰陽同一氣也周子

曰陰陽一太極是也然此氣有虧有盈如月有員有缺也聖人裁成輔相即醫家用藥損益之義也是知人參黃芪補氣亦補營之氣補營之氣即補營也補營即補陰也可見人身之虛皆陰虛也經曰陰不足者補之以味參芪味甘甘能生血非補陰而何又曰陽不足者溫之以氣參芪氣溫又能補陽故仲景曰氣虛血弱以人參補之可見參芪不惟補陽而亦補陰東垣曰血脫益氣仲景曰陽生陰長義本諸此世謂參芪補陽不補陰特未之考耳予謂天之陽氣包括宇宙之外即易所謂天行健內經所謂大氣舉之者是也此氣如何得虛虛則不能畜住地矣天之陰聚而成形者形者乃地之坤也故曰天依形地附氣可見人身之衛即天之乾人身之形即地之坤營運于藏腑之內者營氣也即天地中發生之氣也故以氣質言衛氣為陽形質為陰以內外言衛氣護衛于外為陽營氣營養于內為陰細而分之營中亦自有陰陽焉所謂一陰一陽互為其根者是也若執以營為衛配而以營為純陰則孤陰不長安得營養于藏府耶經曰營為血而血即水朱子曰水質陰而性本陽可見營非純陰矣況氣者水之母且天地間物有質者不能無虧盈既有質而虧盈血中之氣亦不免而虧盈矣故丹溪以補陰為主固為補營東垣以補氣為主亦補營也以營兼血氣而然也

## 答提李黄公如金所患書

生樸樕小材山林迂士其于岐黄之書盧扁之術僅惟得其糠粃而已升堂入室誠有所未能也茲蒙召置左右以備顧問夙夜祗惧惟恐弗堪雖然一得之愚不敢不盡是以忘其固陋謹述以聞古人所謂芻蕘之言狂夫之語庶幾或有可采者也伏惟天寛地容海涵春育人不求備才不求全片言有取寸長必録又且不作聰明不大声色靡恃其長毋執其見舍己從人不知有彼此之别使各得以紓其情也用上敬下相忘于勢利之場俾皆得以盡其辞也是知所言或謬殆必視如道傍苦李嚙而去之而已必不索我于形骸之外以言而見責焉然生侍側有日聆誨已久因而察其受病之源詳其致病之因不過心過于劳而已何則心為血主而血又所以養心血屬陰而主静惟静則可以生水故曰静則生陰是也苟或心過于劳則主動而屬陽矣陽則火之象也故曰動則生陽丹溪亦曰諸動屬火動極火熾陽亢陰微血愈虧損而心失所養矣是以睡卧不寧夜夢紛紜職皆由于此也經云主閉藏者腎也腎主相火上係于心心既動劳則相火随起而熱則流通矣是以閉藏之腎反暗流疎瀉而夢遺精滑之疾有所所不能免矣經書所謂情動于中精溢于外是也經云東方實西方虚心劳火動則西方之金愈虚而東方之木愈實脾土得不為之傷乎脾土既傷是以上或為嘔下或為

瀉中或畏食之病莫不層出而疊見矣由是探本索元其初固在于心而支流餘裔不免延及他藏而亦有所損也又嘗叅之以脉夫左寸心脉所出也或時而浮洪或時而歛小蓋由心之勞逸不常以致脉之大小無定勞則心動而火熾故脉爲之浮洪而躁擾逸則心安而氣和故脉爲之歛小而恬靜所可喜者肝腎二部脉靜而有常久而不變是知相火雖或有時而動而勢未至于燎原也故今病未即瘳而終有可瘳之理邪未即伏而終有可伏之機尚復何慮之有右手三部肺脾命脉之所出也亦或浮而稍洪又或小而稍弱良由火來侮肺又乘于脾遂延及命門以致然耳故曰火性躁擾強越其燔灼之禍無不着于物也或時小而稍弱者蓋府藏之陰虛陽氣未免爲火暗傷而陰損故火旺之時脉來浮洪而獨見火象及火靜之後則邪伏而虛見矣脉之小而弱者寧不基于此乎或曰血爲火銷吾固聞其說矣而氣當賴之以爲助何謂亦傷其陽乎經曰少火生氣比火發氣夫少火固可以生氣而壯火火之旺甚也安得不食其氣而損之乎又曰熱傷氣故暑月多致人無氣以動怠惰嗜卧可見火之傷氣不待辨而明矣文何疑之有哉生于是察其脉切其病反復精思叅互考証其所治之方無出于八物湯之外也或者專主四物滋陰加黄柏知母玄參生地之屬以降火此固一說也未免寒傷胃氣而呕瀉畏食之病莫能去矣或者專主

四君子以養陽加温煖消導燥熱之劑以助胃此亦一理也未免陽剛傷陰而夜夢遺精之患不能除矣求其萬舉萬全而無一偏之害者還當以八物爲主一則可以養陰而心火不至于太熾一則可以養陽而脾土不至于太傷其他清金降火安神固腎之藥又當因其時月之宜酌其病之輕重更相出入迹爲佐使庶得変通之妙而免執中無權之誚矣守此以治而謂病之不痊吾未之信也抑猶有說焉夫人生氣交之中孰能無欲所謂欲者非特色欲之欲凡耳之于声目之于色鼻之于臭口之于味皆所謂欲也周子曰欲動則情熾熾從火則火之熾可知矣丹溪所謂諸動屬火其原蓋出于此欲故聖賢教人不欲窒慾則曰寡欲此善治乎火也不此是務而惟曰以百憂感其心萬事勞其形惟恃刀圭之劑以求旦夕之功是謂舍本而逐末徇外以遺内也豈自根自本之論哉今之所患誠能内觀以養神存心以養性則水可升火可降坎離交而地天泰矣又何待于籠中物耶且胃氣者清純冲和之氣也凡藥之氣皆偏非若五谷可常食也苟不知此而惟藥之是躭則胃氣之存者幾希矣有志養生者不可以不謹生既以症治之方而詳之于前復以存養之要而申之于後無非致其叮嚀忠愛之意也伏乞高明議之以訂是否

條巻福建舉人謝邦實所患書

一所示大便多燥而色赤褐意燥赤亦熱所爲

大便燥亦固熱所爲亦挾血虛　蓋大腸屬陽明燥金血旺則便潤血少則便燥且腎主大便而亦屬血也由此論之則血虛兼熱爲兩盡矣

一所示夜卧少寧舌生黑胎唇口焦燥靜養服藥二三日胎始退不知降火去胎之藥更有何方法唇舌焦乾更何調理

此項數病皆生于心何則心主血脉心血一虧則陽熱隨起故夜卧不寧唇舌焦燥黑胎之病層出而疊見矣且舌乃心之苗心火亢極故舌生黑胎靜養二三日而始退者蓋靜養則陰生陰生則陽伏矣周子所以定之以中正仁義而主靜者良以此也降火去胎潤唇滋燥之藥恐無出于四物耳加麥門冬五味黃栢知母之屬

一所示目力亦短五步之內於人多不能識直視天日惟濛濛紛紛白花矣白精血縷不斷瞻醒反漬淚

東垣云能遠視不能近視氣有餘血不足也能近視不能遠視血有餘氣不足也今貴目既不能視遠又不能視近此氣血俱不足也直視天日惟見白花白花乃肺之象何則肺爲氣主屬金而燥肺金一虛火來易侮且天與日皆陽火也虛金受侮于天日之陽火故白花紛紛散漫而見于前矣白精血縷不斷瞻醒反漬淚者屬于肝火之動也經云肝熱甚則出淚是矣所治之方要當滋腎水以制火保肺氣以畏木則眼中諸疾雖不期愈

而自愈矣然加減補陰丸正與病對先生宜詳審之

一所示腎氣衰甚不敢勞動惟有患則腰足痠痛或右腎痠疼或久立或勞皆然意區區氣病居多故所患右躰偏多見鬚白眼赤多自右爲甚

夫人之一身氣血周流細而分之則氣屬于右血屬于左氣屬于右則右躰不免氣旺而血劣也且先生亦中年已後血氣日減加之右躰氣旺血劣宜乎腰足痠疼右腎時痛鬚白眼赤之症多見于右也補腎藥方亦無出于加減補陰丸藥生當別楮以呈

一所示勞倦時小便旁射散逆如絲不得順直意皆氣之不足藥之不專勞而失養然歟

此條先生以爲氣之不足藥之不專勞而失養之所致以予觀之誠不出此三之外但先生徒托諸空言不見諸行事是以病根不除時作而時止矣

一所示近來腰復微痛坐久屈伸不便右側腰腿相接處曰環跳穴旁多酸痛

夫腰者腎之外候蓋由腎水衰虛于內以致腎之外候或微痛或屈伸不便或環跳穴旁酸痛也環跳雖屬膀胱膀胱亦腎之府未有藏病而府不病也

一示孤骨下間有火熱或升于右脚股團三指許有時微熱如灯照丹溪有曰火自湧泉穴起者乃火起自九泉也孤骨須亦屬于膀胱與腎相爲表裏而又近于湧泉即此觀之

是亦腎水衰少不足以制火而火起于九泉之類也此宜滋養腎水以制妄火經云滋陰水以制陽光是也

## 痰

一人年弱時房勞後忽洒洒惡寒自汗發熱頭背胃脘皆痛唇赤舌強咀吐眼胞青色竪投補中益氣午後譫語惡熱小便長初日脉皆細弱而數次日脉則浮弦而數竪以手按脅下痛誼欲下之遣書來問予曰痰也痰兼兩感內傷重外感輕耳脅下痛者腎水虧也若用利藥是殺之也古人云痰有補有降有散茲宜合補降二法以治別清暑益氣湯除蒼朮澤泄五味加生地黃芩石膏服十餘貼而安

## 瘧

邑人汪大尹年幾七十形色蒼白勞倦病瘧瘧止胸膈痞悶心惡痰多不思飲食懶倦口苦頭痛夜夢紛紜兩腿時瘦予爲診之脉皆浮濡無力且過于緩醫書云脉緩無力者氣虛也又云勞則氣耗又云勞倦傷脾脾傷不能運化精微以養其心故心神爲之不安宜倣歸脾湯例治之人參二錢麥門冬白朮各一錢歸身酸棗仁茯神各八分黃芪陳皮各六分枳實甘草各五分川芎七分煎服二貼夜卧頗安但藥後覺嘈食則吞酸口淡痰去枳實加山查七分吳茱萸二分服之仍用參朮歸芎山枝山查丸服而愈

一人年逾四十形瘦色紫淡素勞傷脾予令常服參苓白术散獲安住藥一年復勞飲冷酒不爽是夜頭又被濕遂致身冷不安早起面目俱黃盛用零筋草根酒煎服之吐瀉大作又加姜煎則心熱膈壅不進飲食大便秘結瘧作胸膈痞塞粥飲不入食此湯則嗳此氣呃逆吐涎意向甚惡予診左脉浮濡無力肝脉頗弦右脉肺部濡散脾部浮微二部脉皆似有似無或呼攻相引又覺瘧指曰此脾虛之極也初因勞熱飲冷頭又被濕內熱因鬱故發爲黃若用檮藥以泄上焦濕熱則黃自退乃用草藥酒煎溫熱雖行而脾氣存也幾希且勿治瘧當用補脾爲急用人參五錢橘紅一錢時時煎湯呷之令其

旦莫食粥以回胃氣然如所言旬餘乃愈

一人年逾四十不肥不瘦形色蒼白季秋久瘧盛用丹劑一丸止之呃吐不休粒米不入大便或瀉面赤妄語身熱予診脉皆浮而欲絕仲景云陽病得陰脉者死今面赤身熱妄語其症屬陽而脉微欲絕則陰脉矣此一危也經曰得谷者昌失谷者亡今粒米不入此二危也又曰泄而熱不去者死今數泄瀉而面赤身熱不除此三危也以理論之法在不治古人云治而不愈者有也未有不治而愈者也令用人參五錢白术二錢御米一錢橘紅八分煎服四貼漸有生意

一人年近三十形瘦淡紫八月間病瘧予診之左脉頗和

而駛右脉弱而無力令用清暑益氣湯加減服之覺胸膈痞悶遂畏人參更變作瘧治而瘧或進或退服截藥病稍增延至十月復邀予診脉皆浮小而濡帶數右則尤近不足曰正氣久虛邪留不出瘧尚不止也宜用十全大補湯減桂加茯倍參服之漸愈

一人年逾三十形瘦色蒼八月間病瘧或用截藥或用符水延纏不愈胸膈痞滿飲食少進大腸痔血小便短赤瘧發于夜寒少熱多自汗予診左脉濡小而緩右脉濡弱無力曰此久瘧傷脾也用人參二錢白术歸身茯苓各一錢芍藥八分黄芩七分枳實五分陳皮六分甘草四分煎服後因痔血未止吞槐角丸而血愈多仍服前方而血減矣

一婦面色淡紫年逾四十九月病瘧夜發渴多汗呕吐粒食不進數日予診脉皆浮濡而緩按之無力遂用人參五錢橘紅八分甘草七分白术一錢煎服十餘貼瘧止食進漸有生意但大便二十日不通再診右脉浮小無力左脉沉弱無力前方加歸身一錢火麻仁錢半如舊煎服病除

一婦年逾三十瘦長淡紫六月產八月瘧瘧止胸膈痞悶絶劣氣喘咳血身熱脚冷予診左脉濡弱右脉肺部頗洪閱尺二部亦弱以生地黄白芍麥門冬白术各一錢阿膠歸身牡丹皮各七分人參八分陳皮五分煎服一

貼再令熱服濕止膈快但盜汗而脚即軟矣前方加黄
芪錢半黄栢七分依前煎服而安
一人年三十形色蒼白因勞感熱九月盡病瘧頭痛口渴
呕吐胸膈痞塞不進飲食自汗倦怠熱多寒少竪用截
藥病增過飲水吐甚予診脉皆浮大而濡頗弦曰此勞
倦傷脾熱傷氣之瘧也令用人參三錢黄芪錢半白术
麥門冬各一錢枳實五分山查七分帰身黄栢知母各
七分乾姜甘草各三分煎服三貼病減復勞病作前方
人參加作四錢服之向安
一人年三十久瘧竪用補中益氣湯或止或作延及半年
因解髮結勞傷咳嗽竪以前方加半下五味遂致喉痛
声啞夜不能寢邀予視之右脉浮濡左脉小弱曰經云
陰火之動發為喉痺是也此必色欲不謹久服參芪徒
增肺中伏火耳令以甘桔湯加鼠粘子蜜炙黄栢煎服
二貼喉痛除而声出繼服保和湯五貼而安
一人年三十餘形瘦淡紫素勞久瘧三日一發于夜呕吐
熱多寒少不進飲食小便頻數氣喘咳嗽日夜打坐不
能伏枕幾月矣頭身骨節皆痛竪作瘧治病甚衆皆危
之脉皆浮虛緩弱而不甚大予以參术加陳皮黄栢枳
實知母麥門冬北五味煎服三貼病退越二日復病令
用四物加童便服之則嗽除喘止始能就卧再用八物
湯除茯苓加枳實香附又用枳术丸加人參砂仁歸身

黃芩吞服調理熱来常服童便半年而安

一婦形色脆白年五十餘憂勞六月背瘡艾灸百餘壯瘡散病瘧身熱自汗口渴頭暈咀吐泄瀉不進飲食寒少熱多自用清暑益氣湯病甚予診左脉浮微似有似無右脉浮小按之不足曰病須属瘧當作虛治依方而用清暑益氣固與病宜但邪重剤輕病不去耳令以參朮加作五錢芪三錢茯苓一錢陳皮七分甘草五分煎服病退

一人于嘉靖九年因冒風病瘧熱多寒少頭痛倦怠食少自汗已服參蘇飲一貼予適在彼診之脉皆浮虛近駁曰此虛瘧也非參蘇飲所宜令將平日所服參芪歸朮

六月之姙當足陽明養之

等藥煎服五六貼而愈且諭之曰元氣素虛不宜發散凡遇一切外感必須以補元氣為主少加發散之藥以輔佐之庶為允當宜永識之

一婦常患咳嗽加以瘧疾因仍左脇有塊瘧止有孕嗽尚不寧喉乾痰少或時咀出頑痰鐘許方止夜亦如是常覺熱盛胸膈壅滿背心亦脹常要打摩妊已六月夜半如厠身忽寒戰厚覆少頃乃愈越兩日夜半又發寒熱如瘧肢節痛上身微汗口中覺吐冷氣胸喉如有物礙心前虛腫按之即痛頭痛氣喘坐卧不寧竪作傷寒發散又作痰症而用二陳不効予往視之脉皆濡而近滑曰胃虛血熱也先以四君子湯加黃芩枳壳麥門冬煎服

二三貼以保胃氣繼以四物湯加檳榔枳殼麻仁大黃三服下之遂滯下後重虛坐努責怠倦不食時或昏悶亂呌食則脹不食飢四肢痛脚腫予曰胃虛非湯藥所宜令合枳朮丸加人參當歸黃芩服月餘諸症悉除胎亦無損

一人形瘦色脆年幾三十正德十年四月腹痛惟覺氣轉左邊五日而止次年四月亦然八月病瘧間日一發寒少熱多十餘日止第三年四月八月如舊腹痛瘧作四年五年四月八月亦然但瘧作腹痛瘧止痛止旬餘瘧除又瀉痢十餘日瀉止瘧又作但不腹痛五日瘧瘥仲冬感寒頭痛發熱腹及右脇脹痛氣喘溏瀉內黑外紅

枳朮

日夜五六次內熱不減飲食難進遂用三乙承氣湯二貼繼用木香檳榔丸諸症稍定午後內熱愈熾遇食愈脹得瀉略寬頭痛不減請予診治脉皆浮濡近駛曰氣屬陽當升虛則下陷矣又屢服消尅攻下之劑所謂虛其虛也安得不脹而頻瀉乎經云下者舉之其治此病之謂歟或曰脹滿者氣有餘也積塊者氣固結也經云結者散之有餘者損之今有餘而補固結而益何也汪曰人身之氣猶天之風風性剛勁揚沙走石虢能禦之孟子曰至大至剛是也餒則為物障蔽反以為病若能補養以復其剛大之性則衝突排蕩又何脹滿不散積塊不行經曰壯者氣行則愈怯者著而成病是也盖氣

之強壯者則流動充滿或有積滯亦被衝突而行散矣何病之有氣之怯弱則力小遲鈍一有積滯不免因循承襲積着成病故此病法當升陽益胃遂以參苓白朮散煎升麻湯調服月餘仍令丸服一料而愈

一人形瘦色脆年三十餘八月因勞病瘧寒少熱多自汗体倦頭痛胸痞畧欬而渴惡食大便或秘或溏發于寅申巳亥夜晉議欲從丹溪用血藥引出陽分之例治之予診其脉濡弱近駛稍弦曰察形觀色參脉乃屬氣血兩虛瘧已深入厥陰矣專用血藥不免損胃又損肺也淹延歲月久瘧成癆何也自汗嗽渴而蒼朮白芷豈宜例用惡食胸痞而血藥豈能獨理古人用藥立例指引迷途耳因例達變在後人推廣之也遂以補中益氣湯加川芎黃柏枳實神麯麥門冬倍用參芪朮煎服三十餘貼諸症稍除瘧猶未止乃語之曰今當冬氣沉潛瘧氣亦因之以沉潛難使浮達況汗孔亦因以閉塞經曰瘧以汗解當此閉藏之時安得違天時以汗之乎且以參朮枳實陳皮歸身黃芩丸服胃氣既壯來年二月瘧當隨其春氣而發泄矣果如期而安

一人年三十形色頗實初因舟行過勞受熱咳嗽不已續又病瘧素有熱淋求醫服藥或作或輟回家予爲診之脉皆濡弱近緩左尺畧駛曰此熱傷氣也肺爲氣主氣傷肺亦傷矣故發咳嗽其瘧亦因熱而作令用人參錢

半白朮麥門冬茯苓各一錢歸身知母各七分青皮黃
栢甘草各五分煎服而安九月復舟行過勞感熱其瘧
復作或一日一發或二日一發或三日一發或連發二
日回家竪作瘧治不效仍用前方煎服遂安
人年三十六月因勞取凉夢遺遂覺惡寒連日慘慘不
發三日後頭痛躁悶家人診之驚曰脉絶矣誼作陰症
欲進附子湯未決邀予往治曰陰症無頭疼今病如是
恐風暑乘虛入于陰分故脉伏耳非脉絶也若進附子
湯是以火濟火安能復生姑待以觀其變然後誼藥次
日未末申初果病寒少熱多頭痛躁渴痞悶咀食自汗
大便或瀉或結脉皆濡小而駛脾部兼弦此非尋常驅
瘧燥烈刼劑所能治遂用清暑益氣湯減蒼朮升麻加
柴胡知母厚朴川芎以人參加作二錢黃芪錢半白朮
當歸各一錢煎服二十餘貼而愈
本縣二尹大人北人形長魁偉年逾四十六月舟中受熱
病瘧寒少熱多頭疼躁渴汗多竪用七保飲治之不愈
予診其脉浮濡而駛略弦曰此暑瘧也以白虎湯加人
參三錢煎服十餘貼而瘧止
待御程公形色清脆年餘四十素善飲形色蒼熱病頭痛
惡食泄瀉小便短少午後惡寒發熱竪用二陳平胃五
苓共一服治不退反增腰腹拘急邀予診視脉皆濡弱
頗弦而駛曰耗血傷胃惟酒爲甚復加以時熱外傷其

氣內外兩傷法當從補若用草菓槟[illegible]山半下燥烈之劑譬猶抱薪救火寧不益其病耶遂以人參二錢黃芪錢半以益皮毛不令汗泄白朮茯苓石膏麥門冬各一錢以導濕熱不使傷胃知母青皮神麯黃芩歸身川芎柴胡各七分以消積滯而和表裏少加甘草三分煎服十餘貼瘧止後以參苓柏散常服收功

一人年三十餘八月因勞病瘧詣予診治脉皆六至而數無力曰古人云形瘦色黑者氣實血虛也又云脉數無力者血虛也間日發于午後亦血分病也以色脉論之當從血治但今汗多乃陽虛表夫所偉消谷善飢乃胃虛火乘其土皆陽虛也仲景法有憑症不憑脉者茲當憑症作陽虛治以參芪各二錢白朮白芍麥門冬各一錢歸身生地甘草各七分黃柏知母陳皮各五分煎服二十餘貼而安若用尋常驅瘧劫劑寧免後艱

予年逾六十形質近弱八九月酷熱時往來休歙外有藥劑之功內有病者之憂內外弗寧晝夜不靜至十月初旬瘧作三日午後一發寒不甚寒熱不甚熱喜熱惡寒寒去熱來則爽快矣口乾微渴臨發昏倦嗜卧左脉沉小而數右脉浮濡無力亦近于數獨脾部弦面頗洪瘧去則脉皆大小浮沉相等惟覺緩弱而矣初服補中益氣湯十餘貼病無加減夜苦盜汗繼服當歸六黃湯黃芪每貼四錢五貼汗止瘧如舊再服白虎湯人參四錢

石膏三錢知母一錢甘草六分米一撮煎服十餘貼而瘧止矣

一人瘦長脆白年三十餘久瘧後盜汗自汗過多加以傷食吐瀉大作吐止而瀉四日不住筋惕肉瞤驚悸夢遺小便不禁予診脉皆緩弱右則畧弦而濇曰此下多亡陰汗多亡陽氣血虛也遂以參芪爲君白朮爲臣山枝麥門冬牡礪爲佐酸棗歸身山查爲使加以薄桂煎服旬餘諸症稍退半年之間常覺臍下內熱一團烘烘不散時或夢遺浮梁孫鋻誼作熱鬱固欲下之予曰此非有餘之熱乃陰虛生內熱耳若欲下之是殺之耳宜以前方加黃栢熱當自退果驗

一人年十七八時因讀書飢感寒得瘧延纏三年瘧愈[illegible]氣臍左觸痛熱熨而散仍或發或止後因新娶往縣復受飢寒似病傷寒吐二日夜不止接服理中湯補中益氣湯固本丸補陰丸猪肚丸其吐或作或止飲食或進或不進續後受飢勞倦食則飽悶予至午前睡安畧爽食稍進午後氣升便覺脹悶胸膈漉漉水嚮四肢微厥吐水或酸或苦亦有間日吐者大便燥結小便赤短身躰瘦弱不能起止予曰須不見脉見症必是稟賦素弱不耐飢寒宜作飲食勞倦爲主而感冒一節且置諸度外夫氣升脹悶觸痛者脾虛不能健運以致氣鬱而然胸膈漉漉水声謂之晋飲乃用獨參湯補養其氣血加

濕逢

姜以安其咀吐黃栢以降其逆氣初服三貼臍左痛除吐止將人參加作一兩吐又復作此由補塞太過而無行散佐使故也人參減作七錢附五分炮姜七分半下八分蒼朮七分厚朴七分茯苓一錢服至二十餘貼吐止食進餘病皆減頗喜肉味以手揉擦其肚[illegible]有水声汩汩微感寒腹中氣猶微動或時鼻衄數點近來忽瀉二日而自止絕住前藥又覺不爽前方加黃芪四錢山枝七分減黃栢如舊煎服或曰吐水或酸或苦大便閉燥小便赤短諸書皆以爲熱凡病晝輕夜重諸書皆爲血病今用姜附何也予曰吐水酸苦由脾虛不能行濕濕鬱爲熱而水作酸苦也姜附性熱辛散[illegible]熱則散

收

鬱逢熱則散澁收鬱散酸苦自除大便燥結者由吐多而亡津液也小便短少由氣虛不能運化也茲用人參以養血氣則血潤燥除氣運溺通矣若用苦寒之藥則苦傷血寒傷氣寧不愈益其病哉日輕夜重爲血病者道其常也此則不然須似血病而實氣病也疑作血病而用固本補陰等藥反不解非血病可知所以日輕者日則陽得其位而氣旺故病減夜則陽失其位而氣衰故病重經曰至于所生而持自得其位而起是也故病則有常有變而疑不可不達其變也病將愈猶或鼻衄數點者此浮溜之火也加山枝氣味薄者以潛伏之久當自愈後聞食猪肉前病復作予曰臟腑習熟于藥病

亦見化于藥再無如之何矣

鼻衄流涕

一人形近肥而脆年三十餘內有寵妻三月間因勞感熱鼻衄久而流涕不休臭濊難近漸至目昏耳重食少躰倦竪用四物凉血或用參芪補氣罔有効者邀予診視脉皆浮濡而滑按之無力曰病不起矣初因水不制火肺因火擾涕流不休經云肺熱甚則出涕是也況金躰本燥津液日泄則燥者枯矣久則頭面諸陽之液亦因以走泄經云枯澁不能流通逆于肉理乃生癰腫是也予歸月餘面目耳傍果作癰瘡而卒後見流涕者數人亦多不救

痢

一婦年逾五十病痢半載餘竪用四物凉血之劑及香連丸愈增胃脘腹中痛甚裏急後重下痢頻併噯氣亦或咳嗽遍身煩熱予爲診之脉皆細弱而數曰此腸胃下久而虛也竪用寒凉愈助降下之令病何由安經云下者舉之虛者補之其治此病之法歟遂以參朮爲君茯苓芍藥爲臣陳皮升麻爲佐甘草爲使研末每服二錢清米飲調下一日二次或三次遂安

一人八月病滯下竪用調胃承氣大承氣湯下之不利邀予視之面色痿黃食少無味大便不通惟後重甚痛脉皆細弱近滑右脉覺弱予曰此氣滯非血滯也竪用硝

黃利血宜其氣滯于下而愈不通矣遂令吞黃連阿膠丸再用蓮子升麻白芍實黃芩枳殼歸身煎服而安後用白朮人參二兩白芍陳皮山查各一兩爲末粥丸常服調理

予兄年逾六十蒼古素健九月患滯下予適出外自用利藥三貼病減延至十月後重未除滯下未止診之脉皆濡散頗緩初用人參二錢歸身升麻白芍桃仁黃芩各一錢枳榔五分煎服後重已除再減桃仁枳榔加白朮錢半滯下亦定惟糞門深入寸許近後尾閭穴傍內生一核如梅頗覺脹痛不爽予曰此因努責氣血下滯于此耐煩數日膿潰自安果如所言後服槐角丸痔痛如故仍用人參三錢歸芪升麻等劑而愈

## 脇痛

予婿王琇客揚州病脇痛竪以爲虛用人參羊肉補之其痛愈甚鎮江錢竪治以龍會丸痛減予聞冒雪自蕪湖徒行至彼診之脉皆弦濡而弱曰脾胃爲痛所傷尚未復也遂用橘皮枳朮丸加黃連當歸服之而安越五年腹脇揮痛彼思頗類前病欲服龍會丸未決予又衝寒陸路至彼遂親扶持不成寐者數晚診之脉皆濡弱而緩曰前病屬實今病屬虛非前藥可治也遂以人參爲君芎歸芍藥爲臣香附陳皮爲佐甘草山枝爲使煎服十餘貼痛止而食進矣又後十餘年來賀予壽病滯下

腹痛後重日夜四五十行診之脉皆濡弱近駛曰此熱傷血也以四物加檳榔大黃下之四五行腹痛稍減後重不除仍用前方除大黃服十餘貼續吞香連丸獲安三病予三起之其勞甚矣情須丈婿恩同父子不知彼以父視我乎以人視我乎

黟縣承年逾五十京田兩脇肋痛竪用小柴胡湯痛止續後復痛前方不効請予往治脉皆弦細而濡按之不足曰此心肺爲酒所傷脾腎爲色所損兩脇脹痛相火亢極肝亦自焚經云五藏已虛六府已極九候須調者死此病之謂歟果卒

## 鼓脹

一人年逾四十春間患脹竪用胃苓湯及雄黃傅貼法不効邀予診視脉皆緩弱無力曰此氣虛中滿也曾通利否曰已下五六次矣予曰病屬氣虛竪反下之下多亡陰是謂誅罰無過也故脉緩知其氣虛重按則無知其陰亡陽虛陰亡藥難倚仗八月水土敗時實可憂也乃問予曰今不與藥病不起耶嘗聞脹病臍突不治肚上青筋不治五今無是二者予曰然也但久傷于藥故且停服明日遂歸如期果卒

一婦形瘦弱小脉細濡近駛又一婦身中材頗肥脉緩弱無力俱病鼓脹大如箕垂如囊立則垂墜遮攔兩腿有

礙行步邀予視之曰腹皮寬縱已定非藥可斂也惟宜安心寡欲以保命爾後皆因產而卒或曰鼓脹如此何能有孕予曰氣病而血未病也產則血亦病矣陰陽兩虛安得不死又一婦瘦長蒼白年餘五十鼓脹如前二婦頗能行立不耐久遠越十餘年無恙恐由寡居血無所損故得久延

一人年踰四十瘦長善飲診之脉皆洪滑曰可治脉訣云腹脹浮大是出厄也但濕熱大重宜遠酒色可保終吉遂以香連丸令日吞三次每服七八十丸月餘良愈

一人年三十餘酒色不謹腹脹如鼓竪用平胃散廣茂潰堅湯不効予爲診之脉皆浮濡近駛曰此濕熱甚也痛酒遠色庶或可生彼謂甚畏湯藥予曰丸藥亦可遂以枳朮丸加厚朴黃連當歸人參荷葉燒飯丸服一月果安越三餘月不謹復脹再爲診之曰不可爲也臍突如脹長二尺餘逾月而卒臍突寸餘者有矣長餘二尺者亦事之異故爲記之

莖中虫出

休邑西山金斈人嘗語人曰渠嘗病小腹甚痛百藥不應一竪爲灸關元十餘壯次日莖中淫〻而癢視之如虫出四五分急用鉄鉗扯出果虫長五六寸連日虫出如此者七條痛不復作初甚驚恐復則視以爲嘗皆用手扯此亦事之偶中也仲景云火力須微內攻有力虫爲

火力所逼勢不能容故從溺孔出也其人善飲御內膀胱不無濕熱遇有畱血瘀濁則附形蒸鬱爲虫矣經云濕熱生虫有是理也故痨虫寸白虫皆由內濕蘊蒸鬱而生非自外至者也正如春夏之交濕熱鬱蒸而諸虫生焉是矣此亦奇病故記之

身痒

一人年逾六十形瘦脊紫夜常身痒搔之熱蒸皮內肉磊如豈粒癢止熱散肉磊亦消矣竪用烏藥順氣升麻和氣等不効詣予診之脉皆細濡近駁曰此血虛血熱也竪爲順氣和氣所謂誅罰無過治非所宜遂以生地玄參白蒺藜歸芎芪芍黃芩甘草陳皮煎服月餘而愈

膈噎

一人年六十逾色紫平素過勞好酒病膈食至膈不下則就化爲膿痰吐出食肉過宿吐出尚不化也初卧則氣壅不安稍久則定竪用五膈寬中散丁沉透膈湯或用四物加寒凉之劑或用二陳加耗消之劑罔有効者來就予治脉皆浮洪弦虛予曰此大虛症也竪見此脉以爲熱症而用凉藥則愈助其陰而傷其陽若以爲痰爲氣而用二陳香燥之劑則愈耗其氣而傷其胃是以病益甚也況此病得之酒與勞也酒性酷烈耗血耗氣莫此爲甚又加以勞傷其胃且年踰六十血氣已衰脉見浮洪弦虛非吉兆也宜以人參三錢白朮歸身麥門冬

各一錢白芍藥八分黄連三分乾姜四分黄芩五分陳皮七分香附六分煎服五貼脉歛而膈頗寛食亦進矣

淋

一人形肥蒼白年五十餘病淋沙石澁痛竪用五苓或琥珀八政散之類病益加邀予往診脉皆濡弱而緩近駛曰此氣血虚也経云膀胱者津液之府氣化出焉今病氣虚不惟不能運化蒸溽而亦氣餒不能使之出也経又云血主濡之血少則莖中枯澁水道不利安得不淋竪用通利血愈燥氣愈傷矣遂用大補湯加牛膝煎服月餘病減仍服八味丸除附子加黄芪服半月餘遂獲安

眼目

一婦年逾四十兩眼昏昧咳嗽頭痛似鳴而痛若過飢恶心竪以眼科治之病甚予診脉皆細弱脾部尤近弦弱曰脾虚也東垣云五藏六府皆禀受于脾上貫于目脾虚則五藏精氣皆失所司不能歸明于目矣邪逢其身之虚隨眼系入于腦則腦鳴而頭痛心者君火也宜静相火化行其令勞役運動則妄行侮其所勝故咳嗽也竪不理脾養血而以苦寒治眼是謂治標不治本乃用參芪錢半麥門冬貝母各一錢歸身八分陳皮川芎黄芩各七分甘草甘菊花各五分麥芽四分煎服二貼諸症悉除

## 白濁

一人年逾三十季夏日午房後多汗晚浴又近女色因患白濁盛用胃苓湯加右眼作痛用物湯入三黃服之睡醒口愈加苦又加左膝腫痛仲冬不藥濁止漸次延至背痛不能轉側日輕夜重嗹則如繩束撮腰脇痛不可忍呵氣亦應背痛或時夢遺次年正月請予診治脉皆緩弱無力左脉緩而畧滑曰此脾腎病也夫緩脾脉也緩弱無力脾虛可知左脉滑者血熱也遂以人參黃芪各二錢茯朮歸身麥門冬各一錢牛膝神曲陳皮黃栢各七分甘草五味各五分煎服三十餘貼仍以龜板參芪黃栢各二兩熟地山茱萸枸杞杜仲歸茯牛膝各一兩丸服而愈

## 咳嗽

一人形長色蒼瘦年逾四十毋遇秋涼病痰嗽氣喘不能卧春暖即安病此十餘年矣盛用紫蘇薄荷荊芥麻黃等以發表用桑白皮石膏滑石半夏以疏內暫雖輕快不久復作予爲診之脉頗洪滑曰此內有鬱熱也秋涼則皮膚緻密內熱不能發泄故病作矣內熱者病本也今不治其本乃用發表徒虛其外愈不能當風寒疏內徒耗其津愈增鬱熱之勢遂以三補丸加大黃酒炒三次貝母瓜蔞丸服仍令每年立秋以前服滚痰丸三五十粒病漸向安

一婦年逾五十其形色脆弱每遇秋冬痰嗽氣喘自汗躰

倦卧不安席或嘔惡心診之脉皆浮緩而濡曰此表虛不禦風寒激内之鬱熱而然遂用參芪各三錢麥門冬白术各一錢黄芩歸身陳皮各七分甘草五味各五分煎服十餘貼而安每年冬寒病發即進此藥次年秋間滞下腹痛後重脉皆濡細稍滑予曰此内之鬱熱欲下也躰雖素弱經云有故無損遂以小承氣湯利兩三行腹痛稍除後重未退再以補中益氣湯加枳壳黄芩芍藥煎服仍用醋澆熱磚布裹坐之而愈是年遇寒嗽喘亦不作矣

一婦産後咳嗽痰多晝輕夜重不能安寢飲食無味或時自汗遂用人參清肺湯嗽愈甚予爲診之脉浮濡近駛曰此肺熱也令服保和湯五貼而安

一婦懷姙七月嗽喘不能伏枕兩臀坐久皮皆潰爛遂用蘇子降氣湯三拗湯參蘇飲罔有効者邀予診之右脉浮濡近駛按之無力左脉稍和曰此肺虛也宜用補法遂以人參錢半白术麥門冬各一錢茯苓八分歸身阿膠黄芩各七分陳皮五味甘草各五分煎服五七貼而痊

一童子八歲傷寒咳嗽痰少面赤日夜不休丁氏小兒科治以參蘇飲數日嗽甚予爲診之脉洪近駛曰熱傷肺也令煎葛氏保和湯二服如失

一婦瘦弱年四十餘患走氣遍身疼痛或背脹痛或兩脇
揷痛或一月二三發〻則嘔盡所食方快飲食不進久
伏床枕竪作氣治用流氣飲或作痰治用丁藿二陳湯
病甚邀予視之脉皆細微而数右脉尤弱曰此恐嬌居
憂思傷脾而氣鬱也理宜補脾散鬱以人參三錢香附
砂仁黃芩甘草各五分黃芪二錢歸身錢半川芎八分
乾姜四分煎服十餘貼脉之数而弱者稍緩而健諸痛
亦減仍服前方再用人參黃芪川芎香附山枝甘草以
神麯糊丸服之病除

[illegible]司訓蕭先生年逾五十形肥色紫病氣從臍下冲逆
而上睡卧不安飲食少精神倦予爲診之脉皆浮濡而
緩曰氣虛也問曰丹溪云氣從臍下起者陰火也何謂
氣虛予曰難執定論丹溪又云肥人氣虛脉緩亦氣虛
今據形與脉當作氣虛論治遂以參芪爲君白朮白芍
爲臣歸身熟地爲佐黃栢甘草陳皮爲使煎服十餘貼
稍安彼以胸膈不利陳皮加作七分氣喉上仍守前方
月餘而愈

身麻

一婦或時遍身麻痺則懵不省人事良久乃甦竪作風治
用烏藥順氣散又用小續命湯病益甚邀予診之脉皆
浮濡緩弱曰此氣虛也麻者氣餒行遲不能接續也如
人久坐膝屈氣道不利故伸足起立而麻者是也心之

所養者血所藏者神氣運不到血亦罕來由心失所養而昏懵也遂用參芪各二錢歸身茯苓門冬各一錢黄芩陳皮各七分甘草五分煎服而愈

秘結

一婦發居改嫁乘轎勞倦加以憂惧成婚之際遂病小腹脹痛大小便秘結不通竟以硝黄三下之隨通隨閉病增胸膈胃脘脹痛自汗食少予爲診之脉皆濡細近駛心脉頗大右脉弱予曰此勞倦憂惧傷脾也蓋脾失健運之職故氣滯不行以致秘結今用硝黄但利血而不能利氣遂用人參二錢歸身錢半陳皮枳殼黄芩各一錢分煎服而愈

卷二終