V
G148.75
K97
V2

新鍥雲林神穀卷之二

太醫院醫官金谿雲林龔廷賢子才編著
男懋陞
門生同邑吳濟民仝校
金陵書林周曰校刊行

瘧疾

○脉弦數多熱弦遲多寒脉弦數滑實皆順沉細虛微爲逆

○瘧是風寒與暑濕內傷勞倦升飲食發寒發熱作

口乾無痰決不成瘧疾

○大凡瘧初起散邪正氣先無汗要有汗散邪藥可煎有汗要無汗正氣病當痊

○無汗要有汗散邪爲主

散邪湯內用麻黃川芎白芷芍蘇羌防風荊芥同甘草瘧疾初投此藥良 九味

○有汗要無汗正氣爲主

正氣湯中用桂枝柴前芎芷半青皮麥門檳果苓甘草瘧疾元虛總可醫 十二味 或加陳米白芍

○瘧疾發寒熱口乾幷發渴半表半裏症陰陽要分

散邪　正氣　半表裏　熱瘧　寒瘧

別

柴苓湯即小柴胡湯 方見傷寒 五苓散 方見中暑二方相合是也

○熱瘧火盛舌卷焦黑陽毒而深脉洪而數

龍虎湯中用柴苓半夏石膏山梔仁黃連知母幷黃柏糯米生姜總可任 九味先以青布摺疊數重新汲水漬之搭于胸上三次熱勢稍定即服此藥

○寒瘧冷甚寒多熱少陰毒而深脉虛而小

雞鳴酒內用常山藿香肉桂茯苓參甘草烏梅黃酒煮空心熱服病當痊 七味

○瘧疾人壯盛用藥可單截不拘新與久一服如神

截

熱少寒多

養胃

養榮

捷、

不二飲內用梹榔。常山知母貝母良等分酒煎露一宿。五更溫服見神方。四味煎此藥。勿犯婦人手又不宜太煎过了

○虛人患瘧疾養正邪自除暴瘧與初起投之病可蘇、

人參養胃茯陳皮半夏厚朴藿芎歸蒼朮烏梅甘草果姜棗同煎病自除十二味

○瘧疾治已後血氣須調養日久成虛疾噬臍枉追想、

參歸養榮地黃芍砂陳苓朮甘山藥厚朴蓮肉炙甘草姜棗烏梅用一條十味

瘧母

○腹中有一塊是名爲瘧母日久恐不消多有成脹臌

參歸鼈甲朮苓芪砂仁芎朴草青皮香附山查并枳實烏梅姜棗水煎之十四味

補中益氣湯　治內傷元氣虛弱瘧疾寒熱久不愈者宜服。方見內傷。

十全大補湯　治久瘧不愈。血氣虛損。屬虛寒者宜服。方見諸虛加大附子。

痢疾

壯盛初痢

○脉宜微細忌洪大身宜涼不宜熱

○痢疾不分赤與白俱作溫熱治可得初起壯盛先宜通久痢虛弱當調塞

○壯盛人初痢利之去積滯濕熱一清除痢疾斯已矣

玄白散內用牽牛赤芍生黃歸去頭檳榔枳殼煨莪朮大黃黃連可解愁 九味

虛弱初痢

○虛弱人初痢濕熱傷血氣清之滯自除不必多通利

芍藥湯中用木香芩連枳殼與檳榔當歸甘草水煎服一劑令君病躰康 八味 一方減枳殼加桂六錢

立効

立効四兩淨黃連二兩吳茱其酒眠炒乾去吳茱不用麩炒枳殼二兩全爲末三錢空肚服瀉湯痢酒立安痊

紅痢

○下痢稍久調和氣血稍加升提痢自止歇

○紅痢宜

調和飲內芍芎歸升麻桃仁研去皮黃連黃芩各等分臨時加減始爲奇 七味

白痢

○白痢宜

調中理氣蒼厚朴陳皮白朮木香芍更有枳殼與檳

赤白久痢滑脫

榔。紅痢再加芩連佐。八味

○赤白痢宜

參歸芍藥白茯苓。白朮山藥與砂仁。甘草陳皮加減用。蓮肉烏梅燈草幷。九味

○久痢滑脫宜兜澀之大補氣血兼以升提

眞人養臟粟殼參。柯子當歸肉蔻眞。白朮木香幷芍藥。乾姜肉桂不須尋。十味

○疫痢赤白增寒壯熱腹痛後重噤口不食

倉廩散即人參敗毒散。方見傷寒加黃連陳倉米石蓮肉白芍姜棗煎服。如噤口用田螺搗爛合臍上引熱下行即能食

柴前羌独只桔芎苓參草

噤口痢

噤口痢是胃口熱。黃連人參減半切煎湯終日細呷之。加上石蓮爲妙絕。二味

痢疾噤口用石蓮研末每服二三錢陳倉米湯調勻服。嘔加姜汁立時痊。

一切噤口赤白痢。黃連生姜四兩製。生姜搗爛同連炒。炒乾去姜連研細倉米飯丸每二錢。白痢陳皮湯送去。赤痢甘草可煎湯。赤白陳皮甘草是脾泄臈茶清可吞。妙方留下君須記。

泄瀉

泄瀉

胃苓

桂芍

寒瀉

○足太陰脾經脉緩時微小者生浮大數者死洩而腹脹脉弦者死

○泄瀉清濁兩不分只因濕多五瀉成陰陽分利瀉自止健脾燥濕可安平

胃苓湯內蒼陳朴猪苓澤瀉茯苓芍白朮肉桂甘草煎諸般泄瀉皆可却十味一名封金飲子即五苓散平胃散二方合用也

止瀉七錢猪茯陳一兩炒朮五錢參官桂一錢炙草二棗九水化服之盡七味名一苓丸

○寒瀉脉沉遲悠悠腹痛時瀉下無休止溫藥理中

理中湯內加官桂藿香良姜廣陳皮茯苓烏梅用一箇姜棗燈心煎服之十味參朮草乾姜

火瀉

○火瀉六脉數痛陣瀉一陣後重如熱湯便赤煩渴甚

四苓散中加山藥蒼朮山梔甘白芍烏梅一箇廣陳皮燈草十根水煎却十味猪苓赤苓澤瀉泉

暑瀉

○暑瀉值夏月暴泄瀉如水面垢脉來虛自汗煩渴最

香茹飲內加參芍茯苓白朮陳皮佐甘草等分加烏梅炒米一撮燈心著九味香薷扁豆厚朴

濕瀉

風瀉

食積

○濕瀉脉微細瀉水腹不痛腹響如雷鳴燥濕藥當用

五苓散加山藥陳柯子肉蔻炒砂仁蒼朮泔製甘草炙烏梅姜片與燈心十三味

○風泄脉浮弦瀉便帶清血風冷客腸胃水穀注下泄

胃風湯內用人參當歸川芎白茯苓白芍白朮并肉桂粟米同煎効若神七味

○食積作泄者腹痛甚而瀉瀉後痛即減脉弦即是也

痰瀉

虛瀉

香砂平胃散依本方加白朮茯苓去枳實

○痰瀉多與少或了或不了其脉多沉滑小便必然少

二陳湯加蒼白朮砂仁山藥炒厚朴木通甘草車前子燈草烏梅姜煎服十二味　橘半苓草

○虛瀉脉微弱食入即瀉却水穀不能化氣虛脾胃薄

參苓白朮散藿香山藥砂仁陳皮姜柯子蓮肉肉荳蔻甘草煎來補胃良十二味

○脾瀉脉來細食後必到飽瀉去即便寬扶脾養胃

脾寒

滑泄

好

香砂六君炒白芍人參白朮姜厚朴甘草陳皮山藥同蒼朮烏梅姜煮着十味

○滑泄瀉無度腸胃虛寒故不禁脉細沉補氣兜塞住

八桂散中煨肉蔻柯子栗殼蜜炒妙參朮甘草附子煨乾姜烏梅燈草要十味

餘方附後

戊己丸治脾瀉痢水穀不化腹痛劇酒連煨芍炒吳萸等分爲末飯丸劑空心每服五十丸米湯送下立時止三味

安脾胃

安脾安胃散參朮二兩生姜同炒熟參苓藿朴朮砂甘莪澤木梹五錢足紅棗廿四去核皮研末二錢姜湯服十四味止瀉極効

霍亂

○脉宜洪大不宜遲微

○氣少不語舌卷囊縮皆不治也

○霍乱內傷外感幷上吐下瀉心腹痛厥冷脉沉伏欲絕調理脾胃藥必應

藿香正氣用紫蘇大腹陳皮桔梗俎白朮茯苓幷半夏厚朴白芷草姜扶十一味

○夏月暑霍乱煩渴出自汗上吐下瀉多脉浮眞可斷

加減茹苓湯黃連白朮赤苓澤瀉先甘草甘葛天花粉生姜煎服立安然九味

○霍亂轉筋腹痛吐瀉手足厥冷脉微驚訝

理中丸子炮乾姜茯參炙草等分良研末蜜丸一錢重細嚼送下用姜湯四味

○乾霍乱症不吐不瀉多灌塩湯吐之不怕

溫中湯內平胃散香附砂仁與藿香枳殼木香厚肉桂乾姜加上幷生姜十一味

○霍亂吐瀉後發熱復頭疼身痛口乾渴脉數可全生

參胡三白朮苓芍當歸陳皮麥門佐五味烏梅山梔子甘草燈心棗一箇十二味

○霍亂轉筋大蔘一握煎湯盪洗良久浸脚北人以麥糠代之

○霍亂吐瀉轉筋粗大秋蔔葉湯服之立瘥

○轉筋入腹攻痛欲死搗爛生姜酒煎服止

○霍亂吐瀉無法可施沸湯冷水合服能醫名陰陽湯

○霍亂已灸腹中尚暖塩納臍中艾灸莫緩灸莫記數

嘔吐

○脉滑數爲嘔代者霍亂微滑者生濇數凶斷

○嘔吐有聲亦有物胃氣損傷食即出症有寒熱虛痰對症投方慎毋忽治嘔吐不止聞藥即嘔百方不効以伏龍肝爲末水沈澄兩鼻孔却服對症藥遂不再吐

○嘔吐吐不止飲食食不下和胃與清熱千金也無價

保中湯內藿香梗陳皮半夏茯苓等白术梔子與砂仁甘草芩連炒不冷十味

○嘔吐噦清水冷涎出不止寒脉沉遲理中病自愈

理中官桂炒乾姜白术人參丁藿香茯苓砂仁姜半夏陳皮烏梅一箇嚼十味

○嘔吐作煩渴此是胃中熱六脉來數時清火藥甚效

黃連竹茹用山梔人參白术茯陳皮甘草麥門白芍炒烏梅炒米粟煎之十味

○嘔吐噦痰涎痰與火相煎化痰與清火一服即安

沉遲

脉数

嘔吐噦痰涎

水寒停胃嘔吐不止

傷食

然、

二陳湯裏加人參。砂仁白朮竹茹煎。麥門烏梅山梔炒姜棗同煎病自痊。十味

○水寒停於胃嘔吐不得止療之宜燥濕脾胃加調理、

茯苓半夏二陳湯。蒼朮厚朴與乾姜。砂仁烏梅藿香葉生姜煎服見神方 十味

○嘔吐因傷食飽悶作酸氣消食更和脾嘔吐自然止、

香砂蒼陳草藿只實木香姜

香附平胃散治傷食嘔吐。方見傷食

○病久只嘔吐胃虛不納穀養胃更和脾王道無歎迷

六君湯裏加歸芍砂仁蓮肉炒山藥藿香烏梅炒米煎生姜棗子爲引佐 十三味

惡心

○惡心心中常兀兀欲嘔不嘔吐不吐此爲惡心非心病寒熱痰虛停食水治之頂[illegible]機應變母膠柱

翻胃

○脉浮緩者生、沉濇者死、
○脉濇而小血不足、脉大而弱氣不足、
○翻胃五味七情過、五臟火動津液涸、氣虛不運則生痰、血虛不潤而生火、補氣生血養胃脾、清火化痰把鬱破、戒氣斷味慢調和、勿行香燥生災禍、

安胃湯中參术陳、茯苓山藥炒砂仁、歸連夏草藿香葉、蓮肉烏梅姜棗壽、十二味

順氣和中二陳先、白术枳實炒黃連、香附砂仁山梔炒、神麯嬌泥河水煎、十一味

王道無憂散二陳、香砂四物柏梔苓、烏附猪通天麥草、赤苓赤芍藿梹壽、二十四味

三子散治翻胃噎、白芥蘿蔔胡荽列、等分爲末每五分、燒酒食後調和啜、

五子散治氣噎脹、蘇蘿芥各五錢重、山查香附各二錢、爲末合作芥末用、

○年老陰血虛、痰火氣結滯、飲食不能下、乃成膈噎氣、

當歸養血四物湯、枳連陳朴貝沉香、香附茯苓紫蘇子、瓜蔞竹瀝棗生姜、十四味

○年少患膈噎、胃脘血乾竭、便閉食不下、生津與補

血

生津補血湯蘇子歸芍二黄茯貝母陳枳砂仁炒黄連沉香水磨不用煮十二味

○嘔吐翻胃愈後調理滋補氣血保和脾胃養血助胃芎歸芍山藥蓮肉一兩剉薏黄姜汁炒八錢扁豆茯苓六錢着人參五錢草三錢白术一兩三錢佐姜汁麴糊爲丸子百丸滚水空心嚥

呃逆

○脉宜浮緩忌弦急結代促微

○發呃一名郎欬逆氣逆上衝而作聲起自胃火爲易治陰火上衝最難平

○發呃屬寒者多因胃口虚手足時厥冷脉沉細無疑

丁香柿蒂桂良姜木沉茴乳藿香良厚朴陳皮甘草夏砂仁十四味煎服

○發呃屬熱者發熱多煩渴脉數認其真休將熱藥啜

小柴胡湯不用參薑茴沉木與砂仁梔子陳皮并柿蒂竹茹烏梅効有神味十四

屬寒

屬熱

痰火

水寒停胃口

陰火氣上升

○胃中有痰火亦令人發呃清火豁痰涎服之立銅黃連竹茹麥門冬山梔陳皮半夏同沉木茴香紫蘇子砂仁甘草可收功十二味

○水寒停胃口發呃不得了燥濕與溫寒醫人須要曉

茯苓半夏并柿蒂丁香茴香與姜桂厚朴陳皮草砂仁沉木藿香十四味

○臍下氣上升發呃屬陰火降火與滋陰自然得安可

滋陰降火湯方見虛勞治陰火上升發呃依本方加砂仁沉香茴香木香山梔柿蒂辰砂

中氣不足

傷寒

傷寒

○中氣短不足發呃氣不續六脉必虛微補氣是其福

補中益氣湯方見內傷加五味麥門冬黃柏或少加附子

○傷寒大熱症陽明經內實醫者失於下因而致欬逆

六一順氣湯方見傷寒

○傷寒熱傳經醫悞用姜桂熱藥助火邪痰火發欬逆

黃連解毒湯　白虎湯及竹瀝之類治之或黃荊子破水煎服立止効

○瀉痢與傷寒結胸并發黃若還發呃逆難以得安

康

灸欬逆法

乳根二穴。直乳一寸六分。婦人在乳房下。起肉處陷中灸七壯効

噯氣

○噯氣口張氣胸膈氣上升胃中有痰火亦有胃寒并

○胃熱噯氣有痰有火清火豁痰順氣即可

加味二陳炒山梔。砂仁白蔻木香宜。益智枳連姜厚朴再加附子更爲奇。十三味

○胃寒噯氣治要理中順氣開鬱氣血疎通

理中湯裏去參苓。加入茴香益智仁。陳朴木香香附子。胃寒噯氣服之神八味

吞酸

○吞酸胃口有濕熱吞酸吐酸要分別吞酸酸水刺心頭吐酸出水多成噎

○吞嚥酸水濕熱在胃除濕清熱兼化痰治

清鬱二陳蒼朮芎。枳實黃連香附同。梔子白芍神麯

倍吞酸饋雜總收功。十二味

○吐出酸水皆屬濕熱濕熱清除莫待成噎

蒼連湯內用砂仁半夏陳皮并茯苓。神麯甘草吳茱炒。生姜煎服立安寧。九味

○吞酸吐酸和胃平肝清火解鬱淡薄可安

香砂平胃散方見傷食依本方加炒黃連山梔吳茱去枳實木香

○口吐清水濕在胃口利水燥濕自然安了

三白湯中用白朮蒼朮壁土炒滑石更有陳皮白茯苓五味將來水煎吃

饋雜

○饋雜胃中痰火動亦有血少心驚忡食鬱作饋宜開鬱治當分別莫雷同

○饋雜胸中痰因火動豁痰清火投之立中

化痰清火半南星石膏知母與黃芩梔連陳皮蒼白朮白芍甘草總堪任。十二味

○饋雜心中多因血少驚悸怔忡養血爲妙

當歸補血生熟地參苓白芍與山梔陳皮白朮麥門草烏梅辰砂炒米宜。十三味

○食鬱作饋飲食傷胃養胃開鬱調理可愈

香砂平胃散方見傷食依本方加炒連炒梔炒芍川芎辰砂去枳實藿香

○饋雜悶亂惡心發熱頭痛胸痞消食清鬱
消食清鬱二陳宜神麴山查連朮梔香附川芎麥芽
炒藿香枳殼莫相違 十四味

諸氣

○脉宜浮緊弦急不宜虛弱
○喜怒憂思悲恐驚一有怫鬱諸病生男要全神須
養氣女宜平氣以調經
○凡氣有餘之疾宜
四七湯半夏茯苓幷紫蘇厚朴生姜棗諸氣盡消除
四味
分心氣飲木通桂赤芍茯苓半夏配桑白大腹青陳
皮紫蘇羌活甘草類 十二味
上下分消導氣湯芎苓枳梗朴通榔半夏黃連萋澤
草桑白青皮麥附良 十六味
○凡氣不足之疾宜
四君子湯加砂仁當歸厚朴幷紅陳氣虛甚者黃芪
炒姜棗同煎大補真 八味
○公私拂情利名失志抑鬱煩惱病滿胸臆面黃形
羸不思飲食

交感丹用香附米。一斤河水浸炒起。茯神去木四兩
秤。蜜丸彈大白湯吃。二味
○流濕潤燥推陳致新。散鬱破結。活血通經。氣分百
病此藥堪平。
利氣丸用牛與黃。香附各秤四兩強。莪朮檳榔枳殼
炒。青陳黃連與木香。各用一兩柏三兩。水丸七十
淡姜湯。十一味

青筋

○青筋症起多因氣氣逆不行血凝滯惡血攻心灰
片時。砭針曲池出血治。曲池在晒手腕中青筋頭上。男左女右用砭[illegible]打之
出去黑瘀之血立愈不須去血即服白虎丹神効
白虎仙丹古礦灰。谷神子製救人災。臼中為末水飛
過。手上成丸日晒來。引用燒酒一二盞。每服須吞
五十枚。保全男婦青筋症。廣積陰功遍九垓。
○南方有砂症。北地患青筋。多由七情起。或是六淫
成。使氣不運用。致血不通行。心慌痰喘急。噎塞氣
上升。胸中痞滿悶。心腹痛無停。眩暈眼黑暗。頭痛
耳常鳴。憎寒復壯熱。唇黑面顏青。四肢沉困倦。百

節苦酸疼渾身痳木痺手足厥冷并飲食全不納惡心慌不寧莫把青筋打瘀血自然行專治心腹痛又醫帶下崩不拘赤白痢打撲瘀血凝仙方名白虎一服効通靈

痞滿

○脉堅實者順虛弱者逆按之堅而軟無塊爲痞多是痰鬱結成或飲食停滯而成也

○痞滿胸膈欠舒暢七情六淫不升降治宜開鬱以寬中能分虛實方停當

痞滿不食養胃是宜半攻半補乃是良醫

養胃湯中用白朮香附砂仁拜枳實木香半夏茯陳甘厚朴藿香姜棗一 十二味

○內傷元氣而作痞滿益氣補中其功稍緩

加減補中益氣湯 方見內傷

○痞滿內熱夜臥不安臥則愈悶和中乃寬

解鬱和中用二陳青皮黃連山梔仁香附前胡蘇子朴枳殼神麯總相尋 十三味

鼓脹

磚內陳瓦磁三子研碎沖酒

分消湯

○屬足太陰脾土腹脹浮大是出厄虛小命殂須努力

若臍凸肉硬肚大青筋足背半掌俱平男從脚下腫上女從頭上腫下並皆不治

○脾胃不運氣虛損濕熱相蒸成鼓脹中空無物似於鼓濁氣在上清下降健脾順水要和中莫將峻利把命喪

○肚腹脹甚脾虛中滿上下分消利濕莫緩

分消湯內蒼白木木香香附砂枳實猪苓澤瀉大腹皮陳皮茯苓川厚朴十二味

即實脾飲

○脹屬脾胃氣血俱虛大補榮衛乃是良規

行濕補氣養血湯參朮歸芎茯木香大腹甘芍蘇陳朴海金蘿蔔木通良十五味

○腹中熱脹或有積聚消脹化積是爲正治

廣茂潰堅柴升麻芩連歸朴半紅花麯澤青陳皮草蔻益智吳茱甘草佳十七味

○腹中寒脹不喜飲食暖胃溫中脹滿自去

香朴湯中大附子炮去皮臍七錢五厚朴一兩姜炒乾木香三錢姜棗煮三味

○腹脹痞滿痰嗽喘促大便虛閉乃氣所觸

分心氣飲方見諸氣依本方加三稜莪朮檳榔香附烏藥

水腫

○屬足太陰脾經脉宜浮大不宜沉細若大便瀉脉細結者死

○水腫氣急小便澀血腫氣滿四肢寒朝寬暮急是血虛暮寬朝急是氣虛氣血俱虛朝暮急健脾除濕利水宜

實脾飲中蒼厚朴白朮茯苓陳枳殼猪苓澤瀉大腹皮木香香附砂仁着十二味

即分消湯

加減胃苓湯木瓜檳榔大腹與山查香附砂仁神麯炒諸般水腫用爲佳十六味

消腫調脾枳桔黃胃苓參附縮牛郎桑皮茴蓽稜莪朮木通大腹木瓜香二十四味胃苓湯去白朮茯苓不用

○水腫遍身腹有積塊諸氣不和用之立瘥

木香流氣枳蘇蓬參朮青陳茯桂通檳果腹沉香附朴瓜菖丁芷半黃冬二十四味

○水腫因氣惱腹脹胸膈飽時腫又時消順氣即安好

分心氣飲方見諸氣加猪苓澤瀉車前葶藶木瓜麥門冬

○濕熱作腫脹大便滑下泄小便赤澀少利水清濕熱

葶藶木香散滑石猪苓澤瀉茯苓桂木通白术與甘草爲末三錢湯送去十味

○遍身水腫腹脹如鼓宜此消散後仍調補

金蟾散即大蝦蟇腹内須教入縮砂罐封炭火燒存性爲末酒調服更佳

○水腫腹脹氣弱脾虚半消半補毋得執泥

消腫除脹四君湯猪澤苓通滑木香桑腹陳苓皮并麥燈草姜皮用最良十味

積聚

○脉宜實大不宜沉小○腹中有積忌虚弱

○五積屬陰五臟生六聚屬陽六腑成左爲血右食積中爲痰飲各有名活血理氣健脾胃半攻半補塊消平

潰堅湯内用當歸白术半夏與陳皮香附枳實山查肉砂仁厚朴木香宜十味

真人化鐵用稜莪枳朴青陳麴附多芎歸桃仁紅花草山查黄連木槟和十六味

熱痛　寒痛　男

○積塊屬熱要清鬱結理氣平肝積漸消滅

柴平湯內用柴胡蒼半青陳枳殼扶神麯山查芩厚朴稜莪甘草病當除十三味

○積塊屬寒氣塞不寬破鬱消積漸次平安

大七氣湯厚肉桂桔梗藿香附益智甘草稜莪青陳皮姜棗煎服療積聚十味一方加大黃檳榔治諸虫積血鱉長虫打下即愈

○男子積塊腹中疼痛溫藥一投百發百中

千金化氣芍芎榔砂附稜莪丁木香枳蔻青陳甘草果腹芷玄茴半朴姜二十二味

○女子積塊遊走不定上下攻痛一服立應

女

千金導氣丁木香砂仁白蔻枳芎姜朴芷芍歸甘白朮青陳稜莪小茴良乳沒牛杜紅乾漆桂桔烏附角茴香二十九味

○丈夫酒積婦人血積小兒食積一切諸積

勝紅稜莪青陳皮乾良姜各一兩宜香附二兩炒爲末醋丸姜湯送下之七味

五疸

○疸病面黑作渴腹脹者必成疸症也渴欲飲水小便不利者必發黃也

○五疸俱是濕與熱遍身上下如金色除濕清熱利小便實者黃而虛者白

○黃疸便閉內有濕熱通利二便黃可退徹

茵陳大黃用山梔滑石厚朴枳實隨已上等分甘減半燈草煎來不用疑 七味

○五疸濕熱遍身發黃清利水道便是良方

茵陳散裏茯猪苓梔子黃連枳實并蒼木厚朴白滑石澤瀉燈草水煎靈 十味

○腎疸目黃身黃尿赤所用風藥風能勝濕

腎疸湯中羌獨活藁本升麻防風葛神麯甘草揀人參黃柏蒼木四苓合 十六味

○濕熱發黃汗黃尿赤利水除濕清熱可已

茯苓滲濕用猪苓茶連梔子與茵陳木通防己并澤瀉枳實陳皮蒼朮真 十二味

痼冷

○痼冷寒之甚四肢作厥逆腹痛冷汗出陰囊忽縮入身靜語無聲氣少難喘息目睛不了了口鼻冷氣襲大小便不禁水漿不肯吸面寒如刀刮先要用葱熨急將熱藥投百中無一失

加味理中大附子人參白朮乾姜使肉桂陳皮白茯

苓棗薑甘草痛立止 八味

固陽湯內用參芪白术乾姜厚朴齊白姜腹痛良姜倍茯苓大附獨稱奇 九味

回春散治冷陰如神

一錢白礬八分丹二分胡椒細細研焰硝一分共四味醲醋調和手內攤男左女右合陰處渾身是汗濕衣衫此方屢用如神効不義之人不可傳

灸男左手右手中指一壯再灸臍下三寸名關元穴七壯

班疹

○凡班既出須得脉洪數有力身溫足溫者易治若脉沉小足冷元氣虛弱者難治

○凡班疹先從四肢起而後入腹中者死

○發班紅赤為胃熱若紫不赤為熱甚若還紫黑為胃爛赤班半生半死黑班九死一个 生大抵鮮紅稀朗靜

升麻葛根湯 方見傷寒

人參化班一錢參石膏知母各三錢甘草五分米一撮水煎一劑即安然 四味

發熱

傷寒

○傷寒發熱者寒邪傷於衛脉來緊有力此是外感致

九味羌活湯方見傷寒羌防芎芷蒼朮芩生地草

傷暑

○傷暑發熱者熱邪傷於榮脉虛遲無力暑傷元氣明

清暑益氣湯方見中暑參芪蒼白朮升葛澤青陳麥冬柏五味神曲草当歸

内傷

○内傷發熱者陽氣自損傷此病屬脾肺脉大無力量

補中益氣湯方見内傷參芪朮草升柴歸陳

陰虛發熱

○陰虛發熱者陰血自損傷此病屬心腎脉數無力

晝熱

滋陰降火湯方見虛勞歸芍生熟地知柏天麥白朮陳草

夜熱

○夜間則身靜晝上即發熱此熱在氣分清涼藥可減

小柴胡湯方見傷寒依本方加梔子黃連知母地骨皮柴芩參半草

○晝上則身靜夜間即發熱此熱在血分滋陰火自減

四物湯方見補益依本方加知母黃柏黃連梔子牡丹皮柴胡

○不分晝與夜一般只發熱熱在氣血分清補是明哲

晝夜熱

子午潮熱

發熱憎寒

四物湯合小柴胡湯。加黃連梔子。

○子午潮熱者此是坎離虛降火與滋水標本兼濟之

柴芍歸苓泉草姜

逍遙散方見婦人依本方加黃連胡黃連麥門冬地骨皮秦艽木通車前燈草

○發熱憎寒者邪在半表裏分利陰與陽寒熱病自愈

小柴胡湯合五苓散

諸虛

即補益

○脉大無力是氣虛。脉數無力是血虛。

○氣虛脾肺弱面黃肌瘦削胸痞食不思諸病相兼作

四君子湯用人參白朮茯苓甘草兼能醫氣分諸虛症。王道之醫在此間。四味

○血虛心腎虧日晡發寒熱煩燥不安寧百病來相挾

四物湯內用當歸川芎白芍地黃宜能醫血分諸虛症應變隨機莫執泥。四味

○氣血兩虛損肝腎傷根本此藥可調和用之最平穩

十全大補

補中益氣

六味地黃丸

八珍湯即四君子湯合四物湯是也

○萬病總歸虛三方損益施玄機能勘破再世一盧醫

十全大補湯即八珍湯加黃芪肉桂十味是也

補中益氣湯方見內傷

六味地黃用八兩山藥石棗共半斤茯苓牡丹同澤瀉各秤三兩要均勻爲末蜜丸梧子大百丸酒下用空心

○思傷心血慾損肝氣心腎不交水火不濟大補諸虛平和之劑

神仙既濟丹

延齡固本丸

養心益腎百補丸

神仙既濟丹巴戟蓯蓉石菖蒲遠志牛膝杜仲小茴香兎絲石棗甘枸杞山藥人參五味子黃柏知母生熟地麥門茯苓甘菊花陳皮梔子研末製棗肉蜜丸梧子大空心百丸酒下去二十二味

○五勞七傷諸虛百損男子精憊有傷根本婦人虛冷經候不準

延齡固本生熟黃天麥杜膝茯參香巴山杞棗栢五味各秤二兩要精詳菖志覆車蓉澤兎地骨川椒兩半強酒糊爲丸仍酒下每服空心五十雙如婦人加當歸身酒洗赤石脂各一兩右共二十六味

養心益腎百補丸方見後雜方治諸虛百損補養第一眞仙方也珍之重之

虛勞

○骨蒸勞熱脉數而虛熱而濇小必殞其軀加汗加咳非藥可除

○房勞太過度心腎有虧損熱嗽喘血痰相火動因忽降火要滋陰治標當固本

陰虛火動骨蒸熱壯盛童便要清潔連進數服熱勢減加入湯藥一同啜

滋陰降火芍當歸白朮陳皮甘草隨天麥門冬生熟

骨蒸勞熱

滋陰

降火

地黃柏知母補陰虛。十一味

清離滋坎湯山藥生熟天麥茯歸芍牡丹澤瀉木山茱萸柏知母甘草着。十五味

六味地黃丸方見諸虛加紫河車一具治虛勞之聖藥也

○清痰降火滋陰化源潤肺補腎培其本根

滋陰清化生熟菖天麥門冬二兩強芩芍知玄山枸杞薏苡一兩各秤量黃柏酒炒一兩半甘草五錢生用良五味七錢同研末蜜丸彈子嚥津嚼。十四味

白雪乾糕美滋味大米糯米各升許蓮肉芡實山藥炒各秤四兩要研細白砂糖用一斤半攪勻籠內

蒸成劑。虛勞泄瀉并內傷。脾胃虧損。飲食六味

○勞瘵之源。根深固蒂。起非一朝。病非一夕。醫難一方。藥難一劑。房室要絕。惱怒要去。妄想要息。厚味要忌。要求明醫。莫惜所費。調攝經年。沉疴可愈。

吐血

○大凡失血。脉貴沉細。說見洪大後必難治。

○大抵失血俱屬熱。陽盛陰虛妄行血。紫黑成塊。清除之。新鮮紅血當止塞。若有瘀血在胃口。吐不盡時成血結。諸失血後宜調之。補榮湯中真妙絕。

生地赤芍
犀角丹皮

○吐血出於胃。吐出全是血。清熱引歸經。熱除血自歇。

止血生地。八兩數。搗汁。童便。重湯煮。大黃生末五六分。空心調服一盞許。三味

吐血成斗許。管仲末二錢。柏葉汁一碗。髮灰五分。全共入重湯煮。取出入童便。黃酒加少許。頻頻入口吞。

犀角地黃湯最良。牡丹赤芍四般藏。衄血與吐同涼。血能除諸熱。不須詳。四味再加黃連黃芩殊効

○先起只吐痰。未後方見血。謾說與醫人。此症是積

熱

清肺湯用芎當歸。天麥梔芩桑白皮。生地茯陳甘紫苑。阿膠烏梅共㕮咀。十四味

○先[illegible]吐血。後見復吐痰。如此是何症。陰虛火上[illegible]

滋陰降火湯 方見虛勞 二冬二地归芍知栢朮陳草

六味地黃丸 方見諸虛 加天冬麥冬橘紅枇杷葉 青蒿別甲牛夕五味黃栢

調理之劑

○吐血衄血幷嘔吐。咯血咳血及唾血。後用此方調理之。大補榮中清客熱。

補榮湯中生熟地。當歸白芍草山梔。人參麥門茯苓等。陳皮烏梅棗子空。十二味

衄血

○鼻衄吐血沉細宏。忽然浮大即傾危。

○衄血出於鼻。火熱來剋肺。清火與滋陰。服之血自止。

清衄湯中歸芍地。香附芩連梔子是。赤芍桔梗生甘草。藕節柏葉一同類。十二味

三仙飲子治衄血。人乳童便好酒竭。三味等分重湯

煮。溫服一琬立可截。

鼻衄久不止。大帋作十摺。水濕置頂中。熨之如神捷

鼻衄久不止。蘿蔔自然汗無灰黃酒和。飲之効可立。

鼻衄久不止。馬驢糞焙末血餘灰等分。少許吹鼻遏

鼻衄久不止。大蒜搗如泥左鼻若出血。左脚心下塗

右鼻若出血。右脚心下敷。兩鼻俱出血。兩足心內

鋪。

咳血

○咳血咳嗽出痰中帶血物此症肺經來醫人休[illegible]

清咳湯中用貝母。歸芍桃仁山梔子。桔梗黃芩牡丹

皮。白朮青皮甘草煮。十一味朝熱加柴胡赤茯苓

咯血

○咯血出於腎。咯出俱血屑。清火豁痰涎。服之保安

吉。

清咯湯中有二陳。知母貝母山梔仁。生地阿膠桑杏

子。桔梗柳桂効通神。十三味

唾血

○唾血出於腎。鮮血隨唾出降火補陰虛其血自消沒。

清唾湯中天麥門。知母貝母黑玄參。桔梗遠志乾姜炒。熟地黃柏可加添。十味

溺血

○溺血小便出。心熱移小腸。清心利水道。只此是良方。

清腸扁畜幷瞿麥。歸芍生地梔連柏。木通知母麥門冬。赤苓甘草皆可得。十三味

蒲黃散用炒山梔。通草滑石。大當歸。藕節生黃幷小薊。甘草竹葉總相宜。

小薊飲

便血

○便血大便出。濕熱蘊臟腑。不問糞後前。服之可救苦

清臟湯中芎芍歸。生地芩連梔柏榆。槐花阿膠側柏葉。大便下血總堪醫。十二味

枳殼散黃連。槐花地榆全。白芍幷甘草。空心用水煎。

一方加當歸生地黃。防風亦効

槐花散

去連草加升芩阿膠側柏葉

腸風下血

○腸風下血者。必然在糞前。是名爲近血。清熱免憂煎。

烏金散

柏葉白礬煮。陳棕二兩燒。槐花用四兩。十分休炒焦。每服二錢半。空心用酒調。腸風崩漏痔。一服立時消。

柏葉湯中用地榆。槐花荊芥與芎歸。生地黃連炙甘草。烏梅枳殼緊相隨。十味

腸風下血。薑薺紅棗。水煮一斤。食之即好。

腸風下血絲瓜根。經霜露過三五錢。水煎入油如錢大。空心一服斷根源

臟毒下血

○臟毒下血者。必然在糞後。是名爲遠血。解毒方爲妙。

解毒一名八寶湯。黃芩黃連黃柏良梔子連翹槐花等。細辛甘草共煎嚐八味

臟寒下血

○臟寒下血。無痛脉微。陽虛陰走。溫則是宜。

理中湯方見中寒幷薑桂之類

積熱下血

○積熱下血。甚則兼痛。脉來洪數。解毒堪用。

三黃丸大黃。黃連黃芩良等分研細末。水丸茶下涼。

人參敗毒散方見傷寒加黃連如酒毒下血黃連用巴豆同炒去巴豆不用

餘方附後

腸風臟毒腸澼血。乾柿燒灰存性研。空心米飲調二錢不拘新久如神捷。

腸風臟毒痔便血。黃連酒炒四兩切。入在猪臟兩頭紮。韮菜二斤水同煮。腸藥搗爛丸不折。空心每服八十丸。米湯送下宜溫熱。

盜汗

○盜汗屬陰虛。每向睡中出。若還醒則止。血虛非鬼祟。

當歸六黃生熟地。黃芩黃連黃柏宜。黃芪加倍各等分。水煎一服有神奇。七味

當歸地黃用生熟芍芪陳艸參苓朮知母黃柏蜜水炒。滋補氣血汗自沒。十二味

自汗　夢遺　自汗

自汗

○謂不經發汗自出者是也、忌用生姜

○自汗屬陰虛、不拘時常出、須當補氣虛、汗出如油卒、

參芪湯裏有當歸白术茯苓熟地冬酸棗烏梅甘白芍再加牡蠣與陳皮。十一味

○男子失精、女人夢遺盜汗自汗、宜實腠理、

白龍湯中用桂枝牡蠣龍骨煅爲奇白芍酒炒甘草炙二枚棗子共煎之。五味

文蛤散即五倍子爲末津調臍內使、絹帛繫縛過一宵、自汗盜汗俱可止、

眩暈

○肝脉溢大多眩暈、諸風掉眩皆屬於肝、

○眩者言其黑暈者是旋轉皆屬虛與痰治法當分辨、

清暈化痰湯茯苓陳皮半夏草南星川芎白芷防羌活細辛枳實酒黃芩。十二味

○肥人頭眩暈、氣虛有濕痰、除濕清痰氣補氣病自

濕痰

痰火

風痰

安

四君子湯加天麻。半夏陳皮白芷賒。蜜炒黃芪白桔梗。當歸川芎莫要差。十二味

○瘦人頭眩暈血虛有痰火清火化痰涎養血即安可

四物湯中加陳皮。片芩去朽小山梔。茯苓天麻各等分。甘草人參減半之。十一味

○忽然眩暈倒必定是風痰其脉多浮滑祛風化痰涎

加減二陳去半夏人參枳朮與南星。羌活防風瓜蔞子。芎歸桔梗好相應。十三味

勞役內傷

○勞役人眩暈飢飽傷中氣六脉皆虛微補養真良劑

補中益氣湯 方見內傷依本方加半夏熟地黃白芍天麻

陰虛火動

○陰虛火動人頭目多眩暈六脉加數時降火滋心腎

滋陰降火湯 方見虛勞依本方加川芎天麻山梔竹瀝少許

手足冷

○氣虛極欲倒如坐舟車上手足時厥冷脉細是其恙

參附湯 即人參五錢大附子炮三錢生姜煎服

麻木

○頭旋眼黑暗如在風雲中此是胃氣損停痰濕在胸

半夏白朮天麻湯 方見頭痛 參芪曲麥二朮半陳澤苓 天麻 黃柏 乾姜

加減十全大補湯 方見諸虛治眩暈如神

麻木

○渾身麻乃是氣虛氣血虛損麻四肢木是濕痰鬱

炙血麻痺氣鬱經絡滯

○渾身麻木乃屬氣虛補中益氣開鬱兼施

加味益氣加桂枝木香附子青皮更有川芎[illegible]

煮大補真元正氣虛 十一味

○手足麻木屬氣血虛大補氣血風藥引之

加味八仙用柴胡羌活防風牛膝咀陳皮桂枝姜半

夏秦艽再入姜棗扶 十六味八仙即八物湯是也

○木是濕痰或是炙血活血化痰兩般是法

雙合湯中芎歸芍陳皮半夏茯苓着桃仁紅花白芥

子生地甘草生姜佐 十一味

○手足麻痺氣滯經絡開結舒經氣血通活

開結舒經蘇桂枝台烏香附草陳皮羌活天南星半

夏川芎蒼朮和當歸 十二味

○手足麻痺身肉如痴痛痒不覺爬如隔衣久成風厲血滯氣虛

天麻地膚芎歸參蘚皮防已威靈仙羌獨桂牡草烏炮生地紅花苦參然水煎入酒和童便戒房除七保安全十六味

癲狂

○癲是心經血不足喜笑不常顛倒事脉搏大滑者為生沉小緊急多不治

養血清心湯遠志人參白朮并生地茯苓川芎酸棗仁菖蒲當歸豆早類十味

寧志化痰牛膽星半夏陳皮白茯苓贊連天麻酸棗炒菖蒲人參用最靈九味

○狂為痰火實太盛狂亂動止無正定熱狂脉實大者生沉小決定傷生命

防風通聖散方見中風依本方加牡丹皮生地黃桃仁

獨參丸治發狂邪殺人大叫亂交加苦參蜜丸梧子大薄荷湯下甘丸佳

○婦人患癲喜歌唱亂走踰垣把屋上營血迷于心包絡致生怪症難形狀

加味逍遥加遠志。桃仁紅花幷生地。有熱加入小柴胡再把辰砂末調劑。一味

癇病

○脉虛弦爲驚爲風癇

○癇病身軟即暈倒。痰壅併人不曉。咬牙吐痰片時間。甦醒過來如舊好。

加味二陳加南星。枳實桔梗幷黃芩。瓜蔞木香山梔子。辰砂爲末旋加臨料

加減壽南星半夏荊防皂角與天麻青皮細辛四苓散茯神香附子爲佳。

追風半夏用六兩姜礬皂水浸三朝南星三兩製同上。防附蚕麻二兩饒香蝎枯礬各半兩牙皂一兩炒休焦。姜糊丸似梧桐大。七錢朱砂爲衣。探食後臨臥七十粒。姜湯送下病當瘳。

健忘

○健忘作事無終始。言發不知首與尾。思慮過度損心脾。痰迷心竅亦如是。

歸脾湯裏用參芪茯苓白朮幷當歸。遠志酸棗龍眼

肉木香甘草補心脾十味

補心湯用芍參歸朮苓知母草陳皮生地黃柏石菖蒲麥門酸棗仁遠志十四味

人若多忘事遠志茯菖蒲每日煎湯服心通萬卷書三味

六味地黃丸方見補益治健忘怔忡驚悸不寐加遠志肉石菖蒲人參白茯神當歸酸棗仁炒各二兩

○寧心保神益血固精壯力強志定魄鎮驚怔忡健忘痰火能清

天王補心用茯參桔志玄丹各五錢生地二兩用酒洗天麥酸味柏歸蓮各秤一兩研爲末蜜丸朱砂作衣穿臨臥每服二三十燈心竹葉煮湯吞十四味

安神生地归辰草定志參芪遠志菖若把二方相合服精神自可倍尋常

怔忡

○大凡思慮即心跳此是心經血虛兆心若時跳又時止痰因火動治痰妙

○若有思慮即便心跳此是血虛養血爲妙

四物安神生熟地歸芍參連梔茯是竹茹白朮麥門冬辰砂酸棗烏梅類十四味

○心若時跳又復時止痰因火動治之立愈

加味二陳加枳實麥門竹茹并白朱黃連梔子炒人
參當歸烏梅辰砂末 十四味
奇効朱砂安神丸 黃連酒洗六錢先炙草當歸二錢
半錢半生地一同研蒸餅爲丸黍米大五錢朱砂
作衣穿每服不拘三五十低頭仰臥用津嚥 五味

驚悸

○心中驚悸脉必代結飲食之悸沉伏動滑
○驚悸忽驚惕心中而不安養血以清火溫膽兼祛
○驚悸不安血虛火動養血清火安神可用

養血安神酸棗仁芎歸生地白茯神白朱栢子陳皮
芍黃連甘草炙之靈 十二味
○驚悸不安氣虛痰火養氣化痰療之立可
加減溫膽參茯神歸連枳半麥梔仁生黃酸棗辰砂
末竹茹白朱甘草壽 十四味
鎮驚兩半生地黃麥門白芍陳當貝母各宜秤一
兩川芎遠志七錢強黃連酸棗五錢炒三錢甘草
共研良蜜丸朱砂爲衣服七十臨眠用棗湯 十三味

虛煩

○心煩不得眠心內熱相煎虛煩不得臥心怯膽虛寒

加味溫膽二陳湯五味人參熟地黃竹茹遠志甘草煮枳實酸棗七生姜十一味

竹葉石膏湯方見傷寒治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心燥及諸虛煩熱與傷寒相似但不惡寒身不疼痛不可汗下宜服之

不寐

○不寐心膽怯晝夜不得睡心經氣不足痰涎沃心內

○

高犹無憂散麥冬陳皮半夏茯苓同竹茹枳實人參草石膏龍眼共收功十味或加酸棗仁炒

酸棗仁湯參茯苓等分煎服不相同如不要睡即熱服要睡冷服有奇功三味

溫膽湯方見傷寒治大病後虛煩不得眠此膽寒也依本方六味加人參酸棗仁炒茯神遠志

安神復睡湯四物益智良酸棗遠志肉山藥圓眼方九味

邪祟

○脉乍大乍小乍長乍短此皆邪脉神志昏亂

灸鬼秦承祖驚狂讝妄語上屋更踰垣親踈
麻繩紮縛定兩手大拇指介甲兩指角四
起一連灸七壯須臾病即愈