立性寶百問

上

V
G136.3
C47
1

Dr. Saiki's Library.
函或架之番號
冊之番號 1968
備考
京都產院文庫藏書

子在關元旁三寸灸百壯婦人子藏閉塞不受精元。
灸胞門五十壯。婦人絕嗣不生漏赤白。灸門泉十壯。
穴在橫骨當陰上際。

產寶百問總論

精血以分男女之本源 第一問

男子以精爲本女子以血爲元。男子爲陽陽中必有陰陰之數八故一八而陽精降。二八而陽精溢。女子爲陰陰中必有陽陽之數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。方其升也智慮開明。齒牙更始。髮黃者黑筋弱者强。及其溢也肢體手足耳目之餘無所不充凡子形肖父母者。蓋其精血嘗于父母之身。無所不歷也故父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則

子一目不肖其母。然雌牝鳥獸無天癸而成胎何也
蓋鳥獸精血。往來尾閭故也。然男子精未通而御女
以通其精。則五體有不滿之處。異日有難狀之疾。陰
已痿而思色以降精則精不出而內敗。小便道澀而
爲淋。女人天癸已至踰十年無男子合則不調。未踰
十年思男子合亦不調。舊血不出新血誤行。或漬而
入骨。或變而爲腫。或合男子精亦不受。又合多則瀝
枯。產多則血枯。觀其精血思過半矣。

古法男子三十而娶女子二十而嫁第二問

天以剛陽而尊。地以柔陰而卑。則乾坤之體定矣。是
故乾道成男。坤道成女。男自子位左旋積三十歲而
至巳。所以男三十而娶。際天陽以剛也。女自子位右
旋積二十歲而至巳。所以女二十而嫁。際地陰以順
也。故及時得子皆強。所謂乾坤之體定者。則剛陽柔
陰自然之道也。

婦人感病倍於男子第三問

夫婦人者。衆陰之集。常與溼居。十四已上。陰氣浮溢。百想經心。內傷藏府。外損姿容。月水去留。瘀血停凝。中道斷絕。其中傷墮不一。虛實又錯。惡血內漏。氣脈耗絕。或飲食無度。損傷非一。或宿疾未愈。合其陰陽。或行步風水。便利于懸厠之上。風從下入。變成十二痼疾。所以婦人別立其科也。大抵婦人慈戀愛妬。案著堅牢。情不自逸。所以爲病最深。治之故甚于男子十倍者。此也。

何以謂之天癸第四問

天癸者。謂壬癸北方水也。壬爲陽水。配丁而化木。癸爲陰水。合戊而化火。經曰。水火者。陰陽之徵兆也。且婦人者。衆陰之所集。以類純陰。故云天癸之水也。女至二七。腎氣全盛。衝任流通。經血漸盈而時下。天眞之氣殊降。與之從事。故云天癸也。內經云。一七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故有子。衝爲血海。任主胞胎。陰靜海滿。二者相資。故合有子。

何以謂之經候第五問

女子十四而天癸至。腎氣全。衝任流通。經血漸行。應時而下。常以三旬一見。愆期者病。故謂之經候。然經者常也。候者謂候身之陰也。經之氣伺候而至。若潮候應乎時也。天眞之氣與之流通。故一月一次得乎平則不失期。所謂之經候。又名月水也。

經候前後多寡不定　第六問

夫婦人之疾多是月經乍多乍少或前或後時發疼痛一呼爲經痛不曾說得是陰勝陽是陽勝陰所以服藥不效蓋陰氣乘陽則微寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍水凝成氷故令乍少而在月後若陽氣勝陰則血流散溢經所謂天暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當和其陰陽調其氣血以平爲福

當歸飲

抑陽助陰調理經脉。

當歸去蘆微炒　熟地黃洗淨酒浸蒸焙　白芍藥酒炒
川芎　黃芩炒　白朮各五錢

右剉每服三錢。水一鍾半。煎至八分。空心熱服

沉香降氣湯

順氣通血脉

烏藥　木香　香附　甘艸各等分

右爲細末。每服二錢。空心鹽湯點服。

七物湯

治婦人榮衛氣虛。經水愆期腹痛

當歸　川芎　白芍藥　蓬朮
熟地黃酒浸蒸　川薑各等分　木香減半

右剉每服四錢。水一盞。煎八分。溫服不拘時候

紫石英丸

治婦人腹痛。多是月經乍多乍少。或在月前後時有疼痛

紫石英　禹餘糧不見火　人參
龍骨　五味子　桂心不見火　川烏頭炮去皮臍

杜仲去皮炒黑　桑寄生　遠志去心　澤瀉
當歸去蘆洗切焙乾　石斛去根洗酒炒
肉蓯蓉酒洗焙乾各一兩　川椒去目及閉口者微炒放地上出汗
甘艸炙　牡蠣鹽泥固濟火燒通赤去泥用各半兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大米飲下三十丸或五十丸食前服

月水依時來不快利第七問

婦人月水四經之所主一者衝任二者手太陽少陰二經然衝爲血海任主胞胎二者相資故令有子手太陽者小腸之經爲腑而主表表屬乎陽手少陰者心之經爲臟而主裏裏屬乎陰此二經在上爲乳汁在下爲月水或勞傷血氣致令體虛而受于風冷傷經絡搏氣血血得冷則壅滯故令月水不宣利也

養榮湯

治婦人經候不調

熟地黃洗焙乾　青皮去白　當歸酒洗焙乾

薑黃　牡丹皮　川薑　川芎

白芍藥　白芷各等分

右剉每服五錢水一鍾半生薑五片烏梅一个煎至一鍾去滓溫服不拘時候下紫桂丸七十丸方載四十九問

經水欲行先身體痛或腹痛第八問

經脉者行血氣通陰陽以榮于身者也血氣調陰陽和則形體適平或外虧衛氣之充養內乏榮血之灌溉血氣不足經候欲行身體先痛也或風冷之氣客于胞絡損動衝任之脉及手少陰手太陽之經故月水將下之際血氣與風冷相擊所以經欲行而腹痛也

趂痛飲子

治經脉虛寒身體疼痛乍熱

虎骨五錢酥炙　白茯苓　甘艸　藁本
防風　白芷　當歸　白芍藥
續斷　白朮　附子各二錢

右㕮咀。每服二錢。水二盞。生薑五片。棗二枚。煎至一盞。不拘時服。

温經湯

治風寒客搏經絡。小腹作痛。

當歸　川芎　白芍藥　官桂
牡丹皮　蓬朮各五錢　人參　甘艸
牛膝各一兩

右剉末。每服五錢。水二盞。煎一盞。温服。不拘時候。

没藥除痛散

逐寒邪。療腹痛。

蓬朮炮一兩　當歸　玄胡索　五靈脂
肉桂　良薑炒　蒲黃微炒各一兩
没藥

右爲細末。每服二錢。温酒調下。

月水閉絕不通　第九問

月水不通。因風冷客于胞絡。或發熱爲血枯及血瘕血癥。或因墮胎驚恐。皆令月水不通也。病源云。血性得溫宣流。寒則閉凝。爲冷所搏。則月水不得通行。若腸中鳴而月事不行。因冷于于甲月。或醉入房者。則氣血耗損。致勞傷肝經。或吐血。或唾血下血。謂之膀胱血。使血枯于中。爲積塊血癥。名曰血聚。使榮散于內。心主行血。墮墜恐。則神無所依而血散。亦令月水不通也。

順華湯

治婦人血積血塊癥瘕腹大。內有塊形。時常築痛。久有寒熱。

大黃酒蒸　當歸酒洗　鬼腰帶　枳殼麩炒各一兩

蓽撥　赤芍藥　猪牙皁角火上炙香各半兩

右每一兩。酒二盞。食前煎服。忽暴下謂之崩中。或下鮮血。或下瘀血。或片血五色連下不止。淋瀝不斷。形羸氣劣。倦怠困乏。或月水閉絕宜用。

加味滋血湯

治婦人經水不行。身體發熱。腹中作痛。

馬鞭艸　荆芥穗　牛膝各四兩　當歸

川芎　牡丹皮　赤芍藥　枳殼麩炒

肉桂各二兩

右剉散。每服五錢。烏梅一个。水二盞。煎一盞。食前空心日進四五服。有此症。服半月。或一月。經事自通。

桃仁丸

治婦人血瘕血積。經候不通。

桃仁去皮尖麩炒黃　大黃溼紙裹甑上蒸

川朴硝各一兩　䗪蟲半兩炒黑

右剉以醇醋二升半銀石器中慢火熬煎取一升五合下大黃桃仁䗪蟲等不住攪欲丸時下朴硝更不住手攪良久出之丸如梧桐子大前一日勿喫晚飯五更初同溫酒吞下五十丸午時取下如赤豆汁雞肝蝦蟇衣若未下再服下鮮血紅即止續以調氣血藥止之此千金方也

虛勞之病何以得之　第十問

夫勞有勞役之勞有勞傷之勞故成勞瘵皆由所用太過五臟之氣失其常度所以致其疾也虛則已有所虧勞則因有所損其積之有漸豈一朝一夕之驟成哉巢氏云五勞六極七傷謂之虛勞也今尋源指而論之若腹中有塊大小成形按之不動推之不移久則令人寒熱如瘧漸漸面目浮腫動輒微喘日就羸瘦此暴怒驚恐氣上而不得下動傷于肝氣聚而不散結而成形積久變勞又有日漸羸瘦短氣乏力

腰背牽急。膝脛酸痿。小便或赤。或白而濁。帶下不禁。夢與鬼交。翕翕如熱。骨肉煩疼。此由房事過度。精神耗竭。得之于腎氣虛弱。爲勞尤速。

栢子仁丸

治婦人血閉不通。漸成勞瘵。

栢子仁（另研）　當歸（洗焙）　白茯苓（去皮）　熟地黃（洗焙）

牡丹皮　卷栢（去根土）　白芍藥　石斛（去根）

巴戟　肉蓯蓉（酒浸一宿切碎焙乾）　乾山藥

杜仲（去粗皮炙）　白薇　蒲黃　枳殼（麩炒黃）

肉桂（去粗皮）　京三稜（煨）　覆盆子　枸杞子（各一兩）

附子（炮去皮臍半兩）

右爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。溫酒下五十丸。

人參剉散

去熱解勞。調順經水。滋陰抑火。扶脾補胃之劑。

黃耆　黃芩　赤茯苓　熟地黃（酒洗蒸）

麥門冬（去心）　赤芍藥　白朮（各一兩）　柴胡

人參　知母　當歸　甘艸（炙各五錢）

右剉。每服四錢。水一盞半。加竹葉七片。燈心七

莖煎八分。不拘時溫服。

沉香煎

治暴怒驚恚。氣上而不下。動傷肝氣。結聚成形。

石斛五兩　川椒去目炒　附子炮去皮臍　秦艽去土

柴胡去苗　沉香　木香　鼈甲煮刮去節碍

檳榔各二兩　黃芪二兩　一方加　柴胡二兩

右爲細末。先用新枸杞十斤洗略槌碎酒三斗。

煮取七升。更入蜜四兩。煮成前件藥末。丸如桐

子大。食前米飲下二十丸。

婦人卦數已盡經水復行第十一問

男子生于寅。寅爲陽木也。女子生于申。申爲陰金也。

寅屬木陽中有陰。男子得八數。故八歲髮長齒更。骨

之餘生齒。男以氣爲本。八八則卦數已盡。則以金精

痠。申屬金陰中有陽。女子得七數。七歲齒更髮長。血

之餘生髮。女以血爲主。七七則卦數盡。則經水絕止

內經曰。七七任脉虛太衝脉衰少天癸竭。地道不通

形壞而無子也。或勞傷過度。喜怒不時。經脉虛衰之

際又爲邪氣攻衝所以當止不止

茸附養眞湯

補衝任。衛氣血。

乾薑四兩　肉桂二兩　附子二兩　當歸二兩

鹿茸酒浸二兩　牡蠣煅二兩　防風二兩　龍骨二兩

右爲末。每服二錢。空心棗湯下。

補中芎藭湯

治風冷虛勞。損傷衝任。月水不調崩中暴下產後失血過多羸瘦腹痛。或雍娠胎動不安下血

當歸洗焙　乾薑炮各二兩　川芎　黃耆蜜炙　吳茱萸湯泡七次　白芍藥　甘艸

熟地黃焙乾　杜仲炒去絲　人參各一兩

右剉碎每服三錢水一盞半。煎一盞。空心食前熱服。

何以謂之避年　第十二問

王氏云有一婦人。一女年十五。請診。言女年十四時。經水自下。今乃忽斷。其母甚恐怖。師曰。此女爲是夫人親女。非也。若親女者。當相爲說之婦人因答言是自女爾。師曰。所以問者無他。夫年十四時亦以經水下所以女至此而斷是爲避年。勿怪。後當自下。

拱辰丹

夫方當壯年而眞氣猶怯。此乃衷賦素弱。非衰而然也。剛燥之藥。尤宜速戒勿謂手足厥冷。便

云陰多如斯治之不惟不能愈疾大病自此而生但用滋益之方使天元一氣水升火降則五臟自和百病自去此方之行在孫琳郎方中葛丞相夫人少年時服之極效

鹿茸酥炙去毛皮四兩　山茱萸新紅潤者四兩

當歸四兩　麝香五錢另研

右爲末後入麝香拌和酒煮糊爲丸如梧桐子大每服一百丸或五六十丸溫酒鹽湯送下

室女經候當行不行

室女者乃未出閨門之女也不以好醜女至十四五歲容貌皆紅嫩者謂眞朴未散莊子云綽約如處子者是也當此之際經脉來時俗呼爲紅脉或因驚恐或冷氣擊搏所以當行而不行也

通經丸

治婦人室女月候不通疼痛或血瘕

桂枝不見火　青皮去白　大黃炮　乾薑炮

蓬朮　桃仁去皮尖　川烏炮去皮尖　乾漆炒令烟出

當歸去蘆切焙　川椒去目并合口者微炒放地上出汗各等分

右爲細末將四分用米醋熬成膏和爲六分末成劑臼中搥之丸如梧子陰乾每服二十丸淡醋湯下加至三十丸或溫酒下

桃仁散

治婦人血閉不通五心煩熱

蟲蟲去翅足炒　當歸洗焙　土牛膝　桃仁焙去皮尖及雙仁者各等分

右爲細末每服三錢空心溫酒調下

室女三疾第十四問

一病經水初下中陰溼或有當風或有扇者二病太衝脉盛氣盛則內熱以寒水洗之三病經水適來爲驚怖所觸有犯于一後日必有帶下之疾不可不知

神僊聚寶丹

治婦人血海寒外乘風冷搏結不散積聚成塊攻注腹脇疼痛急腫或耳虛鳴嘔吐涎沫頭旋眼花腿痛面黃肢體浮腫經候欲行先痛帶下赤白崩漏不止盜汗羸瘦胎前產後並宜服之

常服安心神却邪氣逐敗血治健忘令人有子

木香另研末　琥珀另研末　當歸洗焙　沒藥另研各一兩

滴乳另研一錢　麝香另研一錢　辰砂另研一錢

右末熟水搗和每一兩作十丸每用一丸溫酒磨下胎氣不安及難產溫酒和童便磨下產後血暈敗血奔心口噤舌強或惡露未盡口渴面浮烏梅湯和童便磨下室女經候不調每服半丸溫酒磨下產後氣力虛羸諸藥不能速效用童便磨下一丸服不拘時

婦人多驚第十五問

婦人者衆陰之所集而以血爲之主夫心主行血肺主裹血肝主藏血或因喜怒相侵以致榮血虧損內經曰血氣者人之神也血既不足神亦不足所以多驚怖也巢氏有風驚悸候云心藏神爲五臟之主若血氣調和則心神安定若少虧損心神虛弱故風邪乘虛干之以成驚悸若久不止則變恍忽也

經濟丹

治婦人血氣不足榮衛俱虛心氣不寧夜臥驚

悸。夢寐不祥。心虛自汗。乏力倦怠。飲食減少。肺虛咳嗽。宜常服補養心血。安神定志。令人血壯氣實。極有神效。

白芍藥一兩　遠志去心一兩　人參一兩　當歸一兩

沒藥一兩　石菖蒲一兩　白茯苓一兩　茯神一兩

乳香另研半兩　硃砂另研半兩　酸棗仁去殼炒半兩

右爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服三十丸。加至五十丸。棗湯下。或人參湯更佳。食前服。

坎離丹

旣濟水火補心滋腎。治帶下。祛夢邪。

附子端正者炮重一兩一枚者一个　酸棗仁酒浸去皮一兩

辰砂一兩　乳香半兩

右先以附子研細。羅爲末入辰砂等末。煉蜜丸如雞豆大每服一丸。溫酒吞下。空心服。若冬月磁器收之

石斛散

治勞瘵羸瘦乏力。少食倦怠多驚悸。

石斛四兩去根淨洗剉同酒煎炒　木香三錢　牛膝酒洗焙乾三錢

栢子仁三錢　五味子三錢　遠志去心苗洗剉炒黃色三錢

杏仁去皮尖及雙仁者煮熟用三錢　訶子炮三錢　肉蓯蓉酒洗三錢

青皮去白三錢　柴胡去苗三錢　人參去蘆三錢　白茯苓三錢

熟地黃酒浸九蒸九晒焙乾三錢　神麯六錢　麥芽六錢

乾薑炒二錢　甘艸炙二錢

右爲細末每服二錢五分。食前米飲下。一日二三服。

婦人因風冷而生諸病第十六問

風乃陽邪也。冷乃陰邪也。風隨虛入。冷由勞傷。夫人將攝順理。則血氣調和。風寒暑溼不能爲害。若勞傷血氣。便致虛損。則風冷乘虛而干之。或客于經絡。則血氣凝泣。不得爲養。于肌膚。或入于腹內。則神氣虧虛。不能消化于飲食。夫腸虛則得利。子臟虛則不生。經斷爲絕。或有不通者。隨其所傷而成病。皆不逃乎風冷之所傷也。

補陰丸

治婦人百病。或經候不調。或崩漏不止。腰腿沉重。臍腹作痛。潮熱往來。虛煩自汗。嘔噦不時。鼓體酸疼。不思飲食。日漸羸瘦。此藥潤肌膚。悅顏色。調榮衛。逐風寒。進飲食。

熟地黃酒燒　生地黃　藁本　牡丹皮　秦艽各十兩　細辛七兩　肉桂去皮七兩　白芷六兩　茯苓六兩　白朮五兩　當歸五兩　蒼朮米泔浸炒五兩　羌活五兩　糯米二升炒黃色去火性用

右爲細末。煉蜜丸。每服一兩作十丸。溫酒化下。醋湯亦得。

赤紅丹

治一切虛寒冷病。

龍骨　鹿茸　靈砂　川芎　陽起石　牡蠣粉　肉蓯蓉　肉桂　石斛　川巴戟　木賊艸　天雄酒浸炮　澤瀉　沉香　兎絲子酒煮　磁石煅碎　麝香各一兩　臙脂

右爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服一百丸。溫

酒或鹽湯送下三

婦人多頭運眩冒第十七問

運者眩運也謂運轉之運也謂之頭運者是也冒者謂蒙冒之冒世謂昏冒是也明理論云眊非毛而見其毛眩非玄而見其玄眊謂眼花也眩謂眼黑也針經云上虛則眩下虛則厥眩强爲虛蓋中風亦有之者風主運動故也婦人頭眩挾痰多嘔吐者乃是頭風也

芎羌散

治婦人患頭風者十居其半每蒙心掉眩如在

車中蓋因血虛肝有風邪襲之耳素問云。循蒙招尤。目瞑耳聾上實下虛過在少陽厥陽甚則入肝。蓋爲此也。此藥與他藥不同而有速效。

川芎一兩　當歸一兩　羌活半兩　旋復花半兩
細辛半兩　蔓荊子半兩　石膏半兩　藁本去苗洗淨半兩
荊芥穗半兩　半夏半兩　甘艸半兩　熟地黃半兩

右剉。每服半兩。水二盞。煎八分。薑五片。同煎服

玉眞丸

治腎氣虛頭目眩。其脉舉之則弦。按之石堅

硝石一兩研　硫黃二兩　半夏薑製二兩　硬石膏生研二兩

右爲細末。研和。生薑汁爲糊。丸如梧桐子大。每服三十丸。薑湯米飲下。更灸關元穴一百壯良

醉頭風餅

治風痰上攻頭目眩暈。

白殭蠶炒去絲嘴　天南星各等分

右爲細末。生薑自然汁和作餅子。銅錢大。陰乾每服一餅。同平胃散四味二錢。水一大盞。生薑五片。棗三枚。先煎平胃散一沸。次下餅子。槌碎

入同煎一沸。通口服。

桃仁散

治婦人氣虛攻注頭目昏眩偏正頭疼夾腦風太陽穴痛。眉稜骨疼。及治風痰惡心。頭運欲倒小兒傷風鼻塞痰涎咳嗽。並宜服之。

川芎一兩　艸烏八錢　南星五錢以上三味水浸三次用　硃砂五錢細研　麝香一錢　氷片一錢

右爲細末。每服半錢。薄荷湯調下。溫酒亦得。

身體疼痛流注不定。身體疼痛者。其症不一。太陽症表未解。法當身體痛。太陽中溼。一身甚疼痛。若脉沉自利。息微身重背强腹中絞痛。咽喉不利。身如被杖者。陰毒症也。若風邪乘在皮膚之間。淫淫躍若劃若刺。一身盡痛。侵損血氣。動作如蟲之行者。巢氏謂之風蟲

虎骨散

治婦人血氣攻注。身體疼痛。

虎脛骨二兩　桂心一兩　川芎一兩　海桐皮一兩

當歸二兩　天麻一兩　附子一兩　骨碎補一兩
牛膝半兩　羌活半兩

右爲細末。每服一錢。空心溫酒調下。

透經湯

治婦人寒邪所中。一身大痛

五積散半兩　生附子二錢

右剉。水二鍾。生薑七片。棗子二枚。煎八分。入麝香少許。再煎三四沸。通口不拘時服。

麝香丸

治婦人百節疼痛。白虎歷節諸風。疼痛遊走無定。狀如蟲咬。晝靜夜劇。及一切手足不測疼痛。

川烏一隻生用　全蝎二十枚　黑豆三十粒　龍骨半兩生用

右爲細末。入麝香半字。同研和糯米糊爲丸。菉豆大。每服七丸。甚者十丸。夜眠或空心溫酒送下。出汗一身便愈。予得此方有歷節及不測疼痛甚則發如蟲咬。其醫多作鬼邪治之。予曰。此症歷節病也。及三服即愈。

朝食暮吐　第十九問

嘔吐之病皆由三焦不調脾胃不和清濁相干之所致也大抵嘔吐本二症嘔者嘔而有聲俗謂之啞是也吐者吐而有物胃中虛冷則吐若心下積大如杯或時寒熱朝食暮吐其脉弦緊則爲虛寒相搏胃氣日虧所以不能停留水穀名曰胃反也

丁香丸

木香　蓽澄茄　五靈脂　肉豆蔻麪裹煨

丁香　胡椒　附子炮去皮臍　乾薑炮各三錢

硫黃（另研）　半夏（各半兩）　水銀砂子（二件如作靈砂法炒青金頭一兩）

右末薑汁糊丸桐子大。每下七十丸

薑合丸

治婦人中脘停寒。胸膈痞結。嘔吐惡心。

木香　肉桂　附子（炮去皮臍）　硇砂（紙過飛各一兩）

陳皮（去白半兩）　茴香（炒三錢）

右件爲細末。次入硇砂研。酒煮麪糊爲丸。每兩作二十丸。每服一丸以生薑一塊。剜如合斗。安藥在內。溼紙裹煨令香。去紙細嚼鹽湯下。

婦人之病多因氣生　第二十問

氣以形載。形以氣充。惟氣與形。二者相持。氣和則平。氣戾則結病而爲積聚。氣不舒也。逆而爲經厥。氣不降也。宜通而塞則爲涌。氣不達也。宜流而息則爲癭爲瘤。氣之凝也。經曰。怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。寒則氣收。熱則氣泄。勞則氣耗。思則氣結。驚則氣亂。九氣不同。故婦人之病。多因氣而生也。

大七氣湯

治婦人驚恐喜怒。相搏而疼痛

京三稜　蓬莪朮　青橘皮　陳皮
藿香葉　桔梗　官桂　益智各一兩半
香附一兩半　甘艸炙半兩

右剉。每服五錢。水二盞薑三片。棗一枚煎服。

木香順氣散

理胃氣。調榮衛。順三焦。

烏藥　木香　香附　薑黃
砂仁　甘艸各等

右剉。每服五錢。水二盞薑五片。棗一枚。煎服

抑肝降氣湯

治女人諸般鬱氣怒氣胸膈滿悶腹脇刺痛。一切忿恚成疾。

枳殼炒一兩　青皮炒一兩　烏藥八錢　香附一兩童便製炒
桔梗一兩　五靈脂半兩　沉香半兩　紫蘇子炒研六錢
黃芩炒一兩　山梔炒黑一兩　厚朴炒一兩　甘艸半兩
神麯炒一兩　陳皮一兩

右㕮咀。水二盞。用藥五錢煎至八分。空心熱服

產寶百問卷之一