產寶百問卷之二

卒然而死少間復甦 第二十一問

世言氣中者。雖不見于方書。然暴喜傷陽。暴怒傷陰。亦中氣之源也。況憂愁不已。氣多厥逆。血因凝滯。得此疾便覺潮熱昏塞牙關緊急。若槩以中風候用藥非止藥不相當。多致殺人。經云。無故而厥。脉不至。不治自已。謂氣暴逆也。氣復則已。故卒然而死少間復甦正此也。以蘇合香丸療傳屍骨蒸殗殜。肺痿注忤鬼氣。卒暴心痛。霍亂吐利。鬼魅瘴疫。赤白下痢。血閉

癥瘕痃癖。下腫驚癇。鬼忤中人。小兒吐亂。大人狐狸等病。

蘇合香丸

沉香一兩　麝香一錢研　丁香半兩　訶黎勒煨用皮
青木香　香附炒各八錢　安息香一兩別爲末無灰酒一升熬膏
蓽撥一兩　白朮一兩　白檀香一兩　薰陸香一兩另研
蘇合油入安息香內拌勻一兩　龍腦研一兩　硃砂一兩研細水飛
烏犀角鎊碎二兩

右末。蜜丸桐子大。空心酒下三四丸。

病非瘧之邪四時多病寒熱第二十二問

風者陽之氣。寒者陰之氣。陰入陽則發寒。陽陷陰則發熱。陰陽相攻。寒熱交作。經曰。夏傷于暑。秋必病瘧。婦人之病。症見寒熱。邪非暑氣者。皆榮衛之作也。且衛者氣也。氣爲陽。陽微則惡寒。榮者血也。血爲陰。陰弱則發熱。故婦人寒熱多。因血氣之所使也。或勞而體弱。或經閉而寒熱。久則成虛損之疾也。

必應散

治婦人久發寒熱。如瘧疾狀。

柴胡　熟地黃　檳榔　陳皮
艸果　當歸　砂仁　甘艸

右剉。每服三錢水薑煎服。

神健散子　治婦人寒熱

赤芍藥　白朮各二兩　赤茯苓　當歸
肉桂　鼈甲　川芎　枳殼
柴胡　黃芪　秦艽　桔梗
橘紅　甘艸各一兩　木香三錢

右剉。水二盞薑棗煎服。

因咳嗽經候不行　第二十三問

咳嗽之說古書有咳而無嗽。後人則兼言之。大抵皆從肺出。其聲響亮不因痰涎而發者謂之咳。其聲音聞于人。痰涎上下隨聲而發者謂之嗽。如水之嗽蕩其眞氣也。況肺主乎氣。經曰。榮衛之行。常與胃氣相隨。久嗽傷氣。則血亦不足。遂至經閉不行。時發寒熱。久成勞者。氣血俱損故也

六神湯　治婦人熱勞咳嗽。經水不通

柴胡　白朮　青皮　當歸

牛膝　牡丹皮各一兩

右剉末。每用六兩。入蜜四兩。炒令焦。入酒并童便各一椀。煎八沸。去滓作六服。空心下。

紫菀丸　治女子肺氣咳嗽

紫菀　防風　桑白皮　貝母

人參　款冬花　葶藶紙隔微炒　檳榔

木香　天門冬　杏仁　甘艸各等分

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服三十丸。米飲送下。食後服

咳嗽有痰紅　第二十四

經稱五臟六腑皆令人咳嗽。原其至理。皆因寒邪之爲病。當分內外所傷。難經云。形寒飲冷則傷肺。肺主皮毛。自皮毛而入者謂之形寒。胃脉絡肺。食寒而嗽謂之飲冷。水飲停積于胸膈。所以咳嗽。咳痰猶可止嗽血不易治

平肺湯　定喘治嗽

紫菀洗去土　五味子　陳皮　杏仁

紫蘇子　桑皮　半夏各等分

右爲細末。每服二錢水一盞薑四片。煎七分。食後溫服。

立驗丸

治肺熱而咳嗽上氣。喘急不得坐臥。身浮面腫不下飲食。消腫下氣止嗽。

貝母三錢尖　葶藶一兩炒另研細　杏仁一兩半炒去皮　赤茯苓三錢　人參一兩　桑白皮一兩　五味子三錢

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服十丸。日進二服。甚者夜一服。加二十丸。棗湯下。腫甚者食後服。

止紅散

治客熱咳嗽吐血

柴胡　胡黃連　宣連各半兩

右爲細末。入硃砂少許。研和。每服二錢。水一盞。煎半盞。通口食後溫服

吐血衄血齒血舌上出血汗血 第二十五問

氣屬乎陽。血屬乎陰。陰盛則陽虧。陽盛則陰虧。經所謂陽勝則陰病。陰勝則陽病。諸血病衄。皆由陽勝。陰氣被傷。血失常道。或從口出。或從鼻出。皆爲之妄行。其脉洪數者逆。微細者順。陽明之經。行絡于頤頷。陽明受邪熱。血從齒出也。脾氣通于口。心氣通于舌。心脾二經被傷。故血從口出也。榮衛通于臟腑。外榮于經絡。舍于肝經。行則出于心臟。又心之液爲汗。今肝心二臟俱虛。血隨汗液出也。

內補芎歸湯

治婦人血氣羸瘦。或崩傷過多。少氣傷絕。腹中拘急。四肢煩熱。面目無色。及吐血唾血。

芎藭　熟地黃各四兩　白芍藥五兩　桂心二兩　甘艸　當歸各一兩　白乾薑三兩　大棗四十枚去核

右爲粗末。每服五錢。水二盞。煎八分。溫服。

桑皮湯

治唾血吐血。下血衄血。

白芍藥　黃芪　甘艸各一兩　熟地黃三兩

右剉。每服三錢。水酒各一盞。煎八分。不拘時服

琥珀散

治小便出血

阿膠炒　車前子　琥珀　猪苓　茯苓　滑石　澤瀉各一兩

右爲粗末。每服五錢。水二盞。煎一盞。通口服。

婦人偏喜酸物或嗜寒冷第二十六問

天食人以五氣地食人以五味者酸苦甘辛鹹是也五味各有所入酸入肝辛入肺苦入心甘入脾鹹入腎是以五食也肝藏血婦人以血爲主所以偏喜酸物也酸入肝以養血血得其酸物所以含藏也血虛多熱熱邪蒸于肝上焦煩燥故婦人虛性多嗜冷也

茯苓半夏湯

治姙娠惡阻心中煩悶惡心喜酸

半夏　旋覆花　陳皮　桔梗

白芍藥　人參　甘艸　川芎各半兩
熟地黃　赤茯苓各三錢

右剉每服二錢水一盞半薑三片煎八分稍熱食前服。

清中湯　治血虛口燥咽乾喜飲。

人參　半夏　麥門冬　白芍藥
白朮　甘艸　當歸　茯苓
柴胡各等分　薄荷少許

右剉每二錢燒薑一塊水二盞煎七分食前服。

第二十七問

婦人喜少怒多悲泣不止

喜屬陽心主之怒屬陰肝主之婦人稟性陰柔故喜常少而怒常多或悲泣不止皆陰類也有似神祟所憑或以尚祈禱終不應金匱謂藏燥者是也謂所欲不遂其意以大棗湯主之

大棗湯

治婦人多怒及悲泣鬱氣不樂

甘艸一兩　小麥三合

右剉每服三錢水一盞半棗五枚煎八分溫服

咽中狀如梅核或如炙肉第二十八問

喉嚨有咽門。二者各有所司。喉嚨者。空虛也。肺之系。氣之道。絡肺應天。故屬天氣所生。有九節以通九藏之氣。所以謂之嗌也。或陰陽之氣。痰結咽喉膈塞。噎狀若梅核。妨礙飲食。久而不愈。即成翻胃。或胸膈痰結與氣相搏。上逆咽喉之間作聚。狀如炙肉之症也。

四七湯

治婦人喜怒悲思憂恐驚怖之氣。結成痰涎。狀如破絮。或如梅核在咽喉。咯不出。嚥不下。此七

情所爲或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中滯嘔逆惡心

半夏五兩　茯苓四兩　厚朴三兩　紫蘇葉二兩

右剉每四錢水二盞薑三片棗一枚煎八分服

二氣湯

治婦人陰陽痞結咽膈噎塞狀如梅核妨礙飲食久而不愈即成翻胃

山梔子炒　乾薑炮各等分

右爲粗末每服二錢水一盞煎五分食後服

婦人足痛如焚覆之則熱痛風吹冷痛第二十九問

孫眞人云有脚氣之人先從脚起或先從縷弱起行或倒或兩脛腫滿或脚膝指細或心悸忪或舉動轉筋或見食嘔逆惡心惡聞食氣或胸滿氣急或偏膝痛酸皆脚氣之候也黃榮所謂緩風溼痺是也頑弱名緩風疼痛名溼痺寒中三陽所患必冷暑中上陽所患必熱婦人脚十指如熱油煎者此由榮衛氣虛溼毒之氣留滯經絡上攻心則心痛下攻脚則脚痛其脚指如焚亦前脚氣之類也經云熱厥是也

換腿丸

治婦人一切脚氣

石榴葉　南星炮　牛膝酒浸　天麻

萆薢　當歸酒洗　防風　金釵石斛去苗

川羌活　川續斷　薏苡仁　黃耆

甘艸各一兩　木瓜四兩　檳榔二兩五錢

右爲細末。酒糊丸桐子大。每服五十丸。漸加百丸。溫酒木瓜湯下。食前服。

萬靈散

治婦人脚氣

烏藥　青皮　肉桂　赤芍藥

白朮　當歸各一兩　黑豆炒二兩

右爲粗末。每服三錢。水一盞半。入酒少許。煎入分。食前溫服。

活血丹

治婦人脾血久冷。諸般風邪。溼毒之氣。留滯經絡。流注脚手。筋脉拳攣。或發赤腫。行步艱難。腰腿沉重。脚心弔痛。及上衝腹脇。膨脹痞悶。胸膈

不思飲食。冲心悶亂。及一切痛風走注。渾身疼痛。

艸烏炮去皮臍　地龍去土　天南星　川牛膝　木瓜各一兩　沒藥另研　乳香另研各三錢　川芎八錢

右爲細末。入另研藥。酒糊丸如梧子大。每服二十丸。空心日午冷酒送下。或荆芥湯下。

婦人年少髮少　第三十問

是足少陽膽之經。其榮在髮。足少陰腎之經。其榮在髮。衝任之脉。爲十二經之海。謂之血海。其別絡上脣口。若血盛則榮於頭鬚髮。若血氣弱則經脉虛竭不能榮潤。故髮少而禿。或有多黃。

生髮方

連子草　青箱子　蔓荆子各一兩　附子二隻　血餘燒灰二匙

右爲末。清酒內瓷器中。封閉經二七日。藥成以

烏雞脂和塗之先用泔水洗然後傅之極佳。

七月烏陰乾爲末以烏麻油塗之即生。

益陰養血丸

治虛勞血弱。肌肉枯燥。手足多煩肢節酸痛。髮髮脫落。面少顏色。腹中拘急。痛引腰背。去血過多。崩傷內竭。胸中短氣晝夜不得眠。情思不樂。怔忡驚悸多汗。

熟地黃　當歸各一兩　鹿茸炙一兩

右爲細末。煉蜜丸梧子大。每服五十丸。米飲下。

四肢如故但腹脹第三十一問

身腫及四肢者。本起于水。手足瘦削腹大者。本起于脾或脹滿或散者。氣也。然腹脹之狀。上下膨滿。或如鼓之有聲。喘息不便。由上降下。下不升上。氣病于中。無所歸息。三焦渾亂。若卒然脹滿。餘無所苦。此由脾胃不調。冷氣暴折。客乘于中。寒則氣收。聚壅則逆不通。是以脹滿。內經云。藏寒生滿病。是也。若臍脹者難治。大便利者爲逆

沉香導氣丸　順氣消腫

白牽牛微炒一兩　黑牽牛一兩　陳皮去白
青皮　檳榔半兩碎用巴豆十五粒去皮炒令黃色去巴豆不用
丁香　沉香　全蝎炒　萆澄茄
胡椒各半兩　千金子一兩研一方一錢　甘遂半兩剉煨火炒
黃色爲末　蘿蔔子三兩炒一方三錢

右爲細末。用葱白研如膏。和丸如梧子大。每服二十丸酒送下

病者有血分有水分。婦人月經通流。則血水消化若風寒搏於經脉。血結不通。爲積於水。故曰血分。若先病水後經水或斷名曰水分。其病易治。去其水。經自下也。若病覺腹內脹外視如常。大便黑。小便赤。是其證也。

椒仁丸

治婦人因經水斷絕。後致四肢面目浮腫。小便不通。名曰血分。水化爲血。血不通。則復爲水也

木香半兩　五靈脂　吳茱萸湯炮醋浸

膽礬一錢　玄胡索半兩　甘遂炒黃色　款花醋浸一宿炒黃一分　川椒去目微炒　續隨子去皮研　郁李仁去皮研　牽牛炒熟各半兩　人言一錢研　石膏燒紅研一分　附子炮熟半兩

右爲細末。水爲丸如菉荳大。橘皮湯下一丸。臨臥。未利空心加一丸後未利日午再加一丸。

葶藶丸

治小便不利後身面浮腫。致經水不通。名曰水分。其餘症並同水氣。

葶藶炒　續隨子去皮研各半　笋乾一兩

右爲末。煉蜜丸梧子大。匾竹葉湯下七丸。如大便和者。減葶藶續隨子各一分加白朮半兩。

防已湯

治水分

桑白皮　赤茯苓去皮　紫蘇　木香各等分

右剉一劑。每服水二鍾。煎七分。不拘時服。

心腹痛或有小腹痛　第三十三問

經云。五臟卒痛。何氣使然。岐伯對曰。寒氣稽留於脉外。故卒然而痛也。舉痛論中所載痛病共十七症。皆由氣寒所致也。巢氏云。心痛是臟虛。受風冷邪氣乘于心也。其痛發有死者。有不死。成疹者。心爲臟主。而臟神其正經不可傷之。而爲痛者。名眞心痛。朝發夕死。夕發朝死。若臟腑虛。受風邪客于其間。痛隨氣之上下。或攻于心則心痛。下攻于腹則腹痛。上下相攻則心腹痛。或宿有風冷搏于血氣停絡。小腹痛也。

醋煎散

治婦人血氣腹脇刺痛。及產後敗血痛。

肉桂　良薑一錢　當歸　白芍藥

陳皮去白　烏藥各半兩

右剉。每服三錢。水醋各半盞。煎七分。不拘時服

木香通氣丸

治血刺疼痛

檳榔　大腹　京三稜　莪朮各四錢

茺花　木香三錢

右用米醋三升同煎醋盡。去茺花。炒令乾。餘二味切片子。焙同爲末麪糊丸如茺豆大。橘皮湯下三十丸。以止爲度。

玉抱肚

治停寒痼冷。心腹刺痛。常繫于臍腹間甚妙。

梁縣鄭主簿一方用針砂如上法炒乾止入礜砂五錢並不用餘藥

針砂一兩鐵銚內用木或竹棒不住攪令煙出盡爲度冷用神効

白礬一錢五分　粉霜　礜砂五分

右件同爲細末。與針砂拌和。只作一服。以水數

點酒用匙拌攤令厚皮紙爲貼闊二寸以上長四五寸貼之外帕包繫疼處或常繫臍下如覺大熱即以衣襯之若藥力過再洒水如前件用其熱如前初可用四五次藥力退即將針砂再炒過別入餘藥仍可用

五香拈痛丸

乳香一錢　斑猫七个　藿香一錢　也豆三枚去油

木香一錢　官桂一錢　丁香一錢

爲細末麪糊丸桐子大每服五七丸薑湯送下

下利及經水斷第三十四問

谷入于胃脉道乃行水入于經其血乃成胃者水谷之海也腸胃虛弱爲風邪冷熱之氣所乘不能腐化谷食先泄後變成利也受熱則赤虛寒則白谷氣內虧津液耗減所以下利而經水乃斷也經云利去經當自下故宜先治下利也

大斷下丸　治下利不止

細辛一兩半　乾薑炮三兩　良薑去芦三兩　肉豆蔻二兩

訶子去核二兩　龍骨三兩　酸石榴皮去穰醋炙三兩

白礬煅二兩　牡蠣醋紙泥固濟火煅一兩　赤石脂煅三兩
陽起石燒通紅三兩半　附子炮去皮臍二兩

右爲末。麪糊丸桐子大。每服五十丸。米飲下。

滲溼湯　治溼勝濡泄。

厚朴薑汁炒　白朮各一兩半　肉桂不見火　丁香
白薑炮各一兩　陳皮去白一兩　附子二隻八錢者炮切同薑炒赤去薑用
細辛去苗土　茯苓各一兩　縮砂仁一兩　肉豆蔻半兩
蒼朮半兩

右剉。每服四錢。水盞半。薑棗煎服。

婦人晝日明了暮則譫語如見鬼狀第三十五問

此婦人因傷寒之病。熱入血室也。何以明之。室屋室也。謂可以停止之處。人身之血室也。榮血停止之所。經脉留會之處。即衝脉也。衝爲血海。王冰云。陰靜海滿而去血。內經云。任脉通。太衝脉盛。月事以時下者是也。若經水適來。感其寒邪所搏。熱入血室。其症晝明了。暮譫語。如見鬼狀。熱入血室也。若施治其病者。當無傷胃氣。及上二焦必愈。

地黃湯　治熱入血室

黃芩　甘草炙各三兩　柴胡去苗八兩　半夏湯泡七次二兩
人參　生地黃各二兩半

右剉每五錢水二盞薑五片棗一枚煎服

龍齒琥珀散

治產後血虛心神恍忽言語失度睡臥不安

茯苓一兩　人參　龍骨　琥珀
赤芍藥　黃芪　當歸各半兩　牛膝去芦各三兩
麥門冬去心一兩半　生地黃二兩半

右剉每服三錢水一盞半煎六分溫服不拘時

癲癇之病何以別之第三十六問

邪入于陰則爲癲邪入于陽則爲狂皆爲風邪之所致也癲者卒然仆地吐涎沫口喎目急手足繚戾無所知覺良久乃甦狂者或言語粗惡不避親疎或自高賢或棄衣踰走亦有自定之時又有胎之時其母值大驚動精氣并居亦令子發癲其癲有五一曰陽癲二曰陰癲三曰溫癲四曰風癲五曰勞癲此隨其致病之由而命之名也又有牛馬等故以爲名也俗云病癲人之時而聲形狀如牛馬等雞犬癇其發

當忌六畜肉發癲之類。

大聖粒金丹　治諸風驚癲癇。

黑附子二兩炮去皮臍　白附子三兩炮去皮臍

五靈脂一兩　白蒺藜一兩炒去刺　沒藥半兩另研

殭蠶一兩炒去絲嘴　麝香半兩　細香墨半兩另研

硃砂半兩另研　金箔二百片爲衣　白礬半兩飛過

大川烏二兩炮

右將前六味爲細末。後四味研細合和用井花水研墨盡爲度。將墨汁搜和。杵臼內搗五百下。丸如彈子大。金箔爲衣。窨乾。每服一丸。生薑自然汁磨化。入熱酒隨意多少飲之。就無風處臥。衣被蓋覆。汗出即差。病小者。每粒分作二服。忌發風等物。孕婦不可服。謹之。

牛黃丸　治風狂喜怒不常。或欲狂走。

龍骨煅三兩　鐵粉研三兩　茯神去木三兩　人參去芦三兩

黃連去鬚一兩　鉛霜另研一兩　犀角屑一兩　防風去芦一兩

硃砂一兩　牛黃一兩　遠志去心一兩　龍腦另研一兩

甘艸炙五錢　麥門冬去心一兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服二十丸。熱水下不拘時。

祛邪散　治癲邪惡候

白礬三錢生用　黃丹半兩

右爲細末。用桑柴于兎中燒一伏時。每服半錢。空心乳香湯調下。

病有一臂痛有兩臂俱痛。臂痛者有數症。有因寒而得之者。有內多痰者。有因食寒飲冷傷于肺者。有汗出偏沮者。夫肝主諸筋。所經虛弱。風寒入傷。血氣與之相搏。筋寒則急。上連兩臂俱痛。宜服醒風湯理氣湯主之。或左或右痛不能舉臂者。此由痰在內。中脘停滯。脾氣不能流行。上與氣搏。留伏于內。在左則左痛。在右則右痛。若右臂深連于骨如斧鎚。其氣自嗌已下至臍。左右氣不相通。其痛發時。氣上奔急。合目悶絕。肌肉日消。漿粥不下。

心中煩悶。此由形寒飲冷。肺被寒結。留滯于左邊。若無故一臂無力。痛不能舉。龔自寒偏沮一邊。肥肉時復掣痛。或有不仁。手不得近。頭久成偏枯。宜服百風湯主之。

百風湯　治四肢垂曳。骨節疼痛。

獨活三兩　川芎藭三兩　防風三兩　當歸三兩
桂心三兩　白茯苓一兩　細辛一兩　附子炮去皮臍一兩
天麻一兩　乾葛炒半兩　甘艸半兩

右劑每服五錢。水二鍾。薑五片。煎一鍾。食前服。

渴病第三十八問

夫消渴之爲病。一也。推其受病之源。所得各異。指迷方論消渴之爲病。其由來有二。多緣嗜慾太甚。自有虛寒。服五石湯丸。猛烈燥藥。積之五臟。遂至精血枯涸。又久飲酒者。酒性酷熱。薰蒸臟腑。是致精液耗竭。乃生爲渴。婦人之渴。多因損血。血虛則熱。熱則能消飲。所以多渴。故與男子之病有異也。

栢子仁湯

滋養榮衞。調順心氣。亦治上焦虛熱燥煩。服之

多効。

新羅參　黃耆　茯神去皮　天花粉

天門冬去心焙乾用　麥門冬去心　甘艸各一兩

北五味半兩炒　栢子仁半兩　乾地黃二兩

右剉每服五錢。水鍾半。薑三片。棗三枚。煎七分温服

辰砂聚寶丹

治心肺積熱。口舌乾苦赤白。如小便泄。肌肉瘦。四肢力少。心神恍惚。又治消渴。消中。消腎。三

腰痛如折第三十九問

腰者腎之腑。足太陰經之所留注。若痛連小腹。不得俛仰。短氣。此由腎氣虛弱。勞傷過度。風冷乘之。有所不榮。故腰痛也。內經云。腰者腎之腑。轉搖不動。腎將憊矣。若姙娠腰痛者。其胎必下也。

杜仲散

杜仲去皮一兩薑汁炒去絲　官桂　牡丹皮各半兩

右爲細末。每服二錢。温酒調下。不拘時服。

當歸丸

當歸去芦三兩　水蛭三十枚炒　桃仁三十枚去皮尖另研

右爲末。酒煮糊爲丸。如梧桐子大。溫酒下十丸。未止加至三十丸。

腎著湯

甘草　乾薑各二兩　茯苓　白朮各四兩

右㕮咀每服五錢。水二鍾。煎一盞。溫。不拘時服

婦人面生黑皯黑點第四十問

黑皯黑子者。皆生於面。本是二證也。五臟六腑之經血。皆充於面。或痰飲漬藏。或腠理受風。致血氣不和。或溼或滿。不能榮於皮膚。故變生黑皯。若點點凝聚。謂之黑子。若生而有之者。非藥可治也

洗風散

治面遊風。或瘢瘮。或風刺黑皯

茺蔚草　晚蠶砂　赤小豆　黑丑

香白芷　藁本去土　姜蠶　白附子