產寶百問

中

V
G136.3
C47

2

Dr. Saiki's Library.
京都產院文庫藏書
函或架之番號
冊之番號 1966
備考

草烏頭　白斂　蔓荊子

右件等分爲末。每用一錢。澡浴用之

產寶百問卷之二

產寶百問卷之三

黃疸 第四十一問

黃疸病皆屬于脾。脾屬土而色黃。溼勝則土氣不流。瘀熱鬱發。則眞色見矣。大抵黃疸。本得之于溼熱相搏。身心發黃。若先有留熱。後有溼氣者。先治其熱。梔子黃蘗湯。茵陳五苓散主之。或先感其溼。後加其熱者。先去其熱。溼五苓散瓜蔕散主之。亦有因冷氣瘀結于脾陰。溼鬱而爲黃。先瀉其瘀。半夏瀉心湯。枳實理中湯主之。然後利其小便。若後病人一身面目悉

黃四肢微腫。胸滿不得臥。汗出如黃檗汁者。此由大汗出。卒入水中所致。謂之汗黃。宜苦酒湯。若非溼熱所鬱。婦人面色痿黃者。亡血之故也。宜服地黃散滋養血氣

苦酒湯

治女人黃疸。汗出如梔子汁

黃芪五兩　白芍藥三兩　官桂去皮三兩

右剉。每服五錢。水盞半。苦酒半盞。煎一盞。溫服不拘時

地黃散

治婦人血少氣寒。面色青白

地黃　乾薑各一兩

右爲細末。每服二錢。溫酒調下不拘時

茵陳五苓散

治女人溼熱相搏。面目及身。黃如金色

白朮　茯苓　澤瀉　猪苓各一兩

官桂半兩

右爲細末。以茵陳一分。水一盞。煎七分。調前末

藥服之

瓜蔕散

治女人感受溼熱變成黃疸之症

瓜蔕　赤小豆各等分

右爲細末粥飲調下半錢以吐爲度

檗皮湯

梔子二兩　檗皮三兩　甘草一兩

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

陰崩陽崩何以別之第四十二問

夫血氣之行外行經絡內榮藏府皆衝任二脉之所主也倘若勞傷過度致藏府俱傷衝任經虛不能制約其血故忽然暴下謂之崩中經云三焦絕經名曰血崩受熱而赤者謂陽崩受冷而白者謂陰崩其白者形如涕白者形如絳黃者形如爛瓜青者形如藍色黑者形如血是謂五崩也

膠艾湯

治婦人陽崩勞傷血氣衝任虛損月水過多淋

瀝漏下。連水不斷。臍腹疼痛

阿膠　川芎　甘艸各二兩　艾葉

當歸各三兩　白芍藥　熟地黃各四兩

右剉。每服三錢水一盞酒一分。煎七分。熱服

黃芩散

治崩中下血。用黃芩爲末。每服一錢燒秤鎚酒調下。崩中多是心血。此藥治陽乘陰經。所謂天暑地熱經水沸溢者也

固經丸

治婦人陰崩。衝任虛弱。月水不調。來多不斷。淋瀝不止

艾葉醋炒　鹿角霜　伏龍肝　乾薑各等分

右爲細末。溶鹿角膠和丸如梧子大。食前淡醋湯下五十丸

赤龍丹

治婦人崩漏不止

禹餘糧煆　烏賊骨　鹿茸涵炙　龍骨

白殭蠶　當歸　石燕子煆　阿膠

右爲細末。酒糊丸如梧子大。每服五十丸。溫酒下。艾醋湯亦可服

眠臥多汗何也　第四十三問

盜汗者。因眠臥而身體流汗也。皆由陰虛所致。久不止。令人羸瘦。心氣不足。乏津液故也。診其脉虛弱微細。皆盜汗脉也

大建中湯

治熱自腹中或從背脊漸漸蒸熱。或寒而汗。日漸羸瘦

白芍藥六兩　黃芪　遠志去心　當歸酒洗　澤瀉各三兩　龍骨　人參　甘草炙各二兩

右剉每服五錢水二盞薑三片棗一枚劈碎入飴少許煎一盞食前溫服

黃芪飲子

治婦人血氣不足夜間虛乏有汗倦怠少力

黃芪　五味子　當歸　白茯苓各半兩　白芍藥　遠志去心　麥子　人參　白朮各二兩　甘艸二錢

右剉每服三錢水一盞半煎三片煎七分溫服不拘時

左脇痛如刀刺不得喘息第四十四問

所居之腹左以藏血鍼經云邪在肝兩脇痛巢氏云左脇偏痛者由經絡偏邪客入故也人之經絡循環在身左右表裏皆遍若血氣調和不生虛實痛症或偏者邪偏傷之也其脇痛如刀刺者則知其邪偏客于左也甚者不得喘息

醋煎散

治婦人血氣腹脇刺痛

良薑一兩　當歸酒洗　肉桂去皮　白芍藥

陳皮去白 烏藥各半兩

右剉每服三錢水醋各半盞同煎七分溫服

趁痛散

治痛起于一邊或左右行還上下或在肌肉之間如錐刀所刺其氣不得息

蓬莪茂 官桂去皮 茺花醋炙 附子炮去皮各一兩 檳榔 細辛去苗各半兩

右剉每服二錢水一盞煎七分去滓溫服

積聚之病何以別之 第四十五問

積聚之病由陰陽不和藏府虛弱受于風邪藏府所成然陽化氣氣屬于六府陰成形形主于五藏陽則動而不息故聚者所發無根本上下無所留止其痛無常處故爲聚陰則靜而守位故積者始發有常處不離其部上下有所終始左右有所窮處乃爲積故積脉陰沉而伏象陰體之沉靜聚脉陽浮而大法陽性之浮動然積病有五隨其五藏相傳而生難經云在肝則曰肥氣在心則曰伏梁在脾則曰痞氣在肺

則曰息賁。在腎則曰奔豚。故積聚之症。卽此可別也

鼈甲丸

治小腹積聚。大如七八寸盤面。上下周旋。痛不可忍

鼈甲　官桂　蜂房各半兩　玄參
蜀椒　細辛　人參　苦參各一兩
丹參　沙參　吳茱萸各三兩
䗪蟲　乾薑　牡丹皮　附子
水蛭　皂角　當歸　赤芍藥
甘艸　防風　大黃　麋蟲各二兩
蠐螬三十个

右爲細末。煉蜜丸如梧子大。每服七丸。溫酒下。一日三次。加至以效爲度

沒藥散

治一切臍腰撮痛

血竭另研　肉桂去皮　當歸　蒲黃
紅花　木香　沒藥另研　玄胡索
乾漆炒令烟盡　赤芍藥各等分

右爲細末。每服二錢。食前熱酒調下。

紫金散

治血氣不和。血塊疼痛。

陳皮去白　枳殼去穰　玄胡索　肉桂去皮不見火

甘艸炙各一兩　當歸酒洗　香附炒各三兩　紫金皮五兩

南木香半兩生用

右爲末。婦人室女月水不調。少閉。羸瘦。蘇木煎酒調下。白雞冠花煎酒調下。亦可常服。安養胎氣。臨產橫生逆。葱白煎酒下。血氣脹滿。催生下死胎。煎枳殼酒下。地榆末煎酒下。亦可。產後血運頭旋。中風口噤。惡症發動。虛腫。黑豆淋酒下。產後惡血不止。血海衰敗。赤白帶下。胞漏。櫻櫚灰酒下。綿灰亦可。胎氣絞刺。脇肋腹肚疼痛。炒薑酒下。心氣不足。陳皮湯下。產後敗血停積。攻刺腰疼。無灰酒下。日午臨臥各服一次。忌生冷魚毒。常服煖子宮。通經絡

身體瘙痒第四十六問

身體常瘙痒。是體虛受風。風入腠理。與血相擊爲痛。故瘙痒也。仲景云。痒者。汗久泄。受風久成癬癩。亦由體虛受風邪之所致也

胡麻散

治脾肺風毒攻衝。遍身皮膚瘙痒。或生瘡疥。或生癮疹。用手瘙時。浸淫成瘡。久而不差。便作面上逆風狀如蟲行。紫癜白癜。頑麻等風。或腎藏風。攻注脚膝生瘡者。並宜服之

胡麻二兩　苦參　何首烏　荊芥

甘草炙　威靈仙各一兩

右爲細末。每服二錢。薄荷湯食後服。或酒調蜜亦可。服此藥後。頻洗浴。得汗出而待效

苦參丸

治徧身搔痒。時出黃水。及生大風。手足爛壞

苦參一兩　荊芥穗一兩

右爲細末。水糊丸如梧子大。每服二十丸。茶湯或荊芥湯下

夜夢鬼交　第四十七問

人有五藏。有七神。藏氣盛。則神强。外邪鬼魅不能干犯。若攝衛失節。而血氣虛衰。鬼邪侵傷。故婦人多與鬼魅交通。其狀不欲見人。如有對忤。獨言獨笑。或時悲泣者是也。其脉伏遲。或如鳥啄。顏色不變。皆邪物病也。設令宮中人與寡婦曾夜夢交通。邪氣懷惑。久作癥瘕。或成鬼胎

茯苓散

治婦人風虛鬼交。如有所見聞言語雜亂者

松脂二錢鎔　雄黃一兩研

右二味。用虎瓜攪令勻。爲丸彈子大。夜于烘籠中燒之。令女裸籠邊被急蒙身。唯出頭耳。過董即斷

秦丞相灸狐鬼神邪。及癲狂諸般醫治不瘥者。以并手兩大拇指用軟絲繩急縛之。灸三壯。艾炷着四處。半在甲上。半在肉上。四處盡。一處不燒其疾不能得愈。神效不可量也。小兒胎癇妳癇一依此法灸一壯炷如小麥大

黃帝灸法療神邪鬼魅及癲狂病語不擇尊卑灸上唇裏面中央肉弦上一壯如小麥大又用鋼刀將唇裏面弦上割令其斷。更佳也

大小便不通　第四十八問

大腸者傳道之官變化出焉傳者傳其不潔之物也上與肺合膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣化者溲便之注泄也內與腎合或臟腑不和榮衛不調陰陽二氣失升降之道致大小二腸爲閉結之患巢氏云熱則秘結寒則鴨溏熱搏于大腸則大便不通熱結于小腸則小便不通大小二腸受客熱之氣所結也小腸受熱化物不能得出是故膀胱不便溲也故便血尿血者皆由熱之所使也

枳杏丸

治臟腑堅秘澀

枳殼二兩先研爲末　杏仁二兩湯炮去皮尖研

右爲細末。用神麯糊丸。如桐子大每服四五十丸。食前服。米飲亦可

麻仁丸

治津液虧少。大便秘結

麻仁二兩去皮研　枳殼四兩麩炒　杏仁二兩

芍藥四兩　大黃四兩炮　厚朴二兩去皮姜汁製

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。米飲下三十丸。未止加至五十丸。此方當無忽

石葦飲子

陳皮　茯苓　芍藥　桑白皮

人參　黃芩各半兩　瞿麥　木通一兩

石葦去皮二兩

右爲細末。每服二錢。水一鍾。薑五片煎七分。去滓溫服

眞珠丸

常觀血之流行。起自于心。生之于脾。藏之于肝。此三經者。皆血所保之處也。若三經守節則血濡養而爲和。苟一臟有傷則血散溢而爲咎。指迷方云。小便赤色不痛不澀者。非熱非淋。由驚風乘心。氣散血溢無歸所。滲入下經。故治之多用治心藥救之。宜服下方

眞珠母 未鑽眞珠也三分研如粉　酸棗仁 炒去皮尖研　栢子仁 各一兩研　犀角 鎊屑　熟地黃 酒浸九蒸九暴焙乾　人參 去蘆一兩半　沉香 不見火　茯苓 去皮木　龍齒 各半兩

右爲細末。煉蜜丸。如梧子大。辰砂爲衣。每服四十丸。加至五十丸。金銀薄荷湯下。空腹一日服三次

帶下有三十六病 第四十九問

帶下者。由勞傷過度。損動經血。致令體虛受風冷。風冷入于[illegible]絡。搏其血之所成也。諸方說帶下三十六疾者。是十二癥。九痛。七害。五傷。三因謂之三十六疾也。十二癥[illegible]所下之物。一者如青泥。二者如青血三者如紫汁。四者[illegible]赤皮。五者如濃痂。六者如豆汁。七者如葵羹。八者如凝血。九者如青血似水。十者如米汁。十一者如月浣。十二者如經度不應期也。九痛者。一者陰中痛傷。二者陰中淋痛。三者小便即痛。四

者寒冷痛。五者月水來腹痛。六者氣滿並痛。七者汗出陰如蟲嚙痛。八者脇下痛。九者腰痛。七害者。一害食。二害氣。三害冷。四害勞。五者害房。六者害妊。七者害睡。五傷者。一者孔痛。二者中寒熱痛。三者小腸急牢痛。四者臟不仁。五者子門不正。三因者。一者月水閉塞不通。其餘二者原文闕而不載。張仲景所說三十六疾。皆因子藏冷熱勞損而夾帶下起于陰內也

養氣活血丹

治勞傷衝任帶下異色

艾葉三兩炒焦取細末　乾薑炮取細末二兩半用好酒二升生薑自然汁一升將姜艾末調于銀器內慢火熬成膏子　附子炮去皮三兩半　白芍藥　白朮　川椒　川芎　川歸　紫巴戟去心糯米炒　人參　五味子各二兩

右爲細末。入前膏子。幷炒熟白麪二兩半。和劑入杵臼內搗千下。丸如梧子大。每服五十丸。食前溫酒下。或米飲下

紫桂丸

治衝任氣虛經脉不調或多少腰疼腹痛冷帶崩漏補益血海。

禹餘糧三兩火煅醋淬七次　龍骨　艾葉

牡礪煅　赤石脂煅　地榆各二兩　厚朴薑製

牡丹皮　阿膠蛤粉炒成珠子用　當歸酒洗

吳茱萸　白芷　肉桂去皮各一兩

附子炮去皮臍二兩

右爲細末。麪和丸如梧子大。每服三十丸。濃煎艾醋湯空心

帶下或淋瀝第五十問

產後有三門一曰胞門二曰龍門三曰土門。衝任三脉行絡于中。已產者屬胞門。未產者屬龍門。未嫁者屬玉門。病源云。陰陽過度。勞傷經絡。故風冷乘虛而入于胞絡。衝任之經傷太陽少陰之氣。致胞絡之間。穢液相與兼帶而下。冷則多白。熱則多赤。久則爲淋瀝之病矣。

大補益當歸丸

治婦人諸虛不足。

當歸　續斷　吳朮　白薑
阿膠　甘艸　川芎各一兩　吳茱萸
附子　白芷　芍藥　官桂
地黃各三兩

右爲細末。麪糊丸如梧子大。每服五十丸溫鹽湯下亦可。

鹿角膠散

治婦人白帶下不止。面色痿黃。臍下冷痛。

鹿角膠　白龍骨　附子　桂心
當歸　白朮各一

右爲細末。每服二錢。食前粥飲調下。

大溫經丸

治婦人衝任經虛。腰腹冷痛。經水不調。或斷。或多。面色痿黃。肌體瘦弱。或帶下赤白。久不成效。

吳茱萸二兩湯浸二次焙　當歸五錢去芦尾只用中間獨莖身
川芎　芍藥半兩　人參去蘆五錢　牡丹半兩
肉桂一兩去皮　阿膠五錢蛤粉炒　熟地黃二兩
白茯苓一兩　艾葉一兩油炒赤色　蒲黃一兩微炒

琥珀 三錢血色者佳　附子 七錢一隻淨去皮

硃砂 一錢另研用

右爲細末。煉蜜丸。如梧子大。每服四十丸。米飲食前服。一日三次。大忌生冷動氣之物。

烏雞丸

治婦人虛損赤白帶下。

烏雞肉 不刀血去毛連肝腸骨肉藏用醋五大碗慢火煮熟獨取出用瓦盆盛過一宿次日將骨脯器盛銚令煅成灰用爲末　川芎 一兩

香附子 十兩用好酒浸旬日同醋入鐵鑊內煮候醋乾用火焙乾研爲細末穩用　淨熟艾 三兩用醋酒濕炒候過取入白米飲少許用杵白內煉成劑用手揑作薄餅安火上炙令乾研細末　川歸 三兩醋洗焙乾

牡礪 二兩　白薑 一兩炒　良薑 半兩　破故紙 半兩醋浸

熟地黃 三兩醋浸　丁香 一兩不見火

白芍藥 一兩　茴香 三兩醋浸一宿炒　山藥 二兩

烏藥 二兩

右除丁香外。切片焙乾。研爲細末。將前烏雞肉。香附米。艾米。同衆藥末入白內。煉成糍糕相似。然後入白米飲日內。再煉成丸。便住。丸如梧桐

子大。每服五十丸。空心酒醋湯下。如赤白帶下者。加龍骨一兩五倍子一兩五錢。

破故紙丸

土茴香一兩　木饅頭二兩燒灰存性爲末　破故紙洗淨炒香一兩生　半夏一兩用淨洗　石膏一兩火煅

右爲細末。酒糊丸如桐子大。每服五十丸。米飲醋湯皆可服。加至一百丸。

男女受形之始何以別之　第五十一問

男女之合。二精交暢陰血先至。陽精後衝。血開裹精精入爲骨。而男形成矣。陽精先入。陰血後參。精開裹血。血入居本。而女形成矣。陽氣聚面。故男子面重。溺死必伏。陽氣聚背。故女子背重。溺死必仰。鳥獸溺死。伏背皆然。父少母老產女必羸。母壯父衰生男必弱。古之良工。能察乎此。故補羸女。則養血壯脾。補弱男。則壯脾節色。此乃及時而嫁。男宜待壯而婚。此疾外所務之本。可詳察也

何以得之爲姙　第五十二問

經云。二月日後。便覺不通。診其脉理中和。婦無他疾。欲作胎也。脉經云。爲一婦人來診脉。自道經斷不來。師言一月爲胚。二月爲胎膏。三月爲居經。今經已居止不行。是爲作軀也

人參丸

養陰生血補虛

人參　鹿角膠　熟地黃　白芍藥

當歸　白朮　川芎各一兩

右爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服五十丸。空心米飲下

何以爲之居經 第五十三問

陽施則別。陽者氣也。陰化則搏。陰者血也。二精交暢。血氣和調。故令有子也。經云。肝主藏血。故一月謂之血凝。陰氣方始凝結。足厥陰肝經養之。肝與膽合。二月爲之胚兆。未成爲器。猶之胚也。足少陽膽經養之。三月神爲魂。手心胞絡經養之。天眞與之流通。故三旬一見。今既三月不行。所以爲居經也

白朮散

調補衝任。扶養胎氣。治姙娠宿有風冷。胎痿不

長或失于將理動傷胎氣多致損墮壞胎雖旋常服壯氣益血保護胎成

牡蠣燒粉二兩　白朮四兩　川芎四兩　蜀椒去目及閉口者炒出汗三分

右爲細末每服二錢空心溫酒調下

內補當歸丸

熟地黃酒浸九蒸九晒二兩　當歸酒洗焙十二兩

右爲細末煉蜜丸梧子大每服三四十丸空心溫酒送下

嘗觀許學士論枳殼散四物湯內補當歸丸此三方皆載之在人用之何如耳大抵婦人雖旋惟在抑陽助陰素問云陰搏陽別謂之有子蓋關前爲陽關後爲陰尺中之脉按之搏手而不絕者雖子也婦人平居陽氣微盛無害及其雖子則方閉經遂以養胎水弱陽盛搏之則至經行時而不安固素問所謂陰虛陽搏謂之崩也抑陽聚陰之方甚多然胎前藥惟惡羣隊若陰陽交雜別生他病唯是枳殼散所以抑陽四物

湯所以助陰故爾枳殼散差寒若單服之恐有寒搏腹痛之疾以內補丸佐之則陽不致强陰不致弱陰陽調和有益胎嗣此人之未嘗論及此也

婦人居經異熱惡食

雍娠心中惰悶頭運四肢煩疼懈怠不欲熱作惡聞食氣欲食鹹酸果實多睡少起者是云惡食人云惡子是也此由婦人元本虛羸血氣不足腎氣又弱當風飲冷太過心下有積水水潰于臟故心煩憒悶氣逆而嘔吐也挾風則頭運此名惡阻所謂阻者經血既閉痰水停積于中阻其臟氣不得宣通也

竹茹湯

治雍娠擇食嘔逆頭運顛倒寒熱煩悶

陳皮去白 人參 白朮 麥門冬去心

茯苓各一兩 厚朴半兩 甘艸一錢炙 淡竹茹一團

右剉。每服四錢。水盞半。入生薑竹茹四兩在內。煎八分。溫服。

茯苓丸

治雜娠阻病。心中煩悸。頭目眩重。憎聞食氣。嘔逆吐悶。

甘艸炙五錢 人參去芦 赤茯苓去皮 乾薑炮 肉桂去皮 陳皮 半夏湯泡七次焙各一兩 枳實 葛根 白朮各二兩

右爲細末。蜜丸桐子大。每五十丸。空心米飲下。

小地黃丸

治雜娠醋心吐清水。腹痛不能飲食。

人參去芦 乾薑炮各等分

右爲細末。煎地黃汁丸如桐子大。每服五十丸食前溲薑湯下。

居經之後或腹有漏下者何也 第五十五問

衝任二脉。爲經血之海。皆起于胞中。手太陽小腸。手少陰心經。互爲表裏。作胞之際。產之養胎。既產之後。積之爲乳汁。或衝氣虛。不能制其經血。故雍娠數月。經水時下者。此名漏胎。漏下不止。則斃胎也

止漏散

治雍娠漏胎

乾地黃二兩半　乾薑二兩

右爲細末。每服二錢。空心米飲調下。

阿膠散

治胎動不安。漏胎腹中痛

阿膠蛤粉炒成珠一兩　當歸一兩　熟地黃一兩半

甘艸一兩炙　白朮一兩　白茯苓三兩　桑寄生一兩半

龍骨三分　川芎三兩　乾薑炮半兩

右剉。每服四錢。水盞半。棗三枚。煎六分。溫服不拘時

佛手散

治婦人雜娠五七月因事築磕損胎。或子死腹中。惡露下疼痛不已。口噤欲絕。用此藥探之。若胎不損。則痛止。子母俱安。若胎損。立便催下

當歸六兩　川芎四兩

右剉。每服二錢。水一盞。煎令沸。欲乾。投酒半盞止一沸。去滓溫服。口噤灌之。如人行五里再進三兩服。便生矣

胎動不安　第五十六問

懷則以體也。娠則以時動也。若腹中不時撞動者謂之胎動也。多因勞役氣力。觸冒冷熱。飲食不節。居處失宜。輕者止動轉不安。重者便至損墮。若母有疾。以疾動胎者。治母則胎安。若胎不固動致母疾者。則胎不牢固。其胎必損也。

保安散

治妊娠胎氣不安。心腹疼痛。胎動安胎。

當歸一兩半　人參一兩　阿膠半兩蛤粉炒成珠

甘艸半兩炙

右剉。每服三錢。水盞半。葱白一莖。煎八分。溫服未定再服。

安胎飲

治妊娠偶因所觸。或從高墜下。致胎動不安。腹中疼痛。服此藥後。覺胎動處熱。即胎已安矣。

縮砂仁不拘多少。慢火炒令熱透。後去皮取仁用

右爲細末。每服二錢。熱酒調下。不飲酒者。鹽艾湯空心下。

子滿

妊娠之人。經血壅閉。以養其胎。或挾水氣。水血相搏。致身體腫滿。皆由脾胃虛弱。藏府之間。宿有停水之挾。故謂子滿。若水停不去。浸漬入胎。則令胎壞。診其脉浮。腹滿兼喘者。此胎必壞也。

澤瀉散

治妊娠氣壅。身體腹脇浮腫。喘息促急。大小便秘澀。

澤瀉　桑白皮　枳殼麩炒黃色　檳榔

赤茯苓　木通各一兩

右剉。每服四錢。水盞半。生薑五片。煎八分。空心溫服。

姙娠三月曾經墮胎至其月日復墮者第五十八問

陽施陰化。則有胎也。謂血氣和調。胎氣乃固。若或血氣虛損。子藏爲冷風所乘。致使榮虧衛弱。不能蔭養其胎。故數墮也。假令姙娠三月當手心包絡經養之不善攝生。傷經則墮胎。後雖再有姙。至其月日。仍前犯之。則復墮也。又有因墜墮驚恐。或吐血下血者。皆能損傷。若姙娠常腰痛者。多墮胎也。蓋腰爲腎府。女子以繫胞胎也

地榆散

治姙娠胎損下血不止

地榆三兩　乾薑一兩炮　當歸三兩炒　龍骨三兩

川芎三兩　艾葉半兩微炒　阿膠三兩蛤粉炒成珠

蒲黃半兩　熟地黃一兩　白朮半兩　海螵蛸三兩燒灰

黃牛角鰓一兩炒灰

右爲細末。每服二錢。以粥飲調下。不拘時候。

卷栢丸

治姙娠數墮胎。皆因氣血虛損。子藏受風冷。致令胎不堅固。頻有傷墮也。

卷栢　鍾乳粉　鹿角膠搗碎炒令黃燥

熟地黃　桑寄生　五味子　川芎

紫石英火煅細研水飛過　當歸　桑螵蛸炒

禹餘糧煅醋淬七次各一兩　桂心　杜仲去皮微炙黃色

牛膝　蛇床子　牡丹皮去骨各三兩

右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服五十丸。空心溫酒送下。

大小便不通第五十九問

陽虛不能運陰故氣無陰以清其陽則陽獨治而爲熱陰虛不能運陽故氣無陽以和其陰則陰獨治而爲厥是以二氣平則氣和二便順則氣通若二便秘結明陽氣之獨治也夫人有府藏氣實而生熱者隨其停積之處而成病也若熱結大腸則大便不通熱結小腸則小便秘澀若大小腸俱爲熱所結故煩悶而二便壅塞也熱盛則傷胃氣逆令變子嘔也

檳榔散

治產後大小便秘。心腹脹滿氣促

檳榔一兩　車前子三兩　冬瓜仁三兩　川大黃一兩微炒

木香一兩　桂心去皮　甘艸炙半兩　當歸半兩炒

滑石一兩　朴硝一兩用結凝成塊者佳

右剉每服二錢。水一盞煎八分。溫服不拘時。

木通散　治產後大小便秘澀

木通二兩　大麻子　冬葵子　滑石

檳榔各一兩　枳實半兩麸炒黃色　甘艸半兩

右剉每服二錢。水盞半煎八分。溫服不拘時

姙娠傷寒與常傷寒治法同異第六十問

四時皆有不正之氣。如春夏亦有寒涼時。秋冬亦有溫熱時。故一歲之中病有長幼皆相似者。此則時行之氣。俗謂之天行。若春應溫而清風折之則邪在肝。夏應暑而寒氣折之。則邪在心。秋應涼而反熱則邪在肺。冬應寒而反溫則邪在腎。仲景云冬溫之毒。與傷寒大異。蓋傷寒者。因寒而作也。其後發熱惡寒頭痛腰疼。其脉浮緊無汗者可發汗。宜麻黃湯。脉浮細無汗者可解肌。宜桂枝湯。竊詳麻黃桂枝皆能墮膽。

以此言之。則姙娠傷寒與常人治法。大不相侔也

十全散

治傷寒瘟疫

人參去芦　羌活　茯苓去皮　獨活

甘艸　川芎　枳殼去穰　柴胡去芦

白朮　桔梗各一兩

右剉。每服三錢水盞半。生薑五片薄荷數葉。同

煎七分服

阿膠散

治姙娠傷寒安胎

阿膠　桑寄生　白朮　參等分

右爲細末。糯米湯調下二錢

產寶百問卷之三終