產寶百問卷之四

姙娠傷寒差後復發熱 第六十一問

傷寒差後發熱者。此名勞復食復也內經云。多食則復食肉則復緣病新差血氣尚虛。津液未復。因勞動生熱氣既還復入經絡。名曰勞復仲景云。傷寒差後更發熱者。小柴胡湯主之。脉浮者以汗解。脉沉者以下解。又傷寒差後勞復者。枳實梔子湯主之。千金勞復起死人參麥門冬湯。又有食復者大病新差脾胃尚弱。穀氣未復強食過多。停積不化因此發熱。名曰

食復仲景云。枳實梔子湯證若有宿食內加大黃。

枳實梔子湯

淡豆豉兩半　枳實麩炒　梔子三枚半肥者

右用水二盞半煎九分。下豉煎五六沸溫服。復令汗。若有宿食內加大黃如棊子大五六枚同煎服

時氣溫病皆能損胎　第六十二問

陰陽大論云春氣溫和。夏氣暑熱秋氣清涼。冬氣凜烈此則四時正氣之序。冬時嚴寒萬類深藏。君子固密則不傷於寒。若傷寒者。乃名傷寒耳其一歲之中。長幼之病多相似者。故名時行之氣也。其傷於四時之氣也。皆能爲病以傷寒爲毒者。名曰傷寒若卽病者。以其最受殺厲之氣中時卽病者。眞傷寒也。寒毒藏於肌膚至春變於溫病至夏變於暑病者。若熱極重於溫也詳此三證。皆因寒氣而受邪寒極生熱熱

薰蒸其胎故損也。

人參羌活湯

治姙娠感冒發熱。頭疼身體痛

白茯苓　羌活　獨活　前胡

芎藭　枳殼麩炒　桔梗　人參

乾葛　陳皮各一兩　甘艸五錢炙

右剉散。每服三錢水一盞薑五片。棗一枚煎七分。溫服

黃龍湯

治姙娠婦人。寒熱頭痛嘿嘿不欲飲食。脇下痛嘔逆痰氣。及產後傷風。熱胎宮熱如瘧。

柴胡　黃芩　甘艸炙　人參各一兩

右剉劑。每服五錢。水盞半。煎至八分。楂再煎。不拘時溫服

姙娠寒熱或因暑氣有不因傷而得第六十三問

瘧者。寒熱之疾。皆因風寒之入中也。夫風爲陽邪。陽化氣而爲熱。寒爲陰邪。陰化氣而爲寒。上下交爭。虛實邪正更作。或陰并於陽則陰實而陽虛。若陽并於陰。則陰虛而陽實。或先傷於寒而後傷於風。其爲候也。則先寒而後熱。或先傷於風而後傷於寒。其爲證也。則先熱而後寒。故發作有時。與傷寒頗異者。故名瘧也。經曰。夏傷於暑。秋必病瘧者。此暑氣之所傷也若姙娠寒熱者。此由血氣虛損。風邪乘之。致陰陽并

隔寒熱互見也。經云陽微惡寒陰弱發熱若此之類皆由虛之所致此不因暑氣而作也若熱不已薰蒸其胎傷損也。

大安湯

治脾寒如瘧發寒熱無時。

草菓七箇和皮炒　厚朴半兩薑製　烏梅十箇連核去仁
甘艸一兩　人參一兩　大棗十箇連核　生薑一兩去皮
陳皮去白一兩　良薑一分

右剉拌勻。分作五畧。先以鹽水蘸溼紙裹藥煨香。第一服用一畧。水一碗。煎一盞。溫服。第二服用二畧。并前滓以水二碗。煎盞半溫服。第三服用三畧。并前滓以水三碗。煎一盞。食前服。餘畧同。

地黃丸

治寒熱類瘧。久之爲癆。

生地黃一兩　柴胡去苗　秦艽去蘆　黃芩各半兩
赤芍藥半兩

右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服三十丸。烏梅湯下不拘時

清肌湯

治頭目昏眩不悅。頰赤口燥。咽乾發熱。盜汗飲食減少。

甘草炙微赤　草菓各半兩　當歸微炒　茯苓　芍藥　白朮　柴胡去蘆各一兩　川芎半兩

右剉。每服三錢。水一盞。燒薑一塊。切破。薄荷少許。煎七分。熱服。不拘時。

下利與滯利第六十四問

春傷於風。邪氣留連。腸胃虛弱。風邪因而傷之。腸虛胃泄。故爲水穀利也。或腸虛受熱氣者。下利則赤。受冷氣者。下利則白。冷熱相交。如魚腦鼻涕相雜。連滯不已。謂滯利也。可用香連丸。

香連丸

治積滯不行。裏急後重。數至圊不能便。而去少。

木香　黃連　吳茱萸　白芍藥各等分

右爲末。麪糊丸。桐子大。每服二十丸。空心米飲

下。日三次。

治雄娠下利不止。

黃蘗　乾薑　赤石脂各三兩

石榴皮一塊

右剉每服五錢。水盞半。煎六分。食前溫服

赤石脂散

治腸胃虛弱。水穀不化及冷熱不調。下利赤白。腸滑腹痛肢體困倦。飲食減少。

赤石脂二兩　甘草二兩　肉豆蔻十兩　縮砂仁五兩

右爲細末。每服二錢。米飲食前調服。

歸連丸

治一切下利不拘新久。及冷熱臟血腸滑裏急後重。日夜無度臍腹絞痛。不可忍者。

當歸去芦　乾薑炮兩　木香一兩半　黃連六兩去鬚

阿膠搗碎蛤粉炒如珠。爲末三兩。以醋四升。煮成膏子。

右爲細末。以阿膠膏和丸。如桐子大。每服三十丸。空心米飲下。日三次

喘證 第六十五問

喘息之病皆由營衛之氣行流於肝。肝氣乘肺。此喘出於心或度水跌仆。腎氣暴傷。而不通行流於腎。腎氣上行乘於肺。此喘出於腎經或因飽食過傷。動作用力。谷氣不行。脾氣逆而乘肺。此喘出於脾經。凡諸臟相干。或乘而喘。其證各不同也。

神秘湯

治不得臥困則喘。此由水氣逆行上乘於肺。肺得水。則浮而開。使氣不得流通。其脉浮大。

陳皮湯洗去白　生薑　紫蘇葉　人參

桑白皮各等分

右剉每服三錢。水盞半。煎七分。溫服不拘時

平肺湯

治喘急咳嗽。

天門冬　馬兜鈴　百部各半兩

右剉每服五錢水盞半。煎七分。溫服。

娠多痰第六十六問

痰因飲食生也。氣道壅滯。津液不通。飲食停滯。胸膈結而成痰者。人皆有之。少則不能爲害。多則成病。妨飲食及上嘔吐。姙娠病嘔吐甚者。多傷胎也。

細辛五味湯。

治姙娠痰氣上升。

細辛一兩　五味子三兩　白茯苓　白朮

人參　甘草炙　乾薑炮各一兩

右剉每服五錢水盞半。煎八分。食後溫服。

赤茯苓湯

治雉娠嘔穢。痞滿膈。有停水頭暈。

人參　赤茯苓　芎藭　白朮

半夏各半兩　生薑五片

右剉每服五錢。水盞半。煎七分。無時溫服。

雉娠霍亂第六十七問

陰陽不順。清濁相干。氣射中焦。名曰霍亂。本因飽食豚膾。聚而生痰。或飲寒漿。眠臥冷蓆。風冷之氣。傷於脾胃。諸食結而不消。陰陽二氣。壅而不散。交錯於中。變而吐利。邪在上者。先心痛而吐。邪在下者。先腹痛而利。心腹俱痛。吐利並發。挾風者身熱頭痛。冒暑者吐利冷飲。若不已。則百脉昏亂。營衛俱虛。冷搏於筋。令人轉筋。干於胎。其胎必損。昏霍之間。使成撩亂。故名之霍亂也。

白朮散

治產後霍亂吐利。腹痛煩渴。手足厥冷。

白朮一兩　麥門冬去心一兩　人參一兩

陳皮去白　乾薑　甘艸各半兩

右剉。每服四錢。水一盞半。薑五片。煎六分。不拘時溫服。

理中湯

治裏寒外熱。霍亂吐利。手足厥冷。胸膈滿悶。痛逆。

人參　白朮　甘草炙　乾薑炮各三兩

丁香一兩

右剉。每服三錢。水盞半。煎八分。空心溫服。

丁香散

治霍亂吐利不止。

丁香一兩　桂心　白朮各半兩　訶梨勒

厚朴　良薑　附子各三兩　木瓜

陳皮各一兩

右爲細末。每服三錢。米飲湯調下。不拘時。

五苓散

治霍亂吐利燥渴引飲。

白朮三兩　赤茯苓三兩　猪苓三兩　肉桂一兩

澤瀉五兩

右爲細末。每服二錢。熱湯調下。不拘時服。多飲熱湯有汗出即愈。

參苓白朮散

治胃氣不順吐利止後燥渴不解

白朮二兩　人參一兩　白茯苓四兩　木香一兩

甘草炙　藿香各一兩

右剉每服三錢。水盞半。煎七分。溫服不拘時。

香薷飲

治清濁相干霍亂吐利

香薷去梗三兩　厚朴去皮二兩　黃連一兩

右剉。每服三錢。水一盞。酒半杯。煎七分。放水中。俟冷服之。

何以謂子煩　第六十八問

煩有四證。有中心煩。有胸中煩。有虛煩。有子煩諸有此者。皆熱也。若藏虛而熱氣乘心。則令心煩但煩而似無疾者。名曰虛煩。若積痰飲而嘔吐涎沫謂之胸中煩或血飲停積。虛熱相搏以其姙娠而煩謂之子煩也。

犀角散

治姙娠心煩熱悶。

犀角屑　地骨皮　黃芩　麥門冬去心

赤茯苓去心　甘草炙各半兩

右剉每服四錢水盞半煎八分入竹瀝少許無時服

當歸飲

治

葱白十莖　當歸　芎藭　阿膠炒

豉　桑寄生各半兩

右剉每服三錢水二盞煎八分不拘時溫服

竹瀝湯

治嬰孩常苦煩悶乃子煩也

竹瀝三兩　防風　黃芩　麥門冬各二兩

茯苓四兩

右剉每水四升合竹瀝煮取一升半分作三服不差重服之

何以謂子嗽第六十九問

肺主乎氣。外合皮毛風寒外感。入射于肺。故爲咳也。有涎者。謂之嗽。無痰名曰咳。夫五臟六腑俱受氣於胃。以其時感於寒。而成病也。秋則肺受之。冬則腎受之。春則肝受之。夏則脾受之。諸臟不已。各傳於腑。姙娠而嗽者。謂之子嗽。久不已。則傷胎。

天門冬湯

治惡熱咽喉燥。脉數咳嗽甚則咯血。

天門冬去心半兩　紫菀去苗土洗焙

知母各一兩　桑白皮一兩　北五味　桔梗各半兩

右剉。每服五錢。水二盞。煎一盞。溫服。有血加阿膠半兩。大便澁而喘。加葶藶半兩。

百合散

治雄娠咳嗽。心胸不利。煩悶不欲飲食。

百合　紫菀去苗土　麥門冬去心　桔梗

桑白皮各一兩　甘草炙半兩

右剉。每服五錢。水盞半。入竹茹一分。煎八分。去滓。入蜜一匙。更煎二三沸。溫服。不拘時。

緩息丹

治肺氣不調。痰壅咳嗽。上氣喘滿。嗽喘唾涎沫

半夏麴二兩。湯洗七次。候乾。研末。薑汁和。候乾。再爲末。薑汁再和。七次。不辣爲度　陳皮半兩去白　天門冬半兩　杏仁一兩去皮尖另研成霜

右爲細末。次拌杏仁霜在內。煉蜜和。每兩作十五丸。每服含化津液嚥之。食後服。

胸痺第七十問

胸痺者。因寒氣客於臟腑氣上衝胸心下愊愊如滿噎塞。習習痺痛。飲食不下謂之胸痺脾胃漸弱乃至斃。妊娠婦人爲患亦令損胎。

枳實理中丸

治胸結欲絕。心膈高起手不得近。

茯苓二兩　人參二兩　枳實十六片麩炒去肉　薑去

右爲細末煉蜜丸雞子黃大每服一丸白湯下連進三服胸中豁然而開渴者加括蔞根二兩

下利者加牡礪一兩。

桔梗枳殼湯

治痞氣胸滿欲絕。

桔梗　枳殼湯洗去穰炒各一兩

右剉如麻豆大。水二盞。煎一盞。去滓溫服無時

沉香理氣湯

治氣不和胸膈虛痞。

丁香　檀香　木香各半兩　甘艸

香附各二兩　縮砂　白荳蔻　烏藥　人參各一兩

右爲細末。每服一錢。入鹽一字。沸湯點服無時。

調氣丸

治氣道不順。胸膈壅塞。

青皮洗一兩炒　陳皮洗去白　木香各一兩不見火

右剉用黑丑末四錢。同三味共炒焦黃。去黑丑末。將三味爲細末。煉蜜丸桐子大。每服五十丸。空心生薑湯送下。

子癇　第七十一問

風是四時八方之氣。常以令至之日候之。風從其鄉來者。乃名虛邪賊風。體弱虛而中之者。隨其入病也。夫五臟六腑之俞。皆在背。臟腑既虛。則邪乘虛而入傷其臟腑。所感而發。皆言難治。若傷太陽之經。復遇寒濕相搏。口噤背强。名曰痓。故姙娠而發者。昏冒不識人。須臾則醒。醒後復發。名曰子癇。又曰子冒。久則變痓。姙娠昏悶。眼不識人。須臾醒。醒復發。不醒。名曰痓病。亦號子癇。病亦號子冒。宜葛根湯。若有竹近。可

速便當先作竹瀝汁湯。其竹遠不可即辦。當辦竹湯此物偏療諸痓絕。可起死也。小兒忽癇痓。與金瘡療之亦驗。取竹瀝法列于後。

葛根湯

治姙娠臨月。因發風驚。忽悶憒不識人。吐逆睡少。醒後復發。名曰子癇。

貝母　葛根　牡丹皮去心　防己
防風　當歸　芎藭　桂心
茯苓　澤瀉　甘艸炙各二錢　獨活
石膏　人參各三錢

右以水六升。煮取三升。分三服。其貝母令人易產。若未臨月。以升麻代之。忌海藻菘菜酢物。

胎痿過年不產又兩胎一死一生第七十二問

陽施陰化精盛有餘者則成兩胎脉經俱疾爲二子俱沉實決生兩男俱浮大爲生二女且胎在胞以血氣滋養若寒溫節通血氣强盛則胎無傷若冷熱失宜氣血損弱則胎痿而不育或過期而不產若雙胎遇寒經養不周故偏傷也候其胎上冷是胎已死如雞乳子熱者爲生寒者多濁謂此也

熟地黃丸

治娠氣血虛弱胎氣不長

熟地黃一兩　芎藭　白茯苓　人參
當歸　阿膠炒如珠　龍骨各三兩　柴胡
紫蘇　桑寄生各半兩　厚朴一兩薑汁炒
黃耆半兩　白石脂三兩　甘艸一錢微炒

右爲末煉蜜丸。桐子大。每服三十丸。不拘時清粥飲下。

雄黃丸

治妊娠是鬼胎。致腹中黑血。數下腹痛。

雄黃細研　鬼臼　莽草　丹砂細研
巴豆去皮油　蜈蚣一條微炙黃色　獺肝炙令黃各半兩
蜴蜥一枚炙黃

右爲末。煉蜜丸如桐子大。空心溫酒下二丸。日再服。後當下利。如不利加至三丸。初下清水。如蠱如馬尾狀無數。病極者。下蛇蟲。或如蝦雞子或如白膏。或如豆汁。其病悉愈。

白朮散

治調補中氣。扶養胎元。妊娠宿有風冷。胎痿不長。或失於將理。傷胎氣。多損墮壞。如常服。壯氣

益血保護胎臟

牡礪燒灰三兩　白朮　芎藭　蜀椒去目微炒三兩

右爲末每服二錢空心溫酒調下。

蟹爪散

治妊娠兩兒腹中一死一生令死者出生者安。

蟹爪一升　甘艸二尺炙　阿膠二兩炒

右以東流水一斗先煑二味取三升內阿膠令拌頓服不能頓服再服若人危拗口下藥人即活煎藥宜向竈東以茅葦薪煎之

妊娠墮胎或血出不止或血不出第七十三問

血寒則凝血溫則散若墮胎損經其血出不止者而有二也一則因熱而流散二則氣虛而不斂瀉血多者必煩悶而死或因風冷墮胎者血冷相搏氣虛逆上則血結不出搶攻則煩悶亦致多危殆當溫經逐寒其血自行也。

膠艾湯

治勞傷氣血衝任虛損月水過多淋瀝漏下連日不斷臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安。

腹痛下墮或勞傷胞絡漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制經血淋瀝不斷延引日月漸成羸瘦

阿膠三兩　芎藭二兩　甘艸炙二兩　當歸去蘆三兩　熟地黃　白芍藥各四兩　艾葉二兩炒

右剉每服三錢水一盞酒六分煎七分空心溫服一日三次甚者連夜飲

伏龍肝散

治血氣勞傷衝任脉虛血經非時忽然崩下或如豆汁或成片血或五色相雜或赤白相兼臍腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸

熟地黃二兩　甘艸炙半兩　芎藭三兩　肉桂去皮半兩　當歸去苗三兩　乾薑炮二錢　艾葉一兩微炒　赤石脂一兩　麥門冬一兩

右剉每服四錢水盞半棗三枚去核煎七分食前溫服

當歸散

治姙娠奔驚奔走。或從高墜下。腹痛下血不止

當歸二兩半微炒　阿膠三兩搗碎炒成珠

艾葉一兩微炒　芎藭一兩

右剉每服四錢。水盞半。煎六分。次入薑汁一匙。

地黃汁半合。更煎二三沸。溫服不拘時。

子淋第七十四問

腎者。作强之官。伎巧出焉。與膀胱爲之合。男子以藏精。女子以繫胞胎。啓玄子云。彊爲作用。故爲作强。造化形容。故曰伎巧。在女則當其伎巧。在男則當其作强。夫淋者。腎虛膀胱熱也。腎虛不能制水。則小便數也。客熱乘於膀胱。則水行澁澁而且數。淋瀝而酸痛。姙娠之婦繫胞於腎。腎患虛熱成淋。故謂子淋。

地膚湯

治姙娠患子淋。小便數出而少。或熱而痛酸疼。

地膚草三兩水四升煑取三升半分三服　知母

黃芩　白茯苓　芍藥　枳實炙去穰

升麻　通草　甘艸炙三兩　車前三兩

右剉每服四錢。水一盞。煎七分。空心服或飲地膚葵根亦妙

石葦散

治產後卒淋瀝溺血。

石葦去毛一兩　榆白皮一兩　赤芍藥　葵子各半兩

黃芩三錢

右剉。每服三錢。水盞半。生地黃一分。煎六分。服。一日三次

安榮散

治婦人姙娠。小便淋瀝

麥門冬　通草　滑石　當歸

人參　燈心　細辛　甘艸等分

右爲末。每二錢。空心煎服。

小便或有利者或有不利　第七十五問

小腸爲受盛之府膀胱乃州都之官啓玄子云位當孤府故謂之都官居下內空故藏津液若得髓海之氣則能滲泄也或受熱滲於脬脬掘擗而絲轉故使小便不通利也或腎胞有冷不能溫制於水道故小便日夜十數行甚者至於亂夢恍惚寒者宜大建中湯蓯蓉丸熱者琥珀散方見指迷方

萆薢丸

治婦人小便不禁

蓯蓉一兩焙　兎絲子半兩酒浸研　益智搥碎
萆薢鹽水煑乾半兩　巴戟半兩去心　杜仲麩炒半兩
黃耆一錢　狗脊金毛三兩

右爲末。酒糊丸桐子大。每服四十丸。空心鹽米飲下。

冬葵子散

治雍娠胎不安。小便淋瀝。小腹疼痛。

冬葵子炒　柴胡去苗　桑白皮　赤茯苓
赤芍藥　當歸各三兩

右剉每服四錢。水盞半。薑五片。葱白一莖。煎六分。空心温服。不拘時。

車前子散

治下部畱熱。小便不通。淋瀝作痛。

檳榔　木通　陳皮去白　赤芍藥
車前子　赤茯苓　當歸　滑石
石葦炙去毛各一兩

右剉每服五錢。水二盞。煎入分。温服。以利爲度。未利食前再服。

大便或利或不利 第七十六問

大腸者傳道之官變化出焉獨受諸陽之氣化其糟粕故傳其不潔之道也若三焦不調臟腑不和受熱則津液渴燥腸胃秘澁大便不通有寒則腹痛腸鳴水穀併下故熱宜清而通之寒則宜溫而固之

建中湯

治脾胃不和中脘氣滯宿寒畱飲停積不消心腹刺痛脇肋膨脹嘔吐痰逆噫氣吞酸腸鳴泄利水穀不化肢體倦怠不思飲食

青州棗一斤　厚朴去皮薑炒一斤　半夏湯洗七次五兩

陳皮去白一兩　乾薑五兩　甘艸五兩

右六味用水三升煑令水盡焙乾爲細末薑米

飲調下

人參白朮散。

治脾胃虛寒下利泄瀉

人參　白朮　木香　訶子炮去核

草豆蔻　茯苓去皮各一兩

右剉每服三錢水一盞薑三片煎六分食前服。

四順飲子

治便下覺臟腑疼痛泄瀉飲食不美因多憂所致或寒氣所積而成利。

白朮　訶子　肉豆蔻　砂仁

右剉每服三錢水盞半煎七分空心溫服

煑朴丸

治洩利之聖藥。

北棗半兩　川厚朴去皮　生薑各四兩

用水三盞煑乾將薑搗爛入棗肉一處再杵細

麻油塗手。捉如小錢大。慢火上焙乾入後藥。

蒼朮米泔浸炒　茴香炒　甘艸炙　官桂去皮

神麯炒　麥芽炒　縮砂　良薑炒

肉豆蔻煨各三兩

右爲細末水糊丸如桐子大。每服一伯丸米飲

送下無時

豆蔻橘紅散

治溫脾養胃。消穀嗜飲

木香　丁香各一兩　白豆蔻　人參去蘆

白朮　厚朴薑製　神麯炒　乾薑炮

半夏麯炒　陳皮去白　藿香　甘艸炙名半兩

右剉每服三錢。水一盞。薑三片。棗一枚。煎七分。

空心溫服。

姙娠至八九月兩脚俱腫

姙娠脚腫者非水氣之比也。姙娠至八月間腿脚腫者不可爲水病治之。導其眞氣。見此腫者。知其易產也。葢胞臟水血俱多。不致胎燥。故云易產也。常服順氣滑胎之藥若初姙而腫者。是水氣過多也。兒未成體故壞胎也

枳殼散

治養胎氣安和子臟。胎中一切惡疾。能令滑胎易產

枳殼四兩麩炒　甘艸炙一兩

右爲細末。每服二錢。空心白湯調服一日三次。

榆白皮散

治滑胎易產。姙娠曾經滑胎去血。或臨產驚動太早。產時未至。穢露先下。胎燥難產。

大麻仁去殼　冬葵子　榆白皮　瞿麥各一兩

木通半兩　牛膝去蘆酒浸焙

右剉。每服三錢。水盞半。煎七分。溫服不拘時。

救生散

治安胎益氣易產。

人參　訶子溫紙裹煨熟去核　陳皮

白朮炒黃　神麯炒黃各半兩

右剉。每服三錢。水盞半。煎七分。空心溫服。八月加倍。用水二盞。煎一盞。溫服。能令緊小。乳母方無患。

姙娠十月將養之法　第七十八問

陰搏陽別爲之有子。此是氣血和調。陰陽施化也。胗其手少陰脉動甚者。姙子也。所謂姙者。陽既受始而陰姙之也。娠則以時而動。故姙娠一月名胚胎。飲食精熟酸美宜食麥。無食醒辛。是爲方正姙娠一月足厥陰脉養不可鍼灸。其經足厥陰內屬於肝主筋及血。一月之時。血行否澁。不爲力事寢心安靜。無令恐畏。姙娠一月。陰陽新合爲胎。寒多爲痛。熱多驚悸。腰疼腹滿。胞急卒有所下。當預安之。宜服

烏雌雞湯

吳茱萸一升　芍藥　白朮　茯苓二兩

烏雌雞一隻　麥門冬五合　人參三兩　甘艸

生薑各一兩

右剉。水一斗二升。煑雞汁六升去雞下藥。取三升內酒三升。并膠烊盡取三升。放溫每服一升。

姙娠曾於第一月墮胎。入月預服此藥治之。

補胎飲

熟地黃　人參　防風　細辛

烏梅肉　白朮各一兩　大麥一合　吳茱萸洗半兩

右剉。每三錢。水盞半。薑三片。空心煎服。寒多倍細辛。茱萸。渴去細辛。加瓜蔞根。若有所思。去大麥加栢子仁。姙娠二月名胎膏。無食醒辛之物。居必靜處。勿勞百節。謂始藏胎也。足少陽養之。少陽者。膽之脉。主於精。二月之時。兒精成於胎裏。故足少陽養之。穴在足小指間本節後。跗骨上一寸陷中者是。姙娠陰陽居經。若有寒多壞不成。有熱則痿悴怯弱。中風寒有所動搖。心滿

臍下脹急腰背疆痛。宰有所下。乍寒乍熱宜服

艾葉湯

人參　當歸　艾葉各一兩　阿膠炒二兩

甘艸　熟地黃　川芎各一兩

右剉。每服一兩。水盞半。棗三枚。薑五片。酒一盞。半去滓食前分爲二服。

姙娠曾於二箇月墮胎者。入月預當養其藏。宜服

黃耆湯

當歸半兩　黃耆　阿膠炒各一兩　吳茱萸洗焙　人參

右剉。每服三錢。水盞半。薑三片。煎八分。食前溫服。如覺大便不快。加烏梅一兩。

姙娠三月始胎。當此之時。經血不流。形象始化。未有定儀。見物而變。欲令見貴盛侯王。好人端正莊嚴君子。積善後昆。不欲令見傴僂侏儒。醜惡瘖瘂。不義之漢。敗家之子。妖孽惡人。毋食薑。免無壞刁皂。欲得男子。操弓矢射雄雞。乘肥馬於田野。觀虎豹及走犬。欲得女者。則著簪釘環。弄珠璣。欲令子美

好端正者。數視白璧美玉。看孔雀鯉魚。欲令男多志有力。則噉牛心。正坐清虛和一。坐無邪度。立無偏倚。行無邪徑。目無邪視。耳無邪聽。口無邪言。心無邪念。無喜怒無得思慮。食則割臠無邪。臥無橫足。思欲瓜噉味酸菹。是謂外象而內感者也。手心主養之。手心主者。脉中精神內屬於心。以藏神爲諸臟之君。手心主穴在掌後橫文是。胗其姙娠脉滑疾强。以手按之散。胎胞是三月也。姙娠三月爲卒驚恐憂愁嗔恚傷動於筋脉。繞臍痛或腰背痛卒有所不安。宜服

雄雞湯

白茯苓　當歸　白朮　甘艸

麥門冬　川芎　白芍藥各一兩

阿膠炒二兩　人參一兩

右剉。每服用藥一兩。入烏雞汁盞半。棗二枚。酒一盞。煎至一盞半。去滓分作二次食前服。

姙娠曾於三月墮胎者。入月宜服

茯神飲

赤小豆炒　茯神　丹參　龍骨各一兩

當歸　人參　阿膠炒珠子　甘草炙各二兩

右剉每服三錢水盞半棗一枚煎七分溫服腰痛者加寄生草一兩

姙娠四月之時始受水精以成血脉宜食稻秔宜魚鴈是謂盛藥以通耳目而行經絡洗浴遠避寒暑是手少陽養之手少陽者三焦之脉也內屬於府四月之時兒六腑順成故手少陽養之手少陽穴在手小指間本節二寸是診其姙娠四月欲知男女左脉疾爲男右脉疾爲女俱疾爲生二子當此之時慎勿瀉之必致之殃何謂也是手少陽三焦之脉內屬於三焦靜形體和心志節飲食姙娠四月若有寒心中欲嘔胸滿不食有熱則小便難數如淋狀臍下急卒冒風寒項頸强痛寒惕腰背及腹痛往來不定或胎上逆心煩悶不安卒有所下宜服

菊花湯

甘艸半兩 麻黃去根節 半夏泡七次 麥門冬
阿膠炒二兩 菊花半兩 人參 當歸各兩

右剉每服四錢水盞半薑三片棗一枚煎八分空心溫服非風寒項强者當去麻黃半夏二藥能損胎

妊娠曾於四月墮胎者入月預服

調中湯

白芍藥 白朮 柴胡 甘艸
烏梅肉 續斷 當歸 川芎
枳實麩炒厚朴薑製 甘李根皮各等分

右剉每服三錢水盞半薑三片煎八分空心溫服羸瘦人去李根

妊娠五月始受火精以成其氣臥必晏洗衣服淨室危坐朝吸天光以避其殃其食宜稻麥其美宜牛羊和以茱萸調其五臟是謂養氣以定五臟者也

一本云宜食魚鼈足少陰養之足少陰穴在足內踝上三寸也診其妊娠脉重手按之不散但疾不滑者五月也又其脉數者必胎熱脉緊者必胞阻

脉遲者必腹滿喘脉浮者必水懷爲腫姙娠五月若有熱頭眩心欲嘔有寒則腹痛小便難卒恐悸四肢疼痛寒熱胎動無常或頓什腹有所不安者宜服

旋覆花散

麥門冬　赤芍藥　吳茱萸洗　當歸一兩　阿膠炒二兩　甘艸炙半兩　旋覆花一兩　人參一兩

右剉每服四錢水盞半薑三片酒三分煎七分食前溫服

姙娠六月始受木精以成其筋身欲微勞無時靜處出遊於野數觀走犬視馬走宜食鷙鳥猛獸之肉是謂變膳脊筋以養其爪以勞其背脊足陽明養之足陽明胃之脉主其口目六月之時兒口目皆成故足陽明穴在太衝上二寸是也姙娠六月卒胎動不安寒熱往來腹滿身腫驚悸血下腹痛狀如欲產手足煩熱並宜服

麥門冬湯

麥門冬　人參　甘艸炙　黃芩各一兩

熟地黃　阿膠蛤粉炒各一兩

右㕮咀每服四錢水盞半入酒五分薑三片棗一枚煎八分空心溫服

姙娠七月始受金精以成其骨勞躬搖體無使身安動作屈伸居處必燥飲食避寒常宜食稻秫以密腠理是謂養骨牢齒者也手太陰養之太陰者肺肺[redacted]毛七月之時兒皮骨以成故太陰養之手太陰穴在手大指本節後白肉際陷中是也診其脉姙娠七月脉實大强者生沉細者死懷胞七月暴下汁餘水其胎必倚而隨此非時孤漿預下故也姙娠七月忽驚恐動搖腹痛有所下手足厥冷逆狀若傷寒煩熱腹滿氣短促頸項腰背强宜服

葱白散

麥門冬去心半夏湯泡七次黃耆　人參

當歸　黃芩各一兩炒　阿膠炒一兩　旋覆花

甘艸半兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑三片葱白三寸酒半盞煎八分空心溫服

姙娠曾於七月傷胎者入月預服

杏仁湯

吳茱萸　甘艸炙　乾薑炮　五味子

麥門冬　紫菀　杏仁去皮尖　鍾乳粉各等分

右㕮咀每服四錢水盞半煎八分空心溫服

姙娠八月始受土精以成膏華和心靜息無挾氣極是密腠理而光澤顏色手陽明養之手陽明大腸脉主九竅八月之時兒九竅皆成故手陽明養之手陽明穴大指本節後穴中是診其姙娠八月脉實大牢弦緊者生沉細者死姙娠八月忽中風寒有所觸犯身體疼痛乍寒乍熱胎動不安常若頭眩繞臍疼痛有寒有熱至於小便白濁或復漏下顏色不定腰背冷痛目視眩眩宜服

芍藥湯

柴胡三兩　白芍藥四兩　葵子　白朮

甘艸　厚朴薑製各一兩

右剉每服四錢水盞半薑五片棗一枚煎八分空心溫服

姙娠九月始受石精以成毛六腑百節莫不畢備飲體食甘緩帶自持待之是爲養髮多才力足少陰養之足少陰者腎之脉主續縷九月之時兒脉續縷皆成故足少陰養之足少陰穴在足內踝後微近下前動脉是也姙娠九月若卒然得下利腹滿脹急胞胎上衝心腰背痛不可轉側短氣滿悶竝宜服

半夏湯

麥門冬去心各五兩　吳茱萸　當歸

阿膠炒各二兩　乾薑一兩　半夏五兩　大棗二十枚

右㕮咀每服五錢水盞半煎六分去滓入蜜少許空心服一方用烏雄雞汁煎藥

姙娠曾於九箇月墮胎者入月預服

茯苓猪腎湯

熟地黃　白朮　川芎　麥門冬去心

人參各一兩　乾薑炮半兩　白茯苓　桑寄生各一兩

右剉先用猪腎一對剝去脂膜用水一盞入黑豆煮汁盞半入藥七錢煎一盞空心分爲二服

姙娠十月五臟俱備六腑齊足通納天地氣於丹田備諸關節補氣咸備然後預脩滑胎易產方法故

宜服

甘艸散

吴茱萸半兩　甘艸炙　黑豆炒　大麻仁另研入

糯米各一兩　乾薑炮半兩　白茯苓半兩

右爲細末麻仁未同拌每服二錢酒調下未入月不可服

橫產逆生第七十九問

將產坐臥須順四時方面并避五行禁忌有犯觸者多令難產或因漏胎血枯或子藏挾宿病或觸禁忌或始覺腹痛產時未到即便驚動穢露下蚤致子道乾澁又有橫逆產不順者皆難產也或有子上逼心者繇姙娠之人失於將養也大抵臨產之際腹痛而腰不痛者未產也若腹痛連腰痛甚者即產所以然者腎候於腰胞繫於腎故也診其脉轉大如切繩轉珠者謂之離經日中覺夜半生若腰痛甚者即產

烏金散

治橫生橫產兼又催生。

百草霜　白芷

右等分爲細末每服二錢以童便少許調更以熱湯化下未生再服此方能救子母於頃刻。

乳香丸

治難產

乳香一兩細研

右用猪心血和作十丸每服一丸乳香湯化下。

出衣法

治娠振胎死腹中衣不出及產後卒有別病欲至狼狽及胞衣不下腹滿用水一盞煮猪脂一兩煎五七沸頓服之當下。

寤生丸

治難產再入後藥

枳實　桑白皮各六兩

右二味入大鐺內以長河水煮半日許候枳實透軟去桑白皮不用取枳實去穰薄切小片子。

焙乾再入後藥。

木香　甘艸炙黃各半兩

右三味爲細末。煉蜜丸桐子大。爆乾。每日空心。日午。臨臥。用溫米飲下三十丸。加至五十丸。日三服。

熱疾胎死腹中　第八十四

因母患熱疾。至六七日以後。臟腑極熱。薰蒸其胎是以致死。令不能自出。但服黑神散。煖其胎。須臾胎氣溫煖。即自出。何以知其胎之已死。但看產婦舌色青者是其驗

黑神散

治胎死腹中。悉令自出。

官桂去皮　當歸　芍藥　甘艸

乾薑炮　生地黃各一兩　黑豆炒焦去皮三兩

右爲細末每服一錢空心溫酒調下。

黑龍丹

治產後一切血疾垂斃者但灌藥無有不効。

乾生地　當歸　川芎　五靈脂

良薑

已上各等分入砂合內赤石脂抿縫紙筋鹽泥固濟封合炭火十斤煆通紅去火候冷開取合子看成黑糟乃取出細研入後藥。

硫黃研一錢半　花蕊石煆一錢　乳香另研一錢半

琥珀研一錢　百艸霜研五兩

右爲細末米醋煮糊丸彈子大每服一丸炭火燒通紅投生薑自然汁無灰酒一合童便半盞內研開頓服立効。

烏金散

治產後血迷血運敗血不止淋瀝不斷臍腹疼痛目頭昏眩無力多汗又治崩中下血過多不止並宜服之。

麒麟竭　亂髮　松靈煆醋淬　百草霜

當歸去蘆　肉桂　赤芍藥　延胡索

鯉魚鱗燒末

右等分爲細末每服二錢溫酒調下。

芎藭湯

治產後去血過多運悶不省及墮胎去血多金瘡去血多懸虛心煩眩悶不止日暗耳聾舉頭欲倒並皆治之。

當歸去蘆燒焙　芎藭各半兩

右剉每服三錢水盞半煎七分熱服不拘時。

凡婦人舌青黑及腹冷者子已死或指甲青舌青脹悶甚者口中作尿臭先以平胃散投朴硝半兩酒與水各一鍾煎服胎化血水下○鹿角散下死胎鹿角屑一兩入葱頭煎服。

產寶百問卷之四