產寶百問

產寶百問

全三冊

ORIENTALIA
CHINESE
V
G136
C47

立性寶百問

下

V
G136.3
C47

3

Dr. Saiki's Library.
函或架之番號
冊之番號 1967
備考
京都產院文庫藏書

胎衣不下 第八十一問

母生子訖。血流入衣中。爲血所脹。是故不得下。治之稍緩。脹滿以次。上衝心胸。疼痛喘急者難治。但服奪命丹以速去衣中之血。血散脹消胎衣下而愈。

奪命丹

附子 生一兩炮去皮臍　牡丹皮 去心一兩

乾漆 一兩火炒烟盡

右爲末。釀醋一升。大黃末一兩同熬成膏。和藥

如桐子大。溫酒送下五七丸。

牛膝湯

治產兒已出。胎衣不下。臍腹脹急堅滿。子死腹中不得出疼痛宜服。

滑石八兩　當歸去蘆六兩　牛膝酒洗焙四兩

木通六兩　瞿麥四兩　冬葵子五兩

右剉每服三錢水一盞。煎七分。溫服不拘時。

難產第八十二問

胎中有成形或塊兒爲枕子。欲生時。枕破與敗血裹其子。故難產但服勝金散逐其敗血。即自生矣若逆生橫生。並皆治之。

勝金散

治難產之神劑

麝香　鹽豉一兩用舊青衣裹了燒通紅急以乳鉢研極細末

右爲細末。取秤鎚燒紅。以酒淬之。調前藥服之。

琥珀黑散

治產婦一切疾病。產前難產胎死橫生逆生。產後胎衣不下。衣帶先斷遍身疼痛。口乾心煩。多時不語。如血運眼花。誤以爲暗風。乍寒乍熱。悞以爲瘧疾。四肢浮腫悞以爲水腫。言語顛狂。乍見鬼神。悞以爲邪祟腹脇脹滿。嘔逆不安悞以爲翻胃。大便秘澁。小便出血及惡露未盡。經候未還。起居飲食皆不戒氣。血氣之疾。聚集成塊。散而上衝氣急。心痛咳嗽多唾四肢虛熱。睡驚盜汗崩中敗癥。遶臍痛或即面赤。因變骨蒸皆宜多服若產後產前鼻衄口鼻黑色氣起喉中喘急中風口噤皆爲難治須急服之凡產前宜進一二服安神順胎產後雖無疾七日一外進一二服能治諸病或因驚恐變生此證可速服取効。

琥珀另研　朱砂另研　松烟墨另研　百艸霜

新羅參　附子炮各五錢　白僵蠶炒去絲一錢

乳香另研分　血蕕灰即黑魚麟燒灰半兩　黑衣即竈漏上塵用半兩　川歸去頭一錢

右爲細末每服二錢炒薑酒和童便食前調下。

產後血運 第八十三問

產後血氣暴虛。未得安靜。血隨氣上。迷亂心神。故眼前生花。極甚者。令人悶絕不知人事。口噤神昏氣冷。醫者不識。呼爲暗風。若作此疾。治之誤矣。但服

清魂散

甘草二錢 澤蘭葉 人參各一兩

荆芥穗一兩 川芎半兩

右爲細末。每服一錢。熱湯溫酒各半盞調。急灌之下。咽喉即開。眼氣定。人事醒。

七寶散

治初產後調血和氣補虛壓驚治虛運。

朱砂　桂心不見火　茯苓　乾薑炮

當歸切焙　羚羊角灰　川芎　人參

右各等分爲細末若產婦平和三臘以前宜至滿月每日各取一字以羌活頭淋酒調下空心服若覺心胸煩熱即減薑桂令別加之腹痛加當歸心滿加羚羊角心胸虛氣加桂不下食或惡心加人參虛戰加茯苓以意斟酌日二服夜一以酒或童便調服

產後口乾痞悶第八十四問

產後胃管大虛血氣未定食麪太早不能消化麪毒結聚於胃脘上薰胸中是以口乾煩渴心下痞悶醫者不識認爲胸膈壅滯以藥下之萬無一効但服

見現丸

蓬朮　薑黃　京三稜　蓽澄茄

人參　陳皮去白　良薑

右等分爲細末切蘿蔔爛火煮令爛研細將汁煮糊丸桐子大蘿蔔湯下五十丸不拘時服

木香丸

治婦人有娠傷食。此證在產後用。

前胡五錢　木香二錢　人參去蘆　陳皮去白

白茯苓去皮各二錢　三稜有胎不可用

柴胡五錢

右爲細末。麪糊丸菉豆大。每服三十丸。熟水下。

白朮散

治氣不調和。傷飲食。許學士云。娠娠之婦傷食。難得好。唯用二方絕妙。

白朮炒　紫蘇各一兩　白芷微炒　人參去芦各二兩

川芎　訶子各核各五錢　甘艸炙一分

右爲細末。每服二錢水一盞薑三片。煎七分。溫服不拘時

六君子湯

治胸膈痞塞不嗜食。服燥藥不得

半夏湯洗七次　枳殼麩炒　陳皮去白　人參去白

白朮　茯苓

右等分每服五錢。水二盞薑五片。煎一盞溫服

不拘時。

產後乍寒乍熱第八十五問

陰陽不和敗血不散皆令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰盛則乍寒陽盛則乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞傷臟腑血若不能宣越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫者不識悞作瘧疾治之則繆矣陰陽不和宜服增損四物湯敗血不散宜服奪命丹二者何別但寒熱無他證者陰陽不和也時有刺痛者敗血也

增損四物湯

甘艸半兩　當歸　芍藥　人參
川芎　乾薑各一兩

右剉每服四錢。水一盞。薑五片煎六分。溫服不拘時服。

增減柴胡湯

治婦人產後。虛羸發寒熱食少腹脹

川芎　柴胡二錢　人參　甘艸
半夏　芍藥　陳皮各三錢

右㕮咀每服四錢水盞半薑三片棗一枚。煎七分。溫服不拘時。

猪腎湯

治產婦產後日淺久坐視聽言語多或運動勞力遂覺頭項及肢節皮骨疼痛。乍寒乍熱。此是蓐勞。

猪腎一雙去脂膜　當歸　芍藥
生薑各二兩　桂心一兩　葱白二合一方一握

右以水八升。緩火煮腎取六升。澄清內入諸藥煮取二升。分作三次溫服。

產後四肢虛腫第八十六問

產後敗血。乘虛停積于五臟。循經流入于四肢。留住月深。却還不得腐壞如水故令四肢面目浮腫。醫者不識。便作水氣治之凡治水氣多用導水氣藥極虛之人。產後既虛又以藥虛之。是爲重虛往往因致夭枉。但服調經散虛還腫退卽愈

調經散

沒藥一錢　琥珀一錢另研　肉桂　赤芍藥

當歸各二錢　細辛五錢　麝香

右爲細末。每服半錢。生薑汁。溫酒各少許調下。

正脾散

治大病之後。脾氣虛弱中滿腹脹四肢虛浮狀若水氣此藥主之及產後四肢浮腫

蓬朮 炮　香附子 炒　茴香　甘艸 炙

陳皮

右等分爲細末。每服二錢。煎燈心木瓜湯調

產後乍見鬼神 第八十七問

心主身之血脉。因勞傷耗血脉。心氣則虛敗血停積上于于心。心不受觸。遂致心中煩躁起臥不安。乍見鬼神。言語顛倒。醫不識悞爲風邪。如此治之必不得愈。但服調經散每服加生龍腦一捻得睡即安。

栢子仁散

治產後荒言亂語皆因內虛是血邪攻心。

栢子仁　遠志 去心　人參 去芦　桑寄生

防風 去芦　琥珀 細研　當歸　熟地黃 炙各半兩

甘艸炙半錢

右剉。每服以水二盞入白羊心一枚切碎先煎七分。去滓。次下藥五錢。更煎四分。溫服不拘時

琥珀散

治產後血邪攻。心迷亂悶言語錯亂。

琥珀一兩　人參三錢去苦　遠志去心　茯神

生地黃　阿膠炒各三錢　鐵粉一錢　硃砂半兩

甘艸炙　麝香另研各一錢

右爲極細末。每服一錢。金銀煎湯調下不拘時。

產後不語第八十八問

人心有七孔三毛。產後血氣虛弱。多致停積敗血閉其心竅。神志不能明了。又心氣通于舌。心氣閉塞則舌亦强矣。故令不語如此。但服七珍散自差。

七珍散

人參　石菖蒲　川芎　熟地黃各一兩

細辛一錢　防風　朱砂各半兩細研

右爲細末。每服一錢。薄荷湯調下不拘時。

交感地煎丸

治婦人產前產後眼狀。胞衣不下。失音不語。心腹脹滿。水谷不化

生地黃二斤 生薑二斤上二味各搗爛以薑汁炒地黃滓地黃汁炒生薑滓

各至乾研末爲度

當歸一兩去芦 蒲黃炒黃四兩 琥珀一兩另研 玄胡索糯米炒一兩

右爲細末。煉蜜丸如彈子大。每用一丸。當歸湯下

產後腹痛瀉利

產後腸胃虛怯。寒邪易侵。若未滿月。飲食當風。乘虛進襲。留于胸膜。散于腹脇。故腹痛作陣。或如錐刀所刺。流入大腸。水谷不化。洞泄腸鳴。或下赤白。腹脇膨脹。走痛不定。急爲積滯。禍不旋踵。急服調中湯。

調中湯

高良薑 當歸酒浸焙乾 官桂去皮 白芍藥 附子炮去皮臍 川芎各一兩 甘艸炙半兩

右剉。每服三錢。水二盞。薑五片。不拘時服。

定痛散

治產後腹內熱痛不可忍。又見梳未定。

當歸切片炒　芍藥各二兩　桂心一兩

右剉。每服三錢。水酒各半盞。薑一塊彈子大。拍破。同煎六分溫服。如洞泄腸鳴者。加附子乾薑各一兩。

產後遍身疼痛第九十問

產後百節開張。血脉流走。氣弱則經絡分肉之間。血多留滯。累日不散。則骨節不利。筋脉引急。故腰背不得轉側。手脚不得動搖。身熱頭痛。悞爲傷寒治之。則汗出而筋脉動惕。手足厥冷。變生他病。但服趂痛散即差。

趂痛散

甘艸炙　牛膝　當歸　官桂去皮

白朮　黃芪各半兩　薤白一兩　獨活半兩

生薑半兩

右剉。每服二錢。水盞半。煎七分。去滓熱服。

產後大便秘澀第九十一問

產後水血俱下。腸胃虛竭。津液不足。是以大便秘澀不通也。若過五六日腹中滿脹者。此有燥糞在藏府。以其乾澀。未能出耳。宜服麻仁丸以潤之。若悞以爲熱而投之以寒藥。則陽消陰變。性命危矣。

麻仁丸

潤腸通便之聖藥

大黃　麻仁研　枳殼　人參半兩

右爲細末。煉蜜丸如桐子大。空心溫湯下二十

丸未通加數丸

滋腸五仁丸

治氣血不足大腸閉滯傳道艱難

陳皮四兩 桃仁去皮尖 杏仁炒去皮尖各一兩

栢子仁半兩 郁李仁麩炒半兩

右四仁另研爲膏後合陳皮末煉蜜爲丸桐子大每服三十丸加至五十丸食前米飲下更看虛實加減

產後血崩第九十二問

產臥傷耗經脉未得平復而勞役損動故血暴崩下淋瀝不止或因鹹酸不節傷蠹榮衛氣衰血弱亦變崩中若小腹滿痛經已壞爲難治急服固經丸以主之

固經丸

補骨脂一兩 赤石脂一兩 艾葉半兩 附子半兩

木賊艸半兩

右爲細末陳米飲丸桐子大空心溫酒下二十

丸米飲下亦可。

熟地黃散

治崩中下血不止。心神煩悶。頭目昏重。

熟地黃一兩半　甘艸炙　蒲黃半兩

蟹爪二合微炒　白茯苓　桂心　白芍藥

當歸　伏龍肝各三兩　阿膠二兩炒

蠶布二兩燒灰

右剉。每服四錢。水盞半。入竹茹一分。煎六分。溫服不拘時。

產後腹脹滿悶嘔吐不定第九十三問

敗血散于脾胃脾受之不能運化精微而成腹脹。胃受之。則不得納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥療之。轉傷正氣。但服巨勝散自瘥。

巨勝散

生薑　赤芍藥　半夏　澤蘭葉

茯苓　人參　陳皮　甘艸各一兩

右剉。每服二錢。水盞半。煎七分。食前溫服

八味理中丸

治新產血氣俱傷五藏暴虛肢體羸乏少氣多汗纔產直至百日每日常服壯氣補虛止嘔吐

甘艸一兩半 人參五兩 乾薑炮二兩 白朮四兩 砂仁四兩 茯苓一兩 麥蘖二兩 神麯一兩炒

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食前薑湯下或加半夏麯一兩入鹽點服亦得

產後口鼻黑氣起及鼻衄第九十四問

陽明者經脉之海起於鼻交額中還出浹白交人中左之右右之左產後氣消血虛榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑氣起及變鼻衄此系產後虛熱變生此病其疾不可治若日胃絕脉敗詳此一證每處無方可治急服琥珀黑散視其病人鼻黑退衄止者活

琥珀黑散

琥珀另研 朱砂另研 松烟墨另研 百艸霜

新羅參　附子炮各半兩　白殭蠶炒去絲一錢

麝香另研一分　血竭灰即黑魚鱗燒灰半兩　黑衣即竈突上塵半兩

川當歸去頭一錢

右爲細末每服二錢炒薑酒和童便食前調下。

產後氣急喘第九十五問

榮者血也衛者氣也榮行脉中衛行脉外相隨上下爲之榮衛因產所下過多榮血暴竭衛氣無所主獨聚于肺中故令肺喘也此名孤陽絕陰爲難治若惡露不快敗血停凝上薰於肺亦令喘也如此但服奪命丹血去喘息自止

旋覆花湯

治產後感寒嗽咳喘悶痰涎壅塞坐臥不寧如服奪命丹喘不定可服此藥

前胡　麻黃去根節　杏仁去皮麩炒　五味子
茯苓　甘艸　赤芍藥　旋覆花
人參　半夏曲

右剉。每等分。每服四錢。水盞半。薑三片。棗一枚。煎七分。溫服。

產後心痛　第九十七問

心者血之主。人有宿寒。因產大虛。寒搏於血。血凝不得消散。其氣逆上。衝擊於心之經絡。故心痛。但服大嚴蜜湯。治之。寒去則血脉經絡通。心痛自止。若悞以爲厥。以傷寒治之。則虛極。寒益甚矣。心絡寒甚。傳心之正經。則變爲眞心痛。朝發夕死。夕發且死。藥不可輕用如此。

大嚴蜜湯

獨活　吳茱萸　熟芑　芍藥

當歸　甘草炙各一兩　細辛半兩　官桂

乾薑各半兩　小草一兩

右剉每服三錢水二盞煎一盞溫服不拘時

四神散

治產後留血不消積聚作塊急切疼痛及心腹絞痛不利

當歸　乾薑炮　川芎　赤芍藥

右各等分爲細末每服三錢溫酒調下不拘時服

產後中風第九十六問

產後五七日強力下床或一月之內百日之中傷於房室或懷憂發怒擾蕩冲和或因著艾傷動臟腑得病之初眼澀口噤肌肉漸搐腰脊筋急強直不可治此乃人作非偶爾中風所得也

獨活散

治中風口噤肩項強直四肢拘急

獨活　防風去蘆　桂心　甘草炙

當歸微炒　麻黃去根節各一兩　附子一兩炮去皮臍

細辛半兩

右剉每服四錢。酒水各半盞。煎六分。拗開口灌

八風湯

治迷惑如醉。狂言妄語。驚悸恐怖。恍惚見鬼。

人參　天雄　當歸各五兩　附子

防風　麥門冬　蜀椒　獨活各四兩

烏豆　秦艽　細辛　白朮

乾薑　小艸　五味子　桔梗

白芷　柴胡　甘艸各半兩

右爲細末。每服二錢。溫酒調下。日三服。身中如

針刺者。則藥行也。

舉輕古拜散

治產後中風之仙藥

荊芥穗炒

右爲末。每服二錢。豆淋湯下。

產後熱悶轉爲脚氣第九十八問

產後血虛生熱復因春夏取涼過多地之蒸溼因足履之所以爲脚氣之疾其狀熱悶掣瘛驚悸心煩氣促嘔吐氣上皆其候也服小續命湯兩三貼必愈若醫者以爲敗血藥攻之則血去而病益增矣

小續命湯

麻黃去節　防已　川芎　芍藥

人參　甘艸炙　白朮各一兩　附子一隻炮去皮臍

黃芩　防風一兩　生薑　官桂各五錢

右剉每服三錢。水二盞。煎七分。去滓溫服

大驅風散

治卒中風。攻身體欲絕。傳及五臟。言語蹇澀神思冒昧或履溼氣。變爲脚氣者尤効。

麻黃去節一兩　川芎一兩五錢　石膏一兩半　肉桂

白芷　甘艸炙　乾薑炮　當歸

黃芩　杏仁去皮尖炒黃各三兩

右剉每服四錢。水盞半。煎六分。溫服不拘時。汗出爲度。一法入荊瀝五合同煎大驗如脚氣加白朮一兩木瓜一兩去乾薑

產後汗出多變痓風第九十九問

產後血虛。輳理不蜜。故多汗出。因遇風邪搏之。則變痓風也。痓者。口噤不開。背强而直。如風癇狀。搖頭馬鳴身反折。須臾十發。氣息如絕。宜速挖開口。灌小續命湯。稍緩則汗出如雨手拭不及者不治。

小續命湯見前論

防風散

治產後中風如角弓反張口噤

防風去蘆　葛根　芎藭　生地黃

麻黃去節各一兩　甘艸炙二兩　桂心二錢

獨活二兩　漢防已二錢　蔓荊子三錢　藁本一兩

杏仁一兩炒黃色

右剉每服四錢。水盞半。煎六分。溫服不拘時

產後下血過多虛極生風第一百問

婦人以榮血爲本。因產血下大多。氣無所主。唇青肉冷汗出。目瞑神昏。命在須臾。此但虛極生風也。如此急以濟危上丹。以風藥治之。則悞矣

濟危上丹

太陰玄精石研　陳皮去白　桑寄生

硫黃　眞阿膠　生卷柏　五靈脂

乳香各等分

右將上四味。同研入器內。微火炒勿令焦。炒後

再研極細後入餘藥末用地黃汁糊丸桐子大

溫酒下二十丸

神授散

治產後一切疾病不論大小以至危篤者並皆

治之

百合二兩半浮洗　青皮去白五兩　神麯三兩炒

麥芽三兩炒　乾薑二兩五錢　人參去芦三兩　甘艸炙

當歸　川芎各二兩半　桂心五兩　牡丹皮

白芍藥　陳皮去白各五兩　紅花一兩半

右剉每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服雍娠不得服虛者去牡丹皮紅花加

附子三錢

產寶百問卷之五終

產寶百問　卷五